erfüllt sie sich auch für die Grösse $\mathcal{Q}_1$ in Folge der identischen Gleichung $r \frac{d\mathcal{Q}_1}{dr} + r_1 \frac{d\mathcal{Q}_1}{dr_1} + \mathcal{Q}_1 = 0$. Setzt man aber $e = 0$, $e_1 = 0$, so ergeben sich aus den beiden letzten Gleichungen sofort die Werthe

$$\alpha = \lambda^2 p_0^2 \frac{m_0}{2} + \dots$$

$$- \alpha_1 = \lambda^2 p_0^2 \frac{3m_0}{4} + \dots$$

Wenn dieselben eingesetzt werden, so verschwinden in den sieben Störungsgleichungen von den als Functionen von r und r_1 allein darzustellenden Gliedern alle diejenigen, welche nicht den Factor e oder e_1 haben.

Die Vorzüge der neuen Störungstheorie treten um so mehr hervor, je höher die Ordnung der Störungsglieder ist, bis zu welcher man die Rechnung fortsetzen muss, um eine bestimmte Grenze der Genauigkeit zu erreichen. Man darf daher erwarten, dass sie auch solche Störungsaufgaben befriedigend zu lösen geeignet ist, welche die bisherige Störungstheorie nicht bewältigen kann. Die Vorzüge sind auch dann erheblich, wenn sich die Rechnung auf die Störungsglieder der ersten Ordnung beschränkt. Ausser den im Eingange dieses Aufsatzes besprochenen sind noch andere Vorzüge vorhanden, welche sich aus der Betrachtung der

Störungsgleichungen ergeben. In der Anwendung auf jene gewöhnlichste Störungsaufgabe, in welcher die gestörte Masse $m = 0$ gesetzt werden kann, wo also die Bahn der Masse m_1 ungestört bleibt, ist die Fundamentalebene parallel der Ebene der störenden Masse, also $i_1 = 0$; ferner ist $\gamma_1 = 0$, $\beta_1 = 0$ und $w_1 + \vartheta = w_{01}$, wo w_{01} eine Beständige ist. Es bleiben daher nur fünf Störungsgleichungen übrig, während in der bisherigen Störungstheorie sechs Störungsgleichungen zu integrieren sind. Die Integration führt zu der zweifachen Quadratur $\int v dt$, und für den Fall, dass die gestörte Bahn von der andern eingeschlossen ist, ist die zweifache Quadratur mit λ multiplicirt. Die Glieder des Productes $\lambda \int v dt$ haben aber immer einen der Factoren λe , λe_1 , $\lambda \sin^2 \frac{\mathcal{F}}{2}$ und sind daher so klein, dass man eine

schon beträchtliche Annäherung erhält, wenn dieselben gleich Null gesetzt werden. Bei dieser Beschränkung der Genauigkeit, wo $v = 0$ ist, bleiben nur vier Störungsgleichungen übrig, und die Störungen sind durch einfache Quadraturen ausgedrückt. In der bisherigen Störungstheorie gelangt man nicht zu einer Annäherung, wenn die zweiten Quadraturen, zu welchen sie führt, gleich Null gesetzt werden.

Carlsruhe, 1882 im Februar.

Aug. Weiler.

Zur Berichtigung.

Auf pag. 30 der Denkschrift zur Begründung der mittteleuropäischen Gradmessung: »Ueber die Grösse und Figur der Erde. Berlin 1861« führt General-Lieutenant Baeyer bezüglich der Berechnung der Elemente des Rotationsellipsoids unseres Erdkörpers an, dass der Artikel Airy's: »Figure of the Earth« in der »Encyclopaedia metropolitana« aus dem Jahre 1849 stamme. Diese unrichtige Angabe ist seither in die nachfolgenden Publicationen übergegangen:

Koristka, Vysledky měření, jimž velikost a podoba země ustanovena byla. Prag 1863, (pag. 13);

Bruhns, in: »Allgemeine Encyklopaedie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber, I. Section 78. Theil, Leipzig 1864,« Artikel: »Gradmessung« (pag. 29);

Fischer, Untersuchungen über die Gestalt der Erde. Darmstadt 1868, (pag. 183);

Tinter, die europäische Gradmessung in ihrer Beziehung zu den früheren Gradmessungsarbeiten. Wien 1870, (pag. 25 und 33); *)

Sadebeck, Entwicklungsgang der Gradmessungsarbeiten. Berlin 1876, (pag. 16);

und hat sogar Koristka, Tinter und Sadebeck zu der irrigen Annahme veranlasst, dass Airy für seine Berechnungen auch schon die Resultate der russischen Gradmessung in der Erweiterung bis auf 25° 20' Amplitude, ferner jene der

englischen zwischen St. Agnes bis Saxavord in der Ausdehnung von 10° 56' und endlich die Ergebnisse der neuen Messung am Cap der guten Hoffnung von Maclear mit 3° 35' Amplitude (1848) benutzte.

Dem ist jedoch nicht so.

Der bezogene Artikel Airy's stammt aus dem Jahre 1830, also aus der Zeit, da sich derselbe noch in Cambridge befand und wurde in Volume V der »Encyclopaedia Metropolitana« im Jahre 1845 publicirt. Die von ihm benutzten 18 Gradmessungen sind:

a) Breitengradmessungen.

	Amplitude
1. Die schwedische von Svanberg	1° 37' 19".3
2. Die lappländische von Maupertuis	0 57 30.4
3. Die russische von Struve	3 55 5.2
4. Die hannoveranische von Gauss	2 0 57.4
5. Die englische zwischen Dunnose und Burleigh Moor	3 57 13.1
6. Die erste französische zwischen Perpignan und Dünkirchen	8 20 0.3
7. Die piemontesische nach Revision von Carlini und Plana 1821/23	1 7 31.1
8. Die zweite französische zwischen Formentera und Dünkirchen	12 22 12.6
9. Die römische von Boscovich und Le Maire	2 9 47
10. Die amerikanische von Mason und Dixon	1 28 45.0

*) Uebergegangen in: Mittheilungen der kk. geogr. Gesellschaft in Wien 1871, pag. 83.

	Amplitude
11. Die zweite ostindische von Lambton und Everest	15° 57' 40" 7
12. Die erste ostindische von Lambton	1 34 56.4
13. Die peruanische nach Delambre	3 7 3.1
14. Die La Caille'sche am Cap der guten Hoffnung	1 13 17.5

b) Längengradmessungen

in einer
Längenausdehnung von

15. Die französische zwischen St. Claire und St. Vittoire	1° 53' 19" 0
16. Die englische zwischen Beachy Head und Dunnose	1 36 47.9
17. Die englische zwischen Dover und Falmouth	6 22 6.0
18. Die französisch-sardinisch-österreichische zwischen Padua u. Marennes	12 59 3.8

Nach Discussion der hieraus abgeleiteten Rechnungsergebnisse behielt Airy blos die aus den unter Nr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 und 12 bezeichneten Breitengradmessungen berechneten Dimensionen des Erdkörpers bei.

Ich glaubte das Vorstehende zur Mittheilung bringen zu sollen, weil, wie schon die Zahl der angeführten Publicationen beweist, ein einmal stehen gebliebener Fehler sehr leicht unrichtige Schlüsse zur Folge hat, die für die Zukunft vermieden werden sollen.

Wien 1882 Februar 20.

Dipl. Ing. F. Klein.

Bemerkung. Im Anhang IX des Generalberichts der Europäischen Gradmessung von 1880, Literatur der Gradmessungen, steht bereits für die Arbeit von Airy die richtige Jahreszahl 1830. *K7.*

On the Variability of DM. + 23°1599.

With reference to Herr Safarik's communication (A. N. 2402) calling attention to this star, the following information from my own observations of it may be of value.

This object came under suspicion of variability while I was observing R Geminorum in April 1875, when I noticed the absence of the star in question from the sky. Following is the transcript from my note book:

»1875 April 30. There is no star at x (referring to diagram) which is given in Durchmusterung at 6^h58^m9^s8 +23°7'6, 9.5 m. According to the DM. there is a row of three small stars situated as follows:

6 ^h 57 ^m 49 ^s 6	+23° 4'9	9.3 m.
58 9.8	7.6	9.5
58 23.8	9.1	9.3

»The first and third of these are easily seen; but the place of the second was scrutinized with great care; if a star exists here it is certainly below 11 mag. The night is clear and fine.«

The telescope used was a 3 inch Clark. The star was again very carefully sought for on various evenings during the succeeding fortnight, with the same result. No record of these unsuccessful attempts was made, but I find observations of other variables on May 2^d, 3^d, 4th, 8th, 11th and 12th and consider it safe to say that on most, if not all, of these nights I turned my telescope to the place of the missing star. On the 3^d at least it is certain that I did so, as I find an observation of R Geminorum recorded. The only other record in my note-book on the matter follows immediately that of April 30th above quoted; thus:

»Note made 1875 May 13. The above is a mistake of the Durchmusterung. In volume VI of the Bonn Observations the table of errata says: 23°1599, the star is to be struck out.«

This will explain why watch was discontinued of an object which up to that time I had supposed variable. The above data may have sufficient bearing in ascertaining the period of Herr Safarik's variable to be worth placing on permanent record.

In Cooper's Markree Catalogue the star was observed 1848 Dec. 18 as 10 mag. By comparison of other stars of about the same magnitude in this zone, it appears that this would correspond to about 9.5 m. of the Durchmusterung scale. In the Markree zone of 1851 March 6 the star does not appear, but no inference of its non-visibility at that time can be drawn from this fact; since, although stars occur in the zone only 1½ minutes north of DM. 23°1599, the latter passed so near the edge of the field (which was 25' in diameter, the zone itself being 20' broad) as easily to escape detection.

I can find no other published observation of the star; but as it forms with its neighbours so peculiar a configuration in the close vicinity of R Geminorum, from which it is only 14' distant, it is more than probable that the original records of the numerous telescopic comparisons of this long known variable by Messrs. Hind, Schönfeld, Schmidt, Auwers, Oudemans, Schwab and Pogson, will contain some references to this star. It would also be exceedingly interesting to know the evidence on which it was excluded from the Durchmusterung (see B. B. VI, 378). *)

Harvard College Observatory Cambridge U. S. A.,
1882 Febr. 18.

S. C. Chandler jr.

*) Die folgende Note von Prof. Schönfeld giebt hierüber Aufschluss. *K7.*