Säuregefäß dient. Der zweite Hals trägt ein zweimal rechtwinklig gebogenes Gasableitungsrohr, welches in eine als Waschflasche dienende zweite Woulfe'sche Flasche unter Wasser mündet. Diese Flasche trägt ausserdem ein Gasableitungsrohr und das bis fast zum Boden reichende Rohr eines mit geräumiger Kugel versehenen Kugelrohres (etwa das obere Gefäß eines Kipp'schen Apparates).

Lässt man etwas Salzsäure zu dem Schwefeleisen fließen und schliesst dann den Hahn des Salzsäurezuflussgefäßes, so entwickelt sich Schwefelwasserstoff, welcher, falls der Hahn des Gasableitungsrohres der Waschflasche geschlossen ist, das Waschwasser in die Kugel emporreibt und so das Gas stets unter erheblichem Druck zur Verfügung stehen lässt.

III. Chemische Analyse organischer Körper.

Von

P. Dobriner unter Mitwirkung von **A. Oswald**.

1. Qualitative Ermittlung organischer Körper.

Als Reagens für Alkaloide bringt Gabriel Bertrand¹⁾ die Kieselwolframsäure in Vorschlag. Diese Säure bildet wohl definirte, durchaus beständige Salze, die sich leicht und genau analysiren lassen; ausserdem begünstigt noch ihr hohes Moleculargewicht, welches beinahe 3000 beträgt, die analytische Bestimmung. Die Empfindlichkeit der Reaction übertrifft alle bisher für Alkaloide empfohlenen.

Die Kieselwolframsäure

kann als solche oder als Alkalisalz, am besten in 5 procentiger Lösung, angewandt werden.

In genügend concentrirten, kalten Alkaloidlösungen gibt das Reagens im allgemeinen flockige, zusammengeballte, pulverige, selbst krystallinische Niederschläge von weisser bis schwach gelblicher und röthlicher Farbe, welche leicht durch Filtration von der Flüssigkeit getrennt werden können. In kaltem Wasser sind die Niederschläge fast unlöslich, wenig löslich in kochendem.

¹⁾ Comptes rendus **128**, 742 und Bull. de la soc. chim. de Paris (3. série) **21**, 434.

Die bei 30° getrockneten Salze enthalten je nach dem Alkaloid noch eine bestimmte Menge Wasser, welches sie aber bei 120° zum Theil wenigstens verlieren; sie besitzen die allgemeine Formel

Die Salze sind in Säuren, selbst in hinlänglich concentrirten nicht löslich und hinterlassen beim Veraschen einen Rückstand, welcher aus Kieselsäure und Wolframsäure besteht.

Folgende Salze wurden von Bertrand genauer untersucht; die gefundenen Zahlen stimmen genau mit den theoretisch berechneten überein:

Das Pyridinsalz $12 \text{ Wo O}_3 \cdot \text{Si O}_2 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O} \cdot 4 \text{ C}_5 \text{ H}_5 \text{ N} + \text{H}_2\text{O}$ ist krystallisirt und wird bei 120° wasserfrei.

Das Morphinsalz $12 \text{ Wo O}_3 \cdot \text{Si O}_2 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O} \cdot 4 \text{ C}_{17} \text{ H}_{19} \text{ NO}_3 + 9 \text{ H}_2\text{O}$ ist amorph, lachsfarben und hält nach dem Trocknen bei 120° noch 2 Molecüle Wasser zurück.

Das Strychninsalz $12 \text{ Wo O}_3 \cdot \text{Si O}_2 \cdot 2 \text{ H}_2\text{O} \cdot 4 \text{ C}_{21} \text{ H}_{22} \text{ N}_2 \text{ O}_2 + 8 \text{ H}_2\text{O}$ ist dem vorhergehenden ähnlich. Das bei 120° C. getrocknete Salz enthält jedoch nur noch 1 Molecül Wasser.

Erhitzt man nach dem Füllen Flüssigkeit und Niederschlag zusammen, so verlieren die Alkaloidkieselwolframate schon in der Flüssigkeit eine bestimmte Menge Wasser, und zwar die eben angeführten alle 1 Molecül. Der Niederschlag bildet dann ein sehr fein vertheiltes Pulver, das sich nur langsam absetzt und dadurch bei gewissen Alkaloiden deutlicher sichtbar wird als das durch directe Fällung bei gewöhnlicher Temperatur entstehende Hydrat. Dasselbe wird erreicht, wenn direct heiss gefällt wird. Versetzt man zum Beispiel 5 cc einer Aconitinsulfatlösung (1:50000) mit 1 bis 2 Tropfen des Reagens, so tritt nur eine sehr schwache Opalescenz auf; erhitzt man jedoch zum Kochen, so erscheint beim Erkalten ein äusserst feiner, pulveriger Niederschlag. Selbst in der Verdünnung von 1:70000 bis 1:80000 ist das Alkaloid an einer Trübung der Flüssigkeit deutlich erkennbar.

Noch deutlicher ist der Unterschied bei Veratrin; während in der Kälte bei einer Verdünnung von 1:10000 fast keine Fällung entsteht, ist nach dem Erwärmen und Wiedererkalten eine deutliche Trübung sichtbar, noch bei einer Verdünnung von 1:130000.

Der Verfasser hat für eine Reihe von vegetabilischen Alkaloiden die Empfindlichkeitsgrenze festgestellt, indem er stets zu 5 cc Lösung 1 bis

2 Tropfen einer Lösung von kieselwolframsaurem Natron und eben so viel 10procentige Salzsäure hinzufügte.

Die Grenze ist bei

Coniin	1 : 8000
Morphin	1 : 16000
Theobromin	1 : 18000
Nicotin	1 : 20000
Narceïn	1 : 30000
Codeïn	1 : 40000
Atropin }	1 : 50000
Caffeïn }	
Cocaïn	1 : 200000.

Bei diesen Körpern ist es ohne Unterschied, ob in der Kälte oder in der Wärme gefällt wird. Bei den folgenden jedoch ist die Empfindlichkeit weit grösser, wenn man aufkocht und wieder erkalten lässt; sie ist dann bei

Aconitin	1 : 80000
Veratrin	1 : 130000
Brucin	1 : 150000
Strychin }	1 : 200000
Narcotin }	
Chinin }	1 : 500000
Chinidin }	
Cinchonin }	
Cinchonidin }	

Trotz ihrer Beständigkeit werden die Alkaloidsilicowolframate durch Oxydationsmittel leicht angegriffen. Dieser Umstand ermöglicht es, die Niederschläge direct zu weiteren charakteristischen Farbenreactionen der Alkaloide zu verwenden, zum Beispiel Strychnin mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure zu oxydiren etc.

Durch verdünntes Alkali, selbst durch Ammoniak, werden schon in der Kälte die Salze sofort gespalten, so dass dadurch aus den Niederschlägen die freien Alkaloide leicht erhalten werden können. Silicium und Wolfram bleiben in Lösung, während das Alkaloid durch Filtration getrennt, oder, wenn löslich, durch ein geeignetes Lösungsmittel extrahirt werden kann.