Nach der Rechnung wäre es = 4,59507.

Nämlich	3 Vol. Kohlenstoff	=	2,52837
	6 — Wasserstoff	=	0,41280
	1½ — Sauerstoff	=	1,65390
			<hr/> 4,59507.

Die Formel wäre also $C_6 H_{12} O_3$ oder $C_{12} H_{24} O_6 = 3 (C_4 H_8 O_2)$ und es ist gebildet, indem 3 Vol. Aldehyd sich zu einem verdichtet haben.

Wie man aus der Bildung dieser beiden Körper entnehmen kann, ist der Aldehyd in seinem Verhalten dem Cyansäurehydrat ähnlich, wie dieses kann es nicht aufbewahrt werden, ohne von dem Moment an, wo es rein dargestellt worden, eine fortschreitende Veränderung zu erleiden. Das Cyansäurehydrat verwandelt sich in unlösliche und lösliche Cyanursäure, der Aldehyd in einen bei $+ 2^\circ$ schmelzbaren Körper und in einen andern, welcher bei gewöhnlicher Temperatur und unter 120° fest bleibt.

Ueber die Benzoeunterschwefelsäure; von *Demselben*.

Herr Prof. Mitscherlich fand *), daß, bei der Einwirkung von wasserfreier Schwefelsäure auf Benzoesäure, sich eine Säure bilde, die er betrachtet, als aus 2 Atomen Schwefelsäure, einem Atom wasserfreier Benzoesäure und einem Atom Wasser bestehend. Mit Basen bildet diese Säure nach

*) *Annalen der Pharm.* XII. 314.

diesem ausgezeichneten Chemiker zwei Reihen von Salzen, indem das eine Atom Wasser abgeschieden wird, treten ein oder zwei Atome Basis an dessen Stelle, und bilden so ein saures oder ein neutrales Salz, nach folgendem Schema:

In seiner Abhandlung *) über „die Constitution der organischen Säuren“ zeigte Herr Prof. Liebig, daßs jedes Atom einer Basis bei seiner Verbindung mit einer Säure ein Atom Wasser aus dieser abscheidet, betrachtet man diese Säuren aber als Wasserstoffsäuren, so muß man annehmen, daßs jedes Atom Metall 2 Atome Wasserstoff eliminirt, welche sich mit dem Sauerstoff des Oxyds zu Wasser vereinigen, und dann abgeschieden werden.

Die folgenden Versuche wurden nun, auf Veranlassung des Herrn Prof. Liebig, in der Absicht angestellt, um zu sehen, ob sich die Benzoeschwefelsäure bei ihrer Vereinigung mit Basen ähnlich verhalte.

Ehe ich die Analyse der von mir untersuchten Salze beschreibe, will ich bemerken daßs alle Verbindungen dieser Säure mit Basen, wenn sie mit einem Ueberschuß vom Kalihydrat bis zur vollständigen Zersetzung erhitzt werden, einen Rückstand geben der schwefligsaures und schwefelsaures Kali enthält, ein Verhalten was den unterschwefelsauren Salzen angehört. Diese Säure enthält demnach keine *Schwefelsäure*, sondern *Unterschwefelsäure*.

Die Säure und ihre Salze wurden auf die von Herrn Prof. Mitscherlich angegebene Weise dargestellt. Das saure Barytsalz krystallisirt sehr leicht in regelmäßigen voll-

*) Annalen der Pharm. XXVI. 113.

324 *Fehling, über die Benzoeunterschwefelsäure.*

kommen ausgebildeten Krystallen des 2 und 1gliedrigen Systems: die Kernform ist die schiefe rhombische Säule mit den Winkeln:

$$g : c = 98^{\circ} 6'$$

$$g : g = 82^{\circ} 21'.$$

Die spitze Kante des vertikalen Prisma findet sich meistens durch die Fläche *n* abgestumpft, und das spitze Eck dieser Kante ist gewöhnlich durch die Fläche *d* ersetzt, diese beiden Flächen treten häufig zusammen auf; seltner finden sich die Oktaederflächen *o* und *o'*. Zwillingskrystalle, durch die Verwechslung zweier *g* Flächen gebildet, sieht man meistens.

Bei der Verbrennung dieser Salze ward chromsaures Bleioxyd angewandt, da diese Salze meistens sehr schwer verbrennen; bei dem geringen Wasserstoffgehalt, besonders des Blei- und Silbersalzes, wäre der durch das hygroskopische Kupferoxyd entstandene Fehler zu bedeutend geworden.

1,361 saures Barytsalz gaben 1,559 Kohlensäure, und 0,240 Wasser.

Dies macht in 100 Theilen:

Kohlenstoff 31,671

Wasserstoff 1,958

Nach der Formel sind in 100 Theilen dieses Salzes:

Kohlenstoff == 31,34

Wasserstoff == 1,84

Da die Analyse mit dieser Formel genau genug zusammentrifft, so ward dieses Salz nicht weiter untersucht.

Das neutrale Barytsalz wird durch Kochen des sauren Salzes mit kohlensaurem Baryt dargestellt, es ist sehr leicht in Wasser löslich, aus dieser Auflösung erhält man es schwierig in regelmäßigen Krystallen, es setzt sich meistens nur rindenförmig ab. Dieses Salz verträgt eine außerordentlich hohe Temperatur, ohne sich zu zersetzen: bei der Siedhitze des

Oels bleibt es noch unverändert. Glüht man es mit Salpeter, oder erhitzt man es mit Salpetersäure, so verpufft es sehr leicht, wenn man nicht sehr vorsichtig erhitzt, wohl weil es erst bei sehr hoher Temperatur, und dann plötzlich durch die ganze Masse sich zersetzt. Mit Salpeter und kohlensaurem Kali geglüht, zersetzt es sich leicht und vollständig, und beim Erhitzen der geglühten Masse mit verdünnter Essigsäure bleibt schwefelsaurer Baryt zurück, während in der Auflösung sich weder Baryt noch Schwefelsäure findet; es brauchte also nur der Baryt bestimmt zu werden, da die Unterschwefelsäure dann leicht durch Rechnung gefunden werden konnte.

Der Baryt ward als schwefelsaures Salz bestimmt, indem das Salz für sich verbrannt wurde, die noch zurückgebliebene Kohle ward mit etwas Salpetersäure weggenommen, und dann noch einige Tropfen Schwefelsäure zugesetzt.

I. 0,502 neutrales Barytsalz gaben 0,342 schwefelsauren Baryt = 68,127 p. c.

II. 0,546 Salz gaben 0,375 schwefelsauren Baryt = 68,681 p. c.

III. 0,480 Salz gaben 0,328 schwefelsauren Baryt = 68,333 p. c.

Die Verbrennung mit chromsaurem Bleioxyd gab folgende Resultate:

I. 0,909 Salz gaben 0,829 Kohlensäure u. 0,119 Wasser.

II. 0,869 — — 0,794 — — 0,115 —

Hieraus erhält man in 100 Theilen:

	I.	II.	III.
Unterschwefelsäure	21,080 —	21,252 —	21,144
Rohlenstoff . . .	25,214 —	25,297	
Wasserstoff . . .	1,454 —	1,464	
Sauerstoff . . .	7,542 —	6,914	
Baryt . . .	44,710 —	45,073 —	44,845
	100,000	100,000.	

Dies in Atomen berechnet giebt folgende Formel:

1 At. Unterschwefelsäure	902,320	—	21,300
14 — Kohlenstoff	1070,090	—	25,261
8 — Wasserstoff	49,918	—	1,178
3 — Sauerstoff	300,000	—	7,084
2 — Baryt	1913,760	—	45,177
	<hr/>		
	4236,088		100,000.

Das neutrale Bleisalz ward durch Kochen der Säure mit kohlensaurem Bleioxyd dargestellt; es ist in kaltem Wasser ungleich weniger als in heissem löslich, so dafs die heisse concentrirte Lösung nach dem Erkalten fast ganz fest wird; aus der weniger concentrirten Lösung erhält man feine Krystalle, die von einem Centrum strahlenförmig ausgehen, dem Wawellit ähnlich. Diese Krystalle bis 220° erhitzt verloren in zwei Versuchen 7,819 und 8,036 p. c. Wasser, entsprechend 4 Atomen Wasser. Die Unterschwefelsäure ist in diesem Salz in demselben Verhältnifs wie beim Barytsalz.

Das Bleioxyd ward als schwefelsaures Salz bestimmt, indem man wie beim Barytsalz verfuhr.

I. 0,512 trocknes Salz gaben 0,379 schwefelsaures Blei
= 74,023 p. c.

II. 0,539 trocknes Salz gaben 0,399 schwefelsaures Blei
= 74,025 p. c.

III. 0,552 trocknes Salz gaben 0,410 schwefelsaures Blei
= 74,274 p. c.

Mit chromsaurem Blei erhielt ich bei der Verbrennung:

I. Aus 1,0885 Salz 0,823	Kohlensäure und 0,102	Wasser
II. — 1,136 — 0,8595	— —	0,1045 —
III. — 1,822 — 1,364	— —	0,161 —

In 100 enthält dieses Salz:

	I.	II.	III.
Unterschwefelsäure	17,617	17,617	17,677
Kohlenstoff	20,931	20,920	20,700
Wasserstoff	1,041	1,022	0,981
Sauerstoff	5,958	5,986	6,004
Bleioxyd	54,453	54,455	54,638
	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000.</u>

Nach der dem neutralen Barytsalz entsprechenden Formel hätte man erhalten sollen:

1 At. Unterschwefelsäure	902,320	—	17,634
14 — Kohlenstoff	1070,090	—	20,935
8 — Wasserstoff	49,918	—	0,976
3 — Sauerstoff	300,000	—	5,890
2 — Bleioxyd	2789,000	—	54,565
	<u>5111,328</u>		<u>100,000.</u>

Das Silbersalz, auf ähnliche Weise, wie das Baryt- und Bleisalz dargestellt, ist leicht in Wasser löslich, unter der Luftpumpe krystallisirte es in kleinen gelblichen Krystallen, diese verloren beim Trocknen 4,195 p. c. Wasser, oder 2 Atome.

0,6825 trocknes Salz gaben 0,352 Silber.

1,2695 trocknes Salz gaben 0,954 Kohlensäure u. 0,116 Wasser.

Oder in 100 Theilen:

Unterschwefelsäure	17,215
Kohlenstoff . . .	20,776
Wasserstoff . . .	1,014
Sauerstoff . . .	5,604
Silberoxyd . . .	55,391
	<u>100,000.</u>

Nach der Berechnung erhält man nachstehende Resultate:

1 At. Unterschwefelsäure	902,320	—	17,267
14 — Kohlenstoff . . .	1070,090	—	20,478
8 — Wasserstoff . . .	49,918	—	0,955
3 — Sauerstoff . . .	300,000	—	5,742
2 — Silberoxyd . . .	2903,220	—	55,558
	<hr/>		
	5225,548	—	100,000.

Hiernach muß man also annehmen, daß in der Benzoeunterschwefelsäure 2 Atome basisches Wasser enthalten sind, von denen jedes durch 1 Atom einer fixen Basis vertreten werden, so daß man hiernach 2 Reihen Salze erhält:

Oder nehmen wir diese Säure für eine Wasserstoffsäure, so ist:

Die Entstehung dieser Säure erklärt sich mithin auf eine sehr einfache Weise. Wenn wasserfreie Schwefelsäure mit Benzoesäurehydrat zusammenkommt, so zerlegen sich beide wechselseitig. Die wasserfreie Benzoesäure giebt 2 At. Wasserstoff an einen At. Sauerstoff der Schwefelsäure ab, es entsteht Wasser und auf der andern Seite das Hydrat der Benzoeunterschwefelsäure: