s'est accentuée vers 10^h; l'étoile a atteint sa phase minima vers 11^h8; elle était alors de près de trois grandeurs au dessous de son éclat normal. Un intervalle d'une heure de ciel couvert nous a empêchés de voir, si l'éclat demeurerait constant pendant un certain temps au minimum. La recrudescence a été suivie, avec de fréquentes interruptions jusque 17^h2, heure à laquelle l'étoile était revenue à quelques dixièmes en dessous de son éclat normal.

Hier enfin, 28 octobre, nous avons constaté le commencement d'un minimum vers 10^h. A 13^h les nuages ont mis fin aux observations; à ce moment l'étoile avait diminué d'environ 1¹/₂ grandeur.

Uccle, 1909 Oct. 29.

De l'ensemble des estimations nous avons déduit la période $P = 4^d 11^h 5^m$; les observations de maximum d'éclat couvrant à peu près toute la période, celle-ci ne peut être plus courte. Les éléments suivants, non réduits au centre du soleil, représentent l'ensemble des observations:

Min. = 2418604.49 T. M. Greenw. + 4^d115^h·E.

L'étoile BD +32°4755 étant prise égale à 8^m5, on aurait

Eclat maximum = 8^m6

Eclat minimum = 11¹/₂^m.

Durée de la phase décroissante = environ 5 heures

Durée de la phase croissante = environ 6 heures.

G. Van Biesbroeck.

Ein sehr helles Meteor

wurde vom Unterzeichneten am 23. Oktober d. J. in Nischburg beobachtet. Das Aufleuchten begann 6^h3^m20^s M. E. Z. bei β Aurigae, von welchem Ort aus sich das Meteor als ein breiter hellblauer Lichtstreifen in horizontaler Richtung bewegte, um genau im Meridiane des Beobachtungsortes

plötzlich zu verschwinden. Diese Bahn wurde in 45^s zurückgelegt und die Gegend durch den Lichtausbruch auf kurze Zeit hell beleuchtet. Den Zeitungsberichten nach wurde dieselbe Erscheinung auch im Osten Böhmens beobachtet.

Observatorium Nischburg, 1909 Okt. 25.

L. Pračka.

Meteorbeobachtung.

Am 4. September d. J. gegen 10¹/₂ Uhr vormittags hat ein Bekannter von mir, der einen 6" parallaktisch montierten Refraktor auf seinem in 1^h0^m34^s östl. Länge von Greenwich und +47°49' Breite liegenden Landgute besitzt, das Fernrohr auf Kastor gerichtet, um sich zu überzeugen, ob er denselben als Doppelstern bei Tage sehen würde, und sah bei dieser Gelegenheit, nachdem die Einstellung auf Kastor

schon erfolgt war, durch das Gesichtsfeld des Suchers (1¹/₂ Zoll Öffnung und 2 Grad Gesichtsfeld) ein helles, scharf konturiertes, nicht kreisförmiges sondern mehr würfelförmiges Objekt ziehen und zwar in einer Sekunde, also relativ mit kleiner Geschwindigkeit. Die Richtung der Bewegung war von rechts nach links bzw. von Osten nach Westen und fast horizontal. Das Objekt war überraschend groß, jedenfalls größer als Venus.

Wien, 1909 Okt. 31.

J. Palisa.

Abonnements-Anzeige.

Die Herren Abonnenten, welche die Astronomischen Nachrichten ferner zu erhalten wünschen, werden ersucht, ihre Bestellung und Vorausbezahlung auf den folgenden Band baldmöglichst einzusenden, wofern es der Expedition nicht bekannt ist, daß sie als ständige Abonnenten angesehen werden wollen.

Für diejenigen Exemplare, welche von der Expedition der Astronomischen Nachrichten in Kiel, Moltkestraße 80, nummerweise franko versandt werden, beträgt der Bezugspreis pro Band 16 Mark. Der Band besteht aus 24 Nummern nebst Inhaltsverzeichnis und Register.

Den buchhändlerischen Vertrieb besorgt die Firma W. Mauke Söhne in Hamburg.

Geschlossene Bände, von Band 33 an, können jederzeit von der Expedition in Kiel zum Preise von 13 Mark pro Band bezogen werden. Bei Abnahme einer größeren Reihe von Bänden tritt Preisermäßigung ein, über welche in jedem besonderen Falle die Expedition Auskunft zu erteilen bereit ist.

Ein Verkauf von einzelnen Nummern der neueren Bände von Bd. 170 an findet, außer zum Zwecke der Komplettierung, nicht statt. Einzelne Nummern der älteren Bände können, so weit noch vorhanden, auch ohne diese Beschränkung zum Preise von 1 Mark pro Nummer von der Expedition bezogen werden.

Inhalt zu Nr. 4367. T. J. J. See. On the physical cause which has produced the small obliquity of the planet Jupiter, and on the obliquity of the other planets. 377. — L. Beneš. Photometrische Beobachtungen dreier langperiodischer Veränderlicher. 383. — R. Farry-Desloges. Mars. 385. — R. Fouckere. Observations de Mars. 387. — E. S. Manson, Jr. Measurements of Positions of Asteroids in 1908. 387. — T. H. Astbury. The Algol Variable Z (26.1900) Vulpeculae. 389. — G. Van Biesbroeck. Note sur la variable 21.1909 Andromedae. 389. — L. Pračka. Ein sehr helles Meteor. 391. — J. Palisa. Meteorbeobachtung. 391. — Abonnements-Anzeige. 391.