Zur Frage des Lichtwechsels des Sternes 190.1904 Cassiopeiae.

Diesen Stern hat A. Tass in A. N. 3991 und 4021 als veränderlich angezeigt. Šafařík benutzte denselben als Vergleichstern zu T Cassiopeiae. Aus seinen Beobachtungen habe ich die Größen für den verdächtigten Stern ermittelt und teile hier das Resultat meiner Untersuchung mit.

Als Vergleichsterne kommen folgende Sterne in Betracht:

z	=	BD + 55° 73	(8 ^m 0)	7 ^m 70
d	=	» + 54 50	(8.0)	8.25
β	=	» + 54 55	(8.3)	8.30
ω	=	» + 54 36	(8.3)	7.60
α	=	» + 55 54	(8.3)	7.85 Refl.
»	=	»	»	8.15 Refr.

Die nicht eingeklammerten Größen sind die aus den Beobachtungen Šafaříks abgeleiteten. (Refl. = Beob. am Reflektor, Refr. = Beob. am Refraktor).

Im ganzen liegen von dem Stern aus den Jahren 1883 bis 1890 95 Beobachtungen vor, welche nach den benutzten Instrumenten getrennt für 190.1904 Cassiopeiae (ν) folgende Größen ergeben:

Vgl.-Stern	ν	Reflektor	Refraktor
z	$=$	$7^m95 \pm 0^m16$	
d		7.95 ± 0.12	$7^m95 \pm 0^m10$
β		7.95 ± 0.05	
α		7.95 ± 0.05	7.95 ± 0.11
ω		7.95 ± 0.08	7.95 ± 0.09

Es ist demnach der Stern in der oben erwähnten Zeit von Šafařík stets in der Helligkeit $7^m95 \pm 0^m10$ beobachtet worden, und es erscheint daher sehr wahrscheinlich, daß derselbe in dem Zeitraume der Beobachtungen konstantes Licht hatte.

Bamberg, Sternwarte, 1909 Juli 14.

L. Pračka.

Eine ältere Beobachtung von γ Pegasi.

γ Pegasi wurde als Vergleichstern zu α Ceti von Šafařík im Jahre 1885 benutzt. Die Helligkeit wurde im Februar zu 4^m2 im Potsdamer System geschätzt, also 0^m9 schwächer als die Bestimmung von Müller und Kempf, und 1^m7 schwächer als die von Pickering. Da die Beobachtung Šafaříks kaum $\pm 0^m2$ unsicher ist, ist der Stern der Veränderlichkeit verdächtig (Potsdam. Publ. Bd. 17 pag. 287).

L. Pračka.

Beobachtungen des Planeten 1909 HF.

1909	M. Z. Kop.	α app.	$\log p\Delta$	δ app.	$\log p\Delta$
Aug. 21	14 ^h 33 ^m 55 ^s	20 ^h 57 ^m 38 ^s 04	9.445	+16° 6' 10".6	0.768
23	13 3 2	20 56 21.82	9.277	+15 58 36.4	0.765
26	13 5 30	20 54 33.52	9.319	+15 44 8.1	0.770
27	12 17 47	20 54 1.30	9.076	+15 38 49.0	0.780
28	11 3 26	20 53 31.61	8.700	+15 33 16.2	0.759

Kopenhagen, Universitäts-Sternwarte 1909 Sept. 1.

C. F. Pechüle.

Mars. Une terre a été vu émergeant de la calotte polaire par 120°. Elle ressemble à Argyre II qui se présente à 60°. Le canal Nectar est très large. Un autre très large également part de Solis Lacus pour rejoindre l'extrémité de Aonius Sinus.

Observatoire d'Hem, 1909 Sept. 2.

R. Jonckheere.

(365) Corduba. 1909 Aug. 23 12^h 18^m 8 Kgst. α 1909.0 = 22^h 33^m 6 δ 1909.0 = +2° 7'. Tägl. Bewegung: -0^m8 -9'. Gr. 11^m6. W. Lorenz.

Neuer Planet 1909 HH. 1909 Aug. 25 13^h 45^m 1^s Wien α app. = 23^h 31^m 53^s 78 (8.673) δ app. = -0° 47' 57".3 (0.821). Tägl. Bewegung: -34^s -9'.3. Gr. 12^m6. J. Palisa.

Personalnotiz. Mr. Ph. Fox, formerly at the Yerkes Observatory, assumed on Sept. 1 the directorship of the Dearborn Observatory, Evanston, Illinois, succeeding the late G. W. Hough.

Inhalt zu Nr. 4353-54. S. W. Burnham. Double star measures. 133. — R. Jonckheere. Mars. 159. — E. M. Antoniadi. Note sur la pâleur actuelle des taches de Mars. 161. — A. Abetti. Osservazioni di Pianetini. 161. — L. Pračka. Zur Frage des Lichtwechsels des Sternes 190.1904 Cassiopeiae. 163. — L. Pračka. Eine ältere Beobachtung von γ Pegasi. 163. — C. F. Pechüle. Beobachtungen des Planeten 1909 HF. 163. — R. Jonckheere. Mars. 163. — Kleine Mitteilungen. 163. — Personalnotiz. 163.