**Ein Fall von seltener Morphologie
und Lokalisation eines Cornu cutaneum.**

Von

Dr. J. Peyri,

Professor der Dermatologie an der Fakultät in Barcelona.

I. S., 68 Jahre alt, Landwirt, kein Alkoholiker, auch in der Familienanamnese kein Alkohol und keine Neoplasmen. Patient bis auf geringe Zeichen von Arteriosklerose vollkommen gesund. Auf der Haut, welche im allgemeinen nur senile Veränderungen zeigt, finden sich, besonders im Gesicht, vereinzelte seborrhoische Schuppen.

Ungefähr vor zwei Jahren trat auf dem rechten Fußrücken eine pilzförmige Geschwulst auf, mit einzelnen spitzen Exkreszenzen, welche Patient zu entfernen suchte, was ihm aber nicht gelang, da diese Elemente

sehr fest in der Tiefe hafteten. Subjektive Beschwerden verursachte die Geschwulst dem Patienten nicht, da er nach landesüblicher Sitte nur Sandalen zu tragen gewohnt war. Die Geschwulst wuchs nur langsam bis zu der aus der Abbildung ersichtlichen Größe.

Die Geschwulst maß ungefähr 6 cm im Durchmesser und erhob sich auf 2—3 cm über das umgebende Niveau. Die Umgebung war vollkommen normal, zeigte weder Entzündung, noch Veränderung der Farbe. Der Rand war mit harten, bräunlichen Hornschuppen bedeckt, die sich auch auf die Oberfläche fortsetzten. Die Basis der Geschwulst war in der Haut adhärent, aber mit dieser unter der Unterlage verschieblich.

Therapie: Exstirpation. Die Wunde wurde zum Teil vernäht, zum Teil durch Epidermistransplantation gedeckt. Auf dem Querschnitt erschien die zentrale Partie brüchig und hart.

Histologisch fand sich der gewöhnliche Befund, weder Embolien noch Hämorrhagien im Papillarkörper. Deutlich ausgesprochen war die nukleäre Degeneration der Hornzellen (Unna) ebenso wie in drei bereits früher von uns untersuchten Fällen. In der zentralen Partie finden sich Vakuolen. Der histologische Befund ist in Übereinstimmung mit der Anschauung Unnas und zeigt neben der Hyperkeratose eine Hyperakantose der Zellen der tieferen malpighischen Schichten.

Zusammenfassung: Unser Fall erscheint wegen seiner Topographie, Morphologie und durch seine ungewöhnliche Größe von Interesse.