klein ist. So z. B. verändern sich die Coefficienten der ersten Glieder in ρ , welche vorher waren: 9.091, 8.535, 8.636_n, in die folgenden: 9.160, 8.561, 8.839_n, und die Coefficienten der grössten elementären Glieder in nT , welche in der vorigen Abhandlung fehlerhaft angegeben sind und sein sollten: -44° , $+274^\circ$, -27° , nehmen die Werthe an: -70° , $+715^\circ$, -57° . Die Ursache hierzu liegt in dem Vorkommen eines kleinen Integrationsdivisors, $\zeta - \mu\sigma'_2 = 0.00001752$, welcher die Berechnung einer absoluten Bahn unsicher macht. Man findet also hier ein interessantes Beispiel des Umstandes, dass dieselben Schwierigkeiten, welche aus Commensurabilitäten zwischen den mittleren Bewegungen entstehen, sich beim Einführen von Perihel- und Knotenbewegungen wiederholen.

Im Anschluss hieran erlaube ich mir einige Betrachtungen über die Rechnungsmethoden hinzuzufügen, auf die man für die Ermittlung der elementären Glieder in der Relation zwischen der Länge und der Zeit hingewiesen ist. Da man mittelst der bisher zu Gebote stehenden Integrationsmethoden nicht verhindern kann, dass die kurzperiodischen Glieder erster Ordnung der störenden Masse durch Multiplicationen elementäre Glieder zweiter Ordnung der Masse geben, welche dann durch die zweimalige Integration nicht nur auf die nullte Ordnung reducirt werden, sondern auch, da die Grössen σ_n gegen die störende Masse

oft klein sind, sehr gross werden können, so muss man die Coefficienten dieser Glieder als Summen einer sehr grossen Anzahl einzelner Zahlenwerthe ermitteln. Dieser Umstand macht nicht nur die Rechnung mühsam und unsicher, sondern kann auch die Convergenz der Glieder zweifelhaft machen, da mit der Ordnungszahl der Excentricität und Neigung sowohl die Anzahl der einzelnen Zahlenwerthe, aus welchen sich der Coefficient zusammensetzt, wie auch die numerischen Werthe dieser einzelnen Beiträge wachsen. So z. B. wird bei Egeria der Coefficient des Gliedes in nT :

$$\eta \eta' \sin(\zeta v - \mu \zeta' v + \pi - \pi')$$

durch Summation von ungefähr 300 Zahlenwerthen ermittelt, beim Gliede

$$\eta \eta' I^2 \sin(\zeta v - \mu \zeta' v + \pi - \pi')$$

steigt diese Zahl zu 800 und bei:

$$\eta^3 \eta' \sin(\zeta v - \mu \zeta' v + \pi - \pi')$$

zu ungefähr 1900, wenn man die Entwicklung der Störungsfunktion bis zu Gliedern mit dem Argument: $\gamma v - \gamma v'$ erstreckt. Mit Rücksicht auf diese Umstände kann es in Frage gestellt werden, ob es erlaubt ist, die Glieder nach den Potenzen der Excentricitäten und Neigungen zu ordnen, wenn nicht diese besonders klein sind.

Strengnäs 1893 Aug. 31

K. G. Olsson.

Bestimmung der Bahn des Doppelsterns OΣ 82.

Von Prof. Dr. S. von Glasenapp.

Die Duplicität dieses Sterns wurde von Winkl. Geheirath Otto Struve in Pulkova entdeckt, die ersten Messungen wurden von Mädler in Dorpat angestellt; die Position für 1880 ist die folgende:

$$\alpha = 4^h 15^m 9^s \quad \delta = +14^\circ 46' \quad \text{Gr. } 7^m - 9^m.$$

Wir haben folgende Beobachtungen gesammelt:

t	θ	ρ	Beob.	Zahl der Nächte
1843.22	237°7	0.99	Mädl.	1
1845.96	231.7	0.90	Mädl.	1
1848.14	230.3	1.00	OΣ	1
1849.19	231.3	1.15	OΣ	1
1865.93	199.4	1.0	Δ	1
1866.13	192.4	1.0	Δ	1
1868.13	195.7	0.94	Δ	1
1870.76	192.3	—	Δ	1
1871.13	189.8	1.04	Δ	1
1878.13	177.1	0.74	Δ	1
1879.16	182.1	0.76	Hl.	2
.69	179.4	0.54	β	1
1891.01	151.6	0.79	Hl.	3
1892.00	149.3	0.62	β	2

Die letzten Beobachtungen von S. W. Burnham sind uns brieflich mitgetheilt.

Es ist zu bedauern, dass die Beobachtungen nicht

zahlreich sind; nur in einem Jahre (1879) haben zwei Beobachter diesen Doppelstern gemessen; in den übrigen Jahren sind die Messungen von einzelnen Beobachtern und meistens nur in einer Nacht ausgeführt. Deswegen kann man kaum erwarten, genaue Elemente zu erhalten; wir sind aber überzeugt, dass sorgfältige Messungen, welche im Laufe von fünf Jahren von mehreren Astronomen ausgeführt würden, Mittel liefern würden zu einer Bahnbestimmung, welche in ihrer Genauigkeit kaum den meisten bekannten Bahnen nachstehen möchte.

Aus den angegebenen Messungen bilden wir zuerst jährliche Mittel, indem wir sämtlichen Beobachtungen gleiche Gewichte zuschreiben. Wir erhalten:

t	θ	ρ	Zahl der Beobachter Nächte	
1843.22	237°7	0.99	1	1
1845.96	231.7	0.90	1	1
1848.14	230.3	1.00	1	1
1849.19	231.3	1.15	1	1
1866.03	195.9	1.00	1	2
1868.12	195.7	0.94	1	1
1870.95	191.1	1.04	1	2
1878.13	177.1	0.74	1	1
1879.42	180.8	0.65	2	3
1891.01	151.6	0.79	1	3
1892.00	149.3	0.62	1	2

Nach der graphischen Methode bestimmen wir folgende Elemente des Doppelsterns $\text{O}\Sigma 82$:

$$\begin{aligned} T &= 1945.01 & \lambda &= 296^\circ 7' \\ U &= 158.4 \text{ Jahre} & i &= 43.8 \\ n &= -2^\circ 27' 32'' & e &= 0.213 \\ \Omega &= 77^\circ 5' & a &= 0''.94 \end{aligned}$$

Diese Elemente stellen die Beobachtungen folgenderweise dar:

t	θ_o	θ_c	$\theta_o - \theta_c$	ϱ_o	ϱ_c	$\varrho_o - \varrho_c$
1843.22	237°.7	236°.5	+1°.2	0''.99	1''.03	-0''.04
1845.96	231.7	232.8	-1.1	0.90	1.02	-0.12
1848.14	230.3	229.8	+0.5	1.00	1.01	-0.01
1849.19	231.3	228.3	+3.0	1.15	1.01	+0.14
1866.03	195.9	202.0	-6.1	1.00	0.89	+0.11
1868.12	195.7	198.3	-2.6	0.94	0.88	+0.06
1870.95	191.1	193.0	-1.9	1.04	0.86	+0.18
1878.13	177.1	178.5	-1.4	0.74	0.82	-0.08
1879.42	180.8	175.7	+5.1	0.65	0.81	-0.16
1891.01	151.6	149.9	+1.7	0.79	0.79	0.00
1892.00	149.3	147.7	+1.6	0.62	0.79	-0.17

Von 1866 bis 1878 behalten die Differenzen $\theta_o - \theta_c$ dasselbe negative Zeichen; die Ursache könnte in der Ungenauigkeit der erhaltenen Elemente liegen, doch kann man dies nicht beweisen, weil einerseits die Zahl der Beobachtungen sehr gering ist, und andererseits weil die vier in Frage stehenden Beobachtungen sämtlich von Dembowski gemacht worden sind; man könnte also auch die Ursache

der Constanz der Zeichen durch dessen persönliche Gleichung erklären.

Wir betrachten die erhaltenen Elemente als provisorische und ersuchen die Herren Astronomen, welche Messungen, die noch nicht veröffentlicht sind, besitzen, dieselben uns mittheilen zu wollen sowie auch neue anzustellen, damit wir eine genauere Bestimmung unternehmen können.

Domkino 1893 August.

Prof. S. von Glasenapp.

Ueber die Declinationen von 6 Pulkowaer Hauptsternen.

Von Bernhard Wanach.

Die Erwartung, die ich in meinem Aufsatz über die Polhöhe von Pulkowa in A. N. 3092 ausgesprochen habe, dass die neue Repsold'sche Theilung des Pulkowaer Verticalkreises ähnliche Correctionen der 1845^{er} und 65^{er} Declinationen liefern werde wie der Meridiankreis (Romberg 1875) und das Passageninstrument im I. Vert., ist nicht ganz eingetroffen. Herr Nyrén hat mir freundlichst die 1885^{er} Declinationen der 6 von mir beobachteten Hauptsterne mitgetheilt, und diese geben die unten unter »W—P₈₅« auf-

geführten Abweichungen von meinen 1891^{er} Bestimmungen. Ich füge noch hinzu die Differenzen der 1845^{er} und 65^{er} Declinationen des Verticalkreises, der 55^{er} (Obs. de Poulk. T. VIII p. 357 ff.) und 75^{er} (Romberg) des Meridiankreises, und schliesslich der 1892^{er} Bestimmungen von Herrn Kostinsky (Sur les variat. de la latitude de Poulkovo. — Mélanges math. et astr. t. du bulletin de l'acad. imp. d. sc. de St.-Petersbourg T. VII livr. 3) am Passageninstrument im I. Vertical.

	$W - P_{45}$	$W - P_{55}$	$W - P_{65}$	$W - P_{75}$	$W - P_{85}$	$W - K$
β Cassiopeiae	+0''.90	+0''.22	+0''.61	+0''.21	+0''.49	0''.00
δ »	-0.23	-0.36	-0.11	+0.03	+0.01	+0.01
ν Ursae maj.	-0.19	+0.04	-0.34	+0.27	-0.07	-0.04
ϵ Draconis	+0.13	+0.02	+0.23	+0.29	+0.09	+0.02
ϑ »	-0.17	+0.18	+0.06	+0.18	-0.03	+0.12
σ »	—	+0.35	+0.05	+0.18	-0.30	+0.01
Mittel:	+0.09	+0.08	+0.08	+0.19	+0.03	+0.02
Mittlere Abweichung:	± 0.48	± 0.25	± 0.32	± 0.09	± 0.26	± 0.05

Wie man aus den »Mittleren Abweichungen«, die analog mittleren Fehlern abgeleitet sind, ersieht, stimmen die 85^{er} Declinationen zwar besser als die 65^{er} und 45^{er}, aber lange nicht so gut wie Herrn Romberg's Declinationen mit

denen des Passageninstruments im I. Vert. überein, wenn man von der mittleren Differenz der einzelnen Declinationssysteme absieht.

An dieser Stelle sei noch bemerkt, dass in meiner