(Aus der Kgl. Frauenklinik Dresden [Direktor: Med.-Rat Prof. Dr. E. Kehrer]
und aus dem Städt. Säuglingsheim Dresden [Dir. Arzt: Prof. Dr. Rietschel].)

Hintere Hals- und Nackendrüsen bei Säuglingen in den ersten neun Lebenstagen.

Von

Dr. med. **Theodor Jensen**,
Assistenzarzt der Kgl. Frauenklinik.

(Eingegangen am 8. Juli 1915.)

Die Rachenmandel wird heute allgemein bei Säuglingen als ein locus minoris resistentiae angesehen. Man weiß durch die Injektionspräparate von Wood, daß die hinteren Hals- und Nackendrüsen — die Glandulae nuchales und die Glandulae poststernomastoideae cervicales — die regionären Lymphdrüsen für die Rachenmandel, ja für das ganze retropharyngeale Gewebe darstellen. Man hat bis jetzt im allgemeinen angenommen, und Czerny erwähnt dies wiederholt in seinen Arbeiten über die exsudative Diathese, daß Nackendrüsen stets ein Beweis dafür sind, daß infektiöse Prozesse im Rachenraum vorhanden sind, ja Czerny sieht in dem Auftreten dieser Drüsen bei jungen Säuglingen ein sicheres Anzeichen einer erhöhten Neigung für Infektionen, einer „exsudativen Diathese“. Indessen fehlen heute noch exakte klinische Beobachtungen in größerem Maßstabe, um mit Sicherheit solche Schlüsse zu ziehen. So ist es z. B. unbekannt, ob auch bei Neugeborenen solch palpable Lymphdrüsen vorkommen, und es fehlt auch uns an einem größeren Material der klinische Beweis, daß Kinder, die solche Nackendrüsen bald nach der Geburt aufweisen, später sicher andere Zeichen der exsudativen Diathese zeigen. Um die eine Lücke hier auszufüllen, habe ich im Jahre 1913 auf Anregung von Herrn Prof. Rietschel-Dresden in der Kgl. Frauenklinik zu Dresden eine größere Anzahl von Kindern auf die erwähnten hinteren Hals- und Nackendrüsen, sowie auf die als Kieferdrüsen bezeichneten Glandulae submaxillares et tonsillares untersucht.

Die Untersuchungen, die gleich nach der Geburt und dann an jedem einzelnen Tage vorgenommen wurden, sind im allgemeinen nicht leicht; es gehört immerhin eine ziemliche Übung dazu, die Hyperplasie der

Hals- und Nackendrüsen, sowie der Kieferdrüsen mit Sicherheit zu fühlen. Da jedes Kind ungefähr zehnmal untersucht wurde, so sind im ganzen ca. 2400 Untersuchungen vorgenommen worden. Bei diesen ziemlich zeitraubenden Untersuchungen hat besonders Dr. Römer, seinerzeit Hilfsarzt an der Kgl. Frauenklinik, geholfen, dem ich deshalb bei dieser Arbeit zu Dank verpflichtet bin. Nur bei den Kindern wurde in der folgenden Tabelle ein positiver Ausfall der Untersuchung vermerkt, bei welchen von mir und einem anderen Kollegen Drüsen palpatorisch nachgewiesen wurden. Ein Irrtum, daß es sich wirklich um Drüsen handelt, kann wohl nicht vorliegen. Aus der Tabelle ist zu ersehen, an welchem der 9 Tage, in denen die Kinder in der Regel in der Klinik verbleiben, zum ersten Male und auf welcher Seite (R. oder L.) Drüsen gefunden wurden. In der letzten Rubrik ist neben anderen Angaben über Fieber usw. das Anfangsgewicht der Kinder notiert; K. bedeutet Knabe, M. Mädchen.

Name	0	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	Bemerkungen
1. Knauth 22. 9. 12. K.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3300 g 9. Tag 3050 g Fieber
2. Liebscher 22. 9. 12. K.	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3100 g 9. Tag 3150 g
3. Scheringer 24. 9. 12. K.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3100 g 9. Tag 3000 g
4. Fasolt 18. 9. 12. M.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2600 g 9. Tag 2650 g
5. Walther 20. 9. 12. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3200 g 9. Tag 3100 g
6. Leske 20. 9. 12. K.	—	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2900 g 9. Tag 2640 g
7. Rost 22. 9. 12. M.	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2300 g 9. Tag 2050 g Fieber
8. Hempel 23. 9. 12. M.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2000 g 9. Tag 2020 g
9. Lehmann 23. 9. 12. K.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3300 g 9. Tag 3000 g Fieber
10. Kokel 28. 9. 12. M.	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3500 g 9. Tag 3450 g Fieber
11. Mosig 28. 9. 12. M.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3200 g 9. Tag 3140 g

Name	0	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	Bemerkungen
12. Roth 29. 9. 12. M.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2400 g 9. Tag 2410 g
13. Schubert 28. 9. 12. K.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3800 g 9. Tag 3840 g
14. Wächter 29. 9. 12. M.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 4050 g 9. Tag 3820 g Fieber
15. Kühn 13. 12. 12. M.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2800 g 9. Tag 2780 g
16. Polster 2. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3770 g 9. Tag 3630 g Angina der Mutter am 3. Tage.
17. Grüner 3. 5. 13. K.	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2050 g 9. Tag 2120 g
18. Schwiel 3. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2900 g 9. Tag 3060 g
19. Kanneberger 7. 5. 13. M.	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 4600 g 9. Tag 4550 g
20. Heinrich 2. 5. 13. K.	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3200 g 9. Tag 3300 g
21. Schreiber 7. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2900 g 9. Tag 3060 g
22. Hoffmann 9. 5. 13. K.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3500 g 9. Tag 3520 g
23. Hoyer 9. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3450 g 9. Tag 3570 g
24. Steglich 10. 5. 13. K.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2800 g 9. Tag 2650 g Fieber
25. Richter 10. 5. 13. M.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 1900 g 9. Tag 1930 g
26. Rentsch 10. 5. 13. M.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3200 g 9. Tag 3070 g Fieber
27. Mehnert 10. 5. 13. M.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3500 g 9. Tag 3700 g
28. Noack 10. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2450 g 9. Tag 2520 g
29. Reinhardt 14. 5. 13. M.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2500 g 9. Tag 2510 g
30. Teschler 15. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3000 g 9. Tag 3020 g

Name	0	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	Bemerkungen
31. Barzyk 17. 5. 13. K.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 1720 g 9. Tag 1720 g
32. Barzyk 17. 5. 13. K.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Fieber 1. Tag 1650 g 9. Tag 1660 g
33. Kummer 25. 5. 13. M.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2100 g 9. Tag 2000 g
34. Kummer 25. 5. 13. M.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2180 g 9. Tag 2030 g
35. Rehork 25. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2050 g 9. Tag 1950 g
36. Hoffmann 26. 5. 13. K.	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	Frühgeburt 1. Tag 2350 g 9. Tag 2200 g
37. Hoffmann 27. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	Fieber 1. Tag 2170 g 9. Tag 2170 g
38. Tennert 30. 7. 13. K.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2980 g 9. Tag 2950 g
39. Grohs 7. 5. 13. M.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2850 g 9. Tag 2730 g
40. Brandt 8. 5. 13. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3000 g 9. Tag 3280 g
41. Thierbach 11. 5. 13. K.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2800 g 9. Tag 2580 g
42. Müller 12. 5. 13. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3250 g 9. Tag 3290 g
43. Warnek 12. 5. 13. K.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3350 g 9. Tag 3230 g
44. Utta 12. 5. 13. K.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Fieber 1. Tag 2450 g 9. Tag 2420 g
45. Hickel 23. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2500 g 9. Tag 2750 g
46. Wend 19. 5. 13. K.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3200 g 9. Tag 3270 g
47. Mehnert 19. 9. 12. M.	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	Fieber
48. Schumann 20. 9. 12. K.	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	
49. Javos 23. 9. 12. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Fieber über 40° Halsabsceß 4 Incisionen am 8. u. 9. Tage

Name	0	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	Bemerkungen
50. Lose 25. 9. 13. M.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	3250
51. Triebisch 26. 9. 13. K.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	2300
52. Frießel 26. 9. 13. K.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2900 g
53. Schuster 29. 9. 13. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3250 g
54. Schneider 21. 9. 13. K.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2710 g
55. Winkler 2. 10. 12. M.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2500 g
56. Brüner 13. 10. 12. M.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3200 g
57. Brenckel 25. 9. 12. K.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 1700 g
58. Becker 26. 9. 13. K.	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3250 g
59. Arend 30. 9. 12. K.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Kaiserschnitt 1. Tag 3150 g
60. Fleischer 4. 10. 12. K.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2900 g
61. Rudolf 2. 5. 13. K.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3450 g
62. Höhnemann 7. 5. 13. K.	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3250 g
63. Müller 8. 5. 13. M.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3250 g
64. Frauendorf 16. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2500 g
65. Hauptmann 16. 5. 13. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2500 g
66. Pech 15. 5. 13.	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3450 g
67. Jäger 19. 5. 13. K.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3250 g
68. Riegel 18. 5. 13. K.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3400 g
69. Gräschwitz 19. 5. 13. M.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3000 g
70. Kirsten 19. 5. 13. M.	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	Steißlage 1. Tag 2700 g
71. Schneekau 21. 5. 13. K.	—	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3100 g
	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	

[illegible]

Name	0	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag	Bemerkungen
93. Weidemann 13. 7. 13. K.	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2600 g
94. Tschorn 14. 7. 13. M.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3300 g
95. Lange 15. 7. 13. K.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2800 g
96. Thierbach 6. 7. 13. K.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3250 g
97. Prüfer 16. 7. 13. M.	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3200 g
98. Schrieger 19. 7. 13. M.	—	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3800 g
99. Brandstadt 19. 7. 13. M.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3350 g
100. Strohmeyer 19. 7. 13. M.	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3250 g
101. Schröder 19. 7. 13. M.	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 2250 g
102. Bode 20. 7. 13. M.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 3500 g
103. Müller 16. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	R.	R.	R.	R.	R.	1. Tag 3100 g
104. Lehmann 11. 5. 13. M.	—	—	—	—	—	L.	L.	L.	L.	L.	1. Tag 2800 g

Im ganzen kamen 240 Kinder zur Untersuchung. Bei 104, das sind ca. 43%, von ihnen waren, wie aus der Tabelle hervorgeht, Nackendrüsen nachweisbar. Die Nackendrüsen wurden nachgewiesen

24 mal gleich nach der Geburt,

24 mal vom 1. Tage an,

16 mal „ 2. „ „

14 mal „ 3. „ „

5 mal „ 4. „ „

9 mal „ 5. „ „

4 mal „ 6. „ „

2 mal „ 7. „ „

46 mal wurden die Kinder 3stündlich gemessen und bei 12 von diesen zeigte sich Fieber; die anderen waren in den ersten neun Tagen fieberfrei. Irgendein direkter Zusammenhang des Fiebers mit den Lymphdrüsenanschwellungen konnte nicht nachgewiesen werden. Von diesen 46 Kindern erreichten 23 nicht das Initialgewicht am 9. Tage.

Geschwollene Kieferdrüsen, welche durch Lymphgefäßstränge mit den Tonsillen in Verbindung stehen, habe ich bei den Kindern in den ersten neun Lebenstagen nicht ein einziges Mal nachweisen können, allerdings sind sie nicht so leicht der Palpation zugänglich.

Welche Schlüsse dürfen wir nun aus unseren Beobachtungen ziehen? Wir meinen, daß Lymphdrüsenanschwellungen der Nackengegend beim Kind in den ersten Lebenstagen durchaus nicht immer durch exogene Infektionen vom Rachenraum bedingt sein müssen, wie es z. B. Czerny annimmt. Man mag zugeben, daß bei einem Teil dieser Kinder eine Infektion im Spiele ist, und man kann sich sehr wohl vorstellen, daß die Drüsenanschwellungen mit dem ersten Eintritt von Scheidenbakterien in den Mund des Kindes bei der Passage durch den Geburtskanal zusammenhängen können, oder daß eine leichte Infektion des adenoiden Gewebes stattfindet (Schnupfen, Grippe). Doch muß es unbedingt noch andere Ursachen für die Drüsenhyperplasien geben, da sie in einem unserer Fälle bei einem Kind nachgewiesen wurden, das durch klassischen Kaiserschnitt, der vor erfolgtem Blasensprung und vor Eintritt des kindlichen Kopfes ins Becken ausgeführt wurde, zur Welt kam und da sodann die häufigen Befunde von Drüsenanschwellungen gleich nach der Geburt unmöglich durch eine Infektion erklärt werden können.

Sodann glauben wir berechtigt zu sein, bei der großen Häufigkeit des Befundes diesem keine allzu große pathologische Bedeutung zusprechen zu dürfen. Es scheint uns auch zweifelhaft, ob die Drüsenhyperplasien stets mit einer angeborenen Konstitutionsanomalie — auch bei Ausschluß einer Infektion — in Beziehung zu bringen sind. Wir können bis jetzt nur das mit Sicherheit sagen, daß das Kind der ersten Lebensstage sehr leicht zu Lymphdrüsenanschwellungen, besonders zu solchen der gut palpablen Nackendrüsen neigt, und daß diese Schwellungen nicht nur angeboren sein können, sondern sogar bei Kindern beobachtet werden, die den Geburtskanal nicht passiert haben, vielmehr durch Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind (wie Fall Nr. 59 lehrt).

Ob Kinder mit Drüsenhyperplasien, also sog. „Drüsenkinder“, später Lymphatiker im Sinne Heubners oder gar exsudativ im Sinne Czernys werden, darüber läßt sich bis jetzt nichts Sicheres aussagen; erst Jahre hindurch konsequent geführte Aufzeichnungen können bei größerem Material diese Frage entscheiden.

Nachtrag: Durch meine Einberufung ist das Erscheinen der Arbeit verzögert worden. So ist es gekommen, daß sich bereits Coerper

(Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. XIII, S. 462) mit meiner Arbeit befaßt, die ihm durch den Korrekturbogen bekannt war. Coerper hat nun bei Neugeborenen in den ersten Lebenstagen niemals die hinteren Hals- und Nackendrüsen palpieren können, wohl aber bei fast allen Neugeborenen Achseldrüsen. Erst vom 3. Tage sind nach ihm auch Hals- und Nackendrüsen palpabel, und Coerper will deshalb diese Vergrößerung „stets“ auf infektiöse Prozesse zurückführen. Wir halten unsere Befunde voll aufrecht, und müssen auch ablehnen, daß dafür Täuschungen in der Untersuchung verantwortlich gemacht werden sollen. Gerade auf die Technik haben wir besonders geachtet und wenn die Tatsache, die auch Coerper zugibt, feststeht, daß es angeborene palpable Lymphdrüsen beim Neugeborenen gibt, ja dies ein sehr häufiges Symptom z. B. für die Achseldrüsen ist, so sehen wir keinen Grund ein, diese Tatsache für andere Lymphdrüsen nicht anerkennen zu wollen.

Fig. 1 (zu Tabelle I) Variation der Körperlänge 6-jähriger Münchner Knaben, gefunden und berechnet.

Fig. 3. Variationskurven der Körperlänge von Schulmädchen.

Fig. 4. Variationskurven der Körperlänge 6-jähriger Mädchen aus zwei verschiedenen Standesklassen.

Fig. 5. Variationskurven des Körpergewichtes 6-jähriger Mädchen aus drei verschiedenen Standesklassen.

Fig. 6. Menschliche Längenwachstumskurve (A) verglichen mit der Kurve $x = ny^3$ (B, $n = 4,75$).

Fig. 7. Verhalten des Längen-Gewichts-Index im Laufe des Wachstums, berechnet vom Verf. nach zwei Individualbeobachtungen von Seitz-Camerer sen. $\bar{Q}$ u. $\bar{\sigma}$ a, und nach Kollektivdaten von Friedenthal $\bar{\sigma}$ b.

Fig. 11.

Fig. 12.