Über Aberration und *Michelson*versuch. Von *K. Vogtherr*.

Die Beobachtungen und Experimente, deren anscheinende Unvereinbarkeit mit den bisherigen Vorstellungen der Ätherphysik zur Relativitätstheorie und »Abschaffung« des Äthers geführt haben, haben insgesamt die Geschwindigkeit und Richtung der Lichtfortpflanzung in ihrem Verhältnis zum Bewegungszustand des Lichtmediums und des Beobachters zum Gegenstand. Dabei dürfte es sich auch für diejenigen, welche die neuen Gesichtspunkte, die die Relativitätstheorie in die Physik einführen will, ablehnen und an der Äthervorstellung als dem unerläßlichen Korrelat der endlichen, von der Bewegung der Lichtquelle unabhängigen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Lichtwellen festhalten, wohl als immer wahrscheinlicher herausstellen, daß die bisherigen Anschauungen vom Wesen des Lichts und von seiner Ausbreitung im Raum für eine Lösung des Problems unzulänglich sind und an der Hand der neuen Tatsachen abgeändert werden müssen. Bei dem Mangel, ja vielleicht der prinzipiellen Unmöglichkeit einer direkten experimentellen Beobachtung der Lichtausbreitung in Äther von wechselndem Bewegungszustand¹⁾ steht es uns ja frei, neue Vorstellungen über das Verhalten des Lichtes bzw. der elektromagnetischen Wellen in diesem Falle zu ersinnen und neue Gesetzmäßigkeiten dafür aufzustellen, solange wir dabei nur Widersprüche mit der bisherigen Erfahrung und mit Denknöthigkeiten vermeiden, welcher letzterem Konflikt unseres Erachtens die *Einsteinsche* Relativitätstheorie verfallen ist. Dabei ist vor allem ein Gesichtspunkt festzuhalten: Elektromagnetische Schwingungen im Äther sind etwas anderes als mechanische Schwingungen eines elastisch gedachten Äthers. Die elektromagnetische Lichttheorie birgt vielleicht Möglichkeiten in sich, die der mechanischen nicht zukamen. Im folgenden wollen wir versuchen, auf Grund dieser Möglichkeiten eine allen Tatsachen Rechnung tragende Vorstellung von dem Vorgange der Lichtausbreitung in bewegtem Äther wenigstens in Umrissen anzudeuten.

Suchen wir zunächst, um unsere Aufgabe deutlich zu erkennen, aus den zahlreichen in Zusammenhang mit dem Problem stehenden Beobachtungen die wichtigsten als die Repräsentanten der übrigen auszusondern, so läßt sich sagen:

Aberration, *Michelson*versuch und Unabhängigkeit der Geschwindigkeit des Lichts von der Geschwindigkeit der Lichtquelle, wie sie sich aus den Doppelsternbeobachtungen ergibt, sind die drei fundamentalen Tatsachen, deren Verständnis aus einem Gesichtspunkt heraus so große Schwierigkeiten bereitet. An sie reihen sich noch als wichtige Experimente an: die gleich dem *Michelson*versuch negativ ausgefallenen elektromagnetischen Versuche, den Bewegungszustand der Erde durch den Äther nachzuweisen, und der wichtige Versuch von *Sagnac*²⁾, welcher auch für irdische Lichtquellen die Unabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Bewegung der Lichtquelle feststellte. Er zeigt so als Gegenstück zum *Michelson*versuch, daß auch dieser sehr wahrscheinlich positiv ausfallen müßte, wenn er in bewegtem Äther angestellt würde, und spricht im Verein mit diesem, sofern man nicht die *Lorentz*-Kontraktion zu Hilfe rufen will, für die Annahme, daß Erde und Äther sich zueinander ganz oder nahezu in Ruhe befinden. Dagegen scheinen uns der meist auch an erster Stelle genannte *Fizeau*-Versuch und das *Dopplersche* Prinzip von geringerer Bedeutung zu sein. Ersterer, weil er gar nicht darüber entscheidet, ob Erde und umgebender Äther zueinander bewegt sind oder nicht, denn der Äther könnte ja zugleich mit der Erde eine kosmische Eigenbewegung besitzen und zusammen mit den Planeten um die Sonne rotieren, und es braucht auch abgesehen davon nicht gerade die Reibung in der bewegten Erdatmosphäre für die Mitbewegung des Äthers verantwortlich gemacht zu werden; letzteres, weil es sich jeder Darstellung ohne besondere Schwierigkeit einfügt und offenbar von stationären Bewegungen des Äthers unabhängig ist³⁾. — Erwähnt seien auch noch die Mitführungsversuche von *O. Lodge*⁴⁾, welcher zeigte, daß ein zwischen rotierenden Stahlscheiben an deren Peripherie verlaufender Lichtstrahl keine merkliche Änderung seiner Geschwindigkeit erfährt, woraus er schloß, daß der Äther zwischen den Stahlscheiben nicht in Mitbewegung versetzt wurde, also keine oder nur sehr geringe Reibung zwischen Äther und gewöhnlicher Materie besteht.

Was nun Aberration und *Michelson*versuch betrifft, so legen die Beobachtungen, wenn man sie nur ohne theoretische

¹⁾ Da nach der neueren aus der elektromagnetischen Dispersionstheorie sich ergebenden Ableitung des *Fresnelschen* Mitführungskoeffizienten der Äther im *Fizeau*-Versuch gar nicht in Bewegung gesetzt wird, Materie bei ihren Bewegungen also überhaupt nicht den Äther mitnimmt, so ergibt sich nach dieser Auffassung die Unmöglichkeit, im Experiment das Eintreten eines Lichtstrahls aus relativ ruhendem in relativ bewegtem Äther, bzw. seinen Verlauf in ungleichförmig bewegtem Äther zu beobachten, gleichgültig, ob man den Äther als im Raume ruhend oder mit der Erde bewegt ansieht. Über eine andere Möglichkeit der Auffassung siehe die folgenden Ausführungen.

²⁾ Compt. Rend. 157, 708 u. 1410, 1913.

³⁾ Denkt man sich Lichtquelle und Beobachter ruhend und zwischen beiden beliebige gleichförmige oder beschleunigte, jedoch stationäre Ätherbewegungen, so ist es einleuchtend, daß den Beobachter in einem gewissen Zeitabschnitt stets ebensovielen Lichtwellen passieren müssen, als von der Lichtquelle ausgehen, ein Dopplereffekt also nicht auftreten kann. Andernfalls müßten sich ja die Lichtwellen zwischen beiden immer mehr zusammendrängen oder auseinanderziehen, was, solange sich an dem Bewegungszustand des Äthers nichts ändert, unmöglich ist.

Aus dem gleichen Grunde kann auch in der »klassischen« Physik, d. h. solange an den Grundbegriffen über Raum und Zeit festgehalten wird, keine durch Gravitationswirkung hervorgerufene, von der Entfernung der Lichtquelle abhängige »Rotverschiebung der Spektrallinien« auftreten. Es müßten denn unterwegs, entfernt von der Lichtquelle, neue Wellen entstehen oder verschwinden, was wohl kaum als möglich anzunehmen ist. Die Ausführungen *Mohorovicic's* in Annal. d. Physik 66, 227, 1921, können wir deshalb nicht für richtig halten. — Der Dopplereffekt ist (in erster Annäherung) stets nur von den relativen Bewegungen von Lichtquelle und Beobachter abhängig.

⁴⁾ Phil. Trans. 184 A, 727, 1893.

Voreingenommenheit im Zusammenhang mit der Gesamtheit der bis jetzt vorliegenden sonstigen Erfahrungen betrachtet, die Vermutung nahe, daß das von einem Himmelskörper und einer irdischen Lichtquelle kommende Licht (wenigstens in der Nähe letzterer) eine wesentliche Verschiedenheit in seiner physikalischen Konstitution aufweist, obwohl für beide der Satz von der Unabhängigkeit der Geschwindigkeit des Lichts von der Geschwindigkeit der Lichtquelle gilt¹⁾. Es wäre also sehr wesentlich für die Theorie des Lichts in den verschiedensten Experimenten, das Verhalten des außerirdischen Lichts mit dem irdischen Lichtquellen aufs genaueste mit modernen Hilfsmitteln zu vergleichen (auf zwei wichtige derartige Experimente werden wir in folgendem noch zu sprechen kommen). Die einfachste, den Beobachtungen am wenigsten Zwang antuende Deutung der in Rede stehenden beiden Phänomene ist nun offenbar die: Das aus dem Himmelsraum kommende Licht besitzt eine Relativbewegung gegenüber dem irdischen Beobachter, welche von der Bewegung der Erde herrührt, das Licht irdischer Lichtquellen besitzt keine derartige Relativbewegung²⁾. Freilich ist diese Auffassung noch keine »Erklärung« der Erscheinungen, denn sie scheint zunächst unvereinbar mit der Annahme eines Lichtäthers zu sein. Das Licht der Himmelskörper und das irdischer Lichtquellen hätte ja dann verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeit relativ zu dem an der Erdoberfläche vorhandenen Äther, was dem Satz von der Konstanz der Wellengeschwindigkeit relativ zum Medium widerspricht. Es ist nun freilich nichts Unerhörtes mehr, daß sich im Gebiet der Strahlung Erscheinungen bemerkbar machen, welche nur schwer mit der reinen Wellentheorie vereinbar zu sein scheinen. So sagt auch *A. Einstein*: »Es ist sogar unleugbar, daß es eine ausgedehnte Gruppe von die Strahlung betreffenden Tatsachen gibt, die sich weit eher vom Standpunkte der *Newtonschen* Emissionstheorie des Lichts, als vom Standpunkte der Undulationstheorie begreifen lassen. Deshalb ist es meine Meinung, daß die nächste Phase der Entwicklung der theoretischen Physik uns eine Theorie des Lichtes bringen wird, welche sich als eine Verschmelzung der Undulations- und Emissionstheorie des Lichtes auffassen läßt.«³⁾ *A. Einstein* hat in diesen Sätzen, ohne es zu beabsichtigen, die Grundlage seiner Theorie selbst in Zweifel gestellt. Denn wenn eine derartige neue Theorie des Lichts für möglich gehalten wird, so ist es offenbar verfrüht, an einer Erklärung der Aberration bei mit der Erde bewegtem Äther zu verzweifeln. Die Aberration würde dann eben in die der Emissionsvorstellung entsprechende Gruppe der Erscheinungen einzureihen sein. In dieser neuen, aus der Verschmelzung der Undulations- und Emissionstheorie hervorgehenden Theorie des Lichts würde ja offenbar der Widerspruch zwischen Aberration und *Michelson*-versuch beseitigt sein, welcher gerade auf dem zwischen beiden Theorien bis-

her vorhandenen Gegensatz beruht. Andererseits ist die Relativitätstheorie zu einer derartigen Synthese unfähig, da sie sich nicht mit dem Äther verträgt, der nun einmal die unerläßliche Voraussetzung jeder Wellenvorstellung ist.

Die Auffassung der Aberration als eine auf die Emissionsvorstellung hinweisende Erscheinung führt also geradezu auf den Kern des Problems, auf die schwierige Frage: Wie läßt sich die zu einer umfassenden Erklärung der Erscheinungen unerläßliche Synthese der Emissions- und Undulationstheorie vollziehen? Der erste und wichtigste Schritt dazu scheint uns bereits dadurch getan zu sein, daß man ausgehend vom Strahlungsdruck zu einer neuen Auffassung der Masse und Trägheit gelangt ist, die bereits viel an Sicherheit gewonnen hat, nämlich zu der Vorstellung, daß dem in einem gewissen Raumteil vorhandenen Energiegehalt ein gewisser Betrag an Masse zukommt, wobei die Beziehung $m = E/c^2$ bestehen soll⁴⁾.

Diese Masse und Trägheit der Energie im allgemeinen kommt auch der strahlenden und Lichtenergie zu, auch ihr entspricht eine, wenn auch noch so geringe Masse, welche mit der Geschwindigkeit der strahlenden Energie, also mit Lichtgeschwindigkeit bewegt ist. Dadurch bekommt das Licht, in mancher Hinsicht wenigstens, eine ähnlich stoffliche Natur, wie sie ihm die Emissionstheorie seinerzeit beilegte, und es bekommt auch »Widerstand gegen Bewegungsänderung«, was ja nur ein anderer Ausdruck für träge Masse ist.

Daß freilich die »Lichtmasse« nach dieser Auffassung kein Stoff im Sinne der Emissionstheorie sein kann, geht daraus hervor, daß sie in keiner Weise die von der Undulationstheorie geforderte Ausbildung der Wellen und die auf ihr beruhende Interferenz, Beugung und ungehinderte gegenseitige Durchdringung des von verschiedenen Richtungen kommenden Lichts stören darf. Die Lichtmasse folgt vielmehr stets der Ausbildung der Wellen und der durch sie hervorgerufenen räumlichen und zeitlichen Verteilung der elektromagnetischen Energie, sie ist ebenso wie die elektromagnetischen Kräfte, denen sie ihr Dasein verdankt, eine Richtungsgröße, die sich genau wie diese in geometrischer Weise addiert. Sie zeigt also ein differenzierteres Verhalten als die Masse, wie sie uns von der gewöhnlichen Materie her bekannt ist.

Kommt nach dieser Auffassung dem Licht eine Art Doppelnatur zu, indem es einerseits auf elektromagnetischen Schwingungen beruht, andererseits sich in mancher Beziehung wie ein fortgeschleudertes Stoff verhält, so muß es von vornherein zweifelhaft erscheinen, wie sich Licht verhalten wird, das aus ruhendem in bewegten Äther übertritt. Die reine Wellentheorie fordert eine momentane Mitführung des Lichts durch den Äther, die reine Emissionstheorie kennt keinen Äther und daher auch keine Beeinflussung der Richtung und Geschwindigkeit des Lichtstrahls durch bewegten Äther. Ver-

¹⁾ Für irdische Lichtquellen ist das durch den Versuch von *Sagnac*, für Sterne durch die Doppelsternbetrachtungen *de Sitter's* (Phys. Zeitschr. 14, 1267, 1913) nachgewiesen. Es wird sich allerdings zeigen, daß nach unserer Auffassung für beide Fälle der Grund ein verschiedener ist, und daß die Doppelsternbetrachtungen für die Unabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit nicht beweisend sind, wenn man, wie wir es tun, annimmt, daß auch bei den Doppelsternen der Äther, in dem die Lichtemission stattfindet, mit diesen mitbewegt ist.

²⁾ Diese Ansicht vertritt auch *P. Lenard*. Vergl. die später folgende Anmerkung.

³⁾ Physikal. Zeitschr. 10, 817, 1909.

⁴⁾ Es muß darauf hingewiesen werden, daß man zum Begriff der Masse und Trägheit der Energie und zur Ableitung obiger Formel auch unabhängig von den besonderen Gedankengängen der Relativitätstheorie gelangen kann und daß schon 1904 *F. Hasenöhr* von einer »scheinbaren« Masse und Trägheit der strahlenden Energie spricht (Wien. Akad. 113, 1039, 1904). Siehe auch *G. N. Lewis*, Phil. Mag. 16, 705, 1908, und *P. Lenard*, Starks Jahrb. 17, 340, 1921.

hält sich aber das Licht wie Masse, deren Bewegungszustand geändert werden soll, so besteht die Möglichkeit, daß eine gewisse Zeit erforderlich ist, um diese Änderung in vollem Umfange herbeizuführen, ebenso wie ein im Winde fallender Körper nicht momentan, sondern erst nach Ablauf einer gewissen Zeit die volle Windgeschwindigkeit als seitliche Komponente seiner Bewegung annimmt. Nehmen wir nun als Ergebnis der Versuche von *Michelson* und *Sagnac* an, daß Erde und Äther in deren näheren Umgebung den gleichen oder nahezu gleichen Bewegungszustand besitzen, so haben wir in der Aberration ein von der Natur angestelltes Experiment vor uns, um die aufgeworfene Frage, wie sich Licht beim Eintritt in Äther von verändertem Bewegungszustand verhält, zu beantworten. Die Antwort fällt dahin aus, daß die Richtung der Lichtfortpflanzung durch bewegten Äther tatsächlich oder wenigstens scheinbar unverändert bleibt, d. h. daß zum mindesten in der Zeit, in welcher das Licht den mit der Erde bewegten Äther durchläuft (etwa 0.001 sec., wenn man die Mitbewegung des Äthers nur in der Atmosphäre annimmt), eine etwaige Mitführung des Lichts durch den Äther noch unterhalb der Beobachtungsgenauigkeit liegt. Die Aberration in bewegtem Äther ist also nach unserer Ansicht eine auf die Trägheit der strahlenden Energie zurückzuführende Erscheinung.

Die der vorgetragenen Auffassung zu Grunde liegende, an sich einfache Vorstellung ist mithin die, daß Licht, das bei seiner Ausbreitung im Raume in Äther von verändertem Bewegungszustand übertritt, nicht momentan die von der Wellentheorie verlangte neue Geschwindigkeit und Richtung annimmt, sondern wegen der mit seinem Energiegehalt verbundenen Trägheit erst nach Ablauf einer vorläufig unbestimmten Zeitdauer. Das Licht besitzt also Widerstand gegen Bewegungsänderungen, welche ihm durch die Bewegungen des Äthers übermittelt werden, es ist träge und folgt den von der Wellentheorie geforderten Bewegungsänderungen nicht momentan, darin liegt unseres Erachtens das Geheimnis der Aberration. Dabei ergibt sich rein theoretisch, und zunächst ohne Rücksicht auf die Erfahrung, eine zweifache Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten: Es kann nämlich erstens die Momentanbeschleunigung des Lichts an einem bestimmten Punkte von Null bis zum vollen Betrage der Momentanbeschleunigung des Äthers an der betreffenden Stelle variieren, und dementsprechend können alle Werte zwischen völlig fehlender Mitführung (reine Emissionstheorie) und sofortiger vollständiger Mitführung (reine Undulationstheorie) an sich möglich sein, und es kann zweitens die Momentanbeschleunigung des Lichts innerhalb obiger Grenzen in der Wellenebene und senkrecht dazu verschiedene Beträge aufweisen. Die Erfahrung schränkt diese Möglichkeiten dahin ein, daß eine momentane Mitführung des Lichts in vollem Betrage durch den Äther in den Richtungen der Wellenebene wegen der Aberration nicht stattfinden kann, während andererseits das Gegenteil, nämlich die völlig fehlende Mitführung in diesen Richtungen der bis jetzt vorliegenden Erfahrung nicht widersprechen würde, jedoch wenn wir uns von der Analogie mit dem Verhalten in der Richtung der Wellennormale und auch mit dem Verhalten gewöhnlicher Materie leiten lassen

wollen, nicht gerade wahrscheinlich ist. Was andererseits die Mitführung des Lichts durch bewegten Äther in der Fortpflanzungsrichtung betrifft, so folgt aus den Beobachtungen an Doppelsternen, daß eine derartige Mitführung stattfinden muß, wenn man, wie wir es tun, annimmt, daß das Licht bei der Emission zunächst relativ zum Stern läuft, weil der Äther in dessen Umgebung ebenso wie in der der Erde mitbewegt ist. Dabei läßt die Erfahrung bis jetzt zu, daß diese Mitführung eine vollständige und momentane, entsprechend der Wellentheorie, sein kann.

Man kann dies auch so darstellen, daß man dem Lichtstrahle transversale Masse zuschreibt, d. h. einen Widerstand gegen Bewegungsänderung in den Richtungen der Wellenebene, und die Frage, ob, bei Bewegung des Äthers senkrecht zum bereits emittierten Lichtstrahl, dieser allmählich die von der Wellentheorie geforderte Richtung annimmt, oder dauernd seine ursprüngliche Richtung beibehält, offen läßt. Ebenso steht es bis jetzt frei, longitudinale Masse des Lichts im freien Äther anzunehmen oder nicht, also eine sofortige Mitführung des Lichts in der Richtung der Wellennormale durch bewegten Äther, oder eine allmähliche, welche erst vollständig wird, nachdem der Widerstand der longitudinalen Lichtmasse gegen die Bewegungsänderung überwunden ist¹⁾. Im ersteren Falle wird kein Widerstand des Lichts gegen die vom bewegten Äther geforderte Geschwindigkeitsänderung in der Richtung der Wellennormale stattfinden, im letzteren Falle wird sich ein Widerstand des Äthers gegen die Bewegung der longitudinalen Lichtmasse bemerkbar machen, sobald diese relativ zu dem umgebenden Äther nicht mehr die gewöhnliche Lichtgeschwindigkeit c hat, sondern eine größere oder geringere, wobei der Widerstand des Äthers gegen diese »abnorme« Lichtbewegung zuletzt wieder c herstellt. Die longitudinale Lichtmasse wird also dann effektiv, wenn die Geschwindigkeit des Lichts geändert werden soll, ebenso wie die Masse eines geradlinig-gleichförmig bewegten Körpers.

Sucht man das Verhalten in longitudinaler und transversaler Richtung aus einem einheitlichen Gesichtspunkt heraus darzustellen, so läßt sich der Vorgang der Lichtausbreitung im bewegten Äther in folgender einfacher Weise wiedergeben: ein Widerstand des Äthers gegen die Lichtausbreitung ist nicht vorhanden, solange es sich um die gleichmäßige »normale« Fortpflanzung der Lichtwellen in »ruhemdem« Äther handelt, d. h. solange sich der Bewegungszustand des die Lichtquelle umgebenden Äthers nicht ändert. Er tritt jedoch für den Fall in Erscheinung; daß das Licht infolge der ihm zukommenden Masse und Trägheit außer seiner bisherigen Richtung und Geschwindigkeit noch eine Relativbewegung in irgend einer Richtung gegen den umgebenden Äther bekommt, was sich ereignen wird, wenn es im Verlaufe seiner Ausbreitung in bewegten Äther, d. h. in Äther von anderem Bewegungszustand, eintritt. Nur gegen diese der normalen Lichtfortpflanzung aufgelagerte Relativbewegung richtet sich also der Widerstand des Äthers, d. h. gegen einen Zustand der Lichtausbreitung, bei welchem die Lichtgeschwindigkeit von c abweicht und evtl. Wellennormale und Strahlrichtung relativ zum umgebenden Äther nicht mehr genau zusammenfallen. Dieser Widerstand des Äthers gegen

¹⁾ Gegenüber gewöhnlicher Materie genügt allerdings die Annahme nur transversaler Lichtmasse nicht, da ja bei Absorption und Spiegelung der Strahlungsdruck auftritt und sich die Lichtmasse also beim Auftreffen auf gewöhnliche Materie wie gewöhnliche Masse verhält.

die Bewegung der Lichtmasse wird so lange wirksam sein, bis das Licht wieder konstantes c und die gleiche Richtung relativ zu dem bewegten Äther, in den es eingetreten ist, erreicht hat, die es vordem gegenüber dem ruhenden Äther, aus dem es kam, besaß. Der Lichtgeschwindigkeitsänderung gehen entsprechende Änderungen der Wellenlänge parallel, sodaß die absolute Schwingungszahl stets konstant bleibt.

Unsere Auffassung geht also dahin, daß im ruhenden Äther das Licht sich genau so ausbreitet und verhält, wie es die bisherige Undulationstheorie fordert. Auch der Emissionsvorgang geht so vor sich, wie es dieser Theorie entspricht, d. h. die Geschwindigkeit und Richtung der Lichtfortpflanzung ist unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle¹⁾. Sobald jedoch das bereits emittierte Licht gezwungen werden soll, die Richtung und eventuell auch die Geschwindigkeit seiner Fortpflanzung zu ändern, sobald es also entweder auf gewöhnliche Materie auftrifft, wobei es den Strahlungsdruck erzeugt, oder der Äther sich ihm gegenüber zu bewegen beginnt, bzw. sobald das Licht in Äther von abweichendem Bewegungszustand eintritt, tritt die Masse des Lichts, d. h. sein Widerstand gegen Bewegungsänderung, in Erscheinung. Im freien Äther zeigt sich dann in transversaler, vielleicht auch in longitudinaler Richtung Masse und Trägheit wirksam, und dementsprechend wird Richtung und eventuell auch Geschwindigkeit erst allmählich dem geänderten Bewegungszustand des Mediums angeglichen, nicht momentan, wie es die reine Wellentheorie fordert. Der Unterschied gegenüber den Änderungen der Richtung und Geschwindigkeit des Lichts bei Absorption, Spiegelung, Ein- und Austritt aus einem ponderablen Medium liegt also darin, daß die Zeitdauer, die zur Überwindung des Widerstandes des Lichts gegen Bewegungsänderung erforderlich ist, im Falle der gewöhnlichen Materie, wegen deren außerordentlich größeren Gegenkraft außerordentlich gering ist, im freien Äther dagegen einen gewissen Betrag aufweist, der sich in der Ausbreitung des Lichts bemerkbar macht. Streng genommen ist jedoch in beiden Fällen der Vorgang ein stetiger; in beiden Fällen folgt die Änderung sowohl der Richtung wie der Geschwindigkeit des Lichts einer Kurve, auch wenn man sich die Bewegungsänderung des Äthers als unstetig vorstellt²⁾.

Am besten wird das hier angenommene Verhalten der Lichtausbreitung vielleicht durch ein aus dem Bereich der gewöhnlichen Materie hergenommenes Beispiel erläutert. Es verhält sich nämlich der Lichtstrahl, der in bewegten Äther eintritt, ebenso wie eine Reihe in gerader Linie hintereinander aus eigener Kraft sich fortbewegender Torpedos, wenn sie in Wasser von geändertem Bewegungszustand eintreten.

Auch diese können infolge ihrer Trägheit nicht momentan vom Wasser im vollen Betrage mitgenommen werden, sondern sie bekommen außer ihrer Eigenbewegung von konstanter Geschwindigkeit vorübergehend noch eine besondere Relativbewegung zum umgebenden Medium. Die Analogie ist dabei, wenn man den Torpedos keine Drehungen gestattet, sogar eine vollkommene (z. B. auch hinsichtlich der vorübergehenden Abweichung der Wellennormale von der Strahlrichtung relativ zum umgebenden Medium), wenn auch natürlich das in Betracht kommende Verhältnis zwischen Beschleunigung durch das bewegte Medium und Eigengeschwindigkeit in beiden Fällen ein gänzlich verschiedenes ist.

Daß dem Lichte irdischer Lichtquellen keine von der Erdbewegung herrührende Relativbewegung gegenüber der Erde zukommt, daß also an der Erdoberfläche ein von der Erdbewegung herrührender Ätherwind nicht existiert, ist durch den negativen Ausfall des *Michelson*-versuchs sehr wahrscheinlich geworden, daß dagegen das Licht der Himmelskörper trotzdem eine derartige Relativbewegung besitzt, ist durch diesen Versuch bis jetzt nicht widerlegt worden, und gerade auf ihn, auf die Untersuchung des außerirdischen Lichts mit dem *Michelson*-schen Interferometer, wie es *P. Lenard* vorschlägt, kommt es also jetzt an, wenn man in der Erforschung der Tatsachen weiter kommen will. Die Aberration irdischer Lichtquellen hat bisher noch niemand nachgewiesen, obwohl sie nach der Theorie vom ruhenden Äther im gleichen Betrage vorhanden sein müßte wie die der Himmelskörper³⁾, die Aberration außerirdischen Lichts dagegen ist eine Tatsache. Dieser Unterschied muß den Gedanken nahelegen, den *Michelson*-versuch vor allem mit dem Lichte der Himmelskörper, welches die Aberration zeigt, anzustellen. Es müßte nämlich nach der gemachten Voraussetzung das Aberrationslicht, welches in dem senkrecht zur Erdbewegung stehenden Schenkel des Apparats läuft, eine etwas geringere Geschwindigkeit zeigen als das Licht irdischer Lichtquellen und dementsprechend möglicherweise ein Unterschied in der Ausbildung der Interferenzstreifen beim Vergleich irdischen und außerirdischen Lichts sich zeigen. Daß nun das Aberrationslicht, nachdem es um 90° in die Richtung der Erdbewegung gespiegelt ist und den andern Schenkel des Apparats durchläuft, ebenfalls eine geänderte Geschwindigkeit gegenüber dem irdischen Licht besitzt, ist zwar möglich, aber nicht zur Erklärung der Aberration notwendig und nicht ohne weiteres aus den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen zu folgern; es könnte dies erst durch den angegebenen Versuch entschieden werden.

P. Lenard hat, soviel mir bekannt, zuerst auf die An-

¹⁾ Die Lichtquantenhypothese bleibe der einfacheren Darstellung halber hier zunächst außer Betracht. Ihre Einfügung in die hier vorgebrachte Auffassung dürfte keine größeren Schwierigkeiten machen, als überhaupt ihrer völligen Vereinbarung mit der Wellenlehre zur Zeit noch entgegenstehen.

²⁾ Die Auffassung, daß nur das Licht der Himmelskörper eine von der Erdbewegung herrührende Relativbewegung besitzt, nicht aber das Licht irdischer Lichtquellen, daß also beide Arten von Licht eine verschiedene physikalische Konstitution aufweisen, vertritt von anderen Vorstellungen ausgehend auch *P. Lenard* in seinen kürzlich veröffentlichten Abhandlungen »Fragen der Lichtgeschwindigkeit« (A.N. Nr. 5107, 1921) und »Über Äther und Uräther« (Starks Jahrb. 17. S. 308-356). Auch dort wird die absolute Unbewegtheit des Äthers aufgegeben, der *Michelson*-versuch durch die Mitbewegung des Äthers an der Erdoberfläche erklärt und eine wechselnde Lichtgeschwindigkeit im Weltraume angenommen. Jedoch gelingt *P. Lenard* die Verknüpfung der Erscheinungen nur dadurch, daß er einen zweiten Äther zu Hilfe nimmt, der sich nun entsprechend durch den ersten hindurchbewegen soll. Da Äther und Uräther sich, wie uns scheint, in nichts Wesentlichem unterscheiden, außer in ihrem Bewegungszustand, da insbesondere die Wellengeschwindigkeit sowohl im Medium des Äthers wie in dem des Uräthers gleich c ist (wie sich aus der Übereinstimmung der aus der Aberration und mit irdischen Lichtquellen ermittelten Lichtgeschwindigkeit ergibt), so scheinen uns beide identisch zu sein. Äther und Uräther sind nach unserer Auffassung ein und derselbe in Bewegung begriffene Äther.

³⁾ Daran ändert die Tatsache nichts, daß wir irdische, zur Erde ruhende Objekte stets in ihrer wahren Richtung, in der sie sich zur Zeit der Beobachtung befinden, erblicken.

stellung des *Michelson*-versuchs mit außerirdischen Lichtquellen hingewiesen und damit das große Verdienst, das Problem aus dem Stadium nur theoretischen Streits wieder in das Stadium möglicher experimenteller Entscheidungen gebracht zu haben. Allerdings spricht *P. Lenard* nur davon, daß bei longitudinaler Lichtmasse (nach unserer Benennung) der *Michelson*-versuch positiv ausfallen müßte und auch das nur mit Fixstern- und event. Planetenlicht und nicht etwa mit Mondlicht. Mit Sonnenlicht erwartet er einen negativen Ausfall¹⁾. Nach unserer Ansicht ist wegen der transversalen Lichtmasse vor allem mit Licht, welches senkrecht zur Bewegungsrichtung der Erde von außerirdischen Lichtquellen kommt, also mit Licht eines jeden Himmelskörpers, sofern es die Aberration zeigt, ein positiver Ausfall des *Michelson*-versuchs zu erwarten (und zwar auch bei Zugrundelegung der *Lenardschen* Hypothese vom Uräther) während für positiven Ausfall mit außerirdischem Licht, das in der Bewegungsrichtung der Erde läuft, ein geringerer Grad der Wahrscheinlichkeit besteht. Ein negativer Ausfall mit senkrecht zur Erdbewegung verlaufendem Sonnen-, Mond-, Planeten- oder Fixsternlicht wäre nur dann zu erwarten, wenn der Äther des betreffenden Himmelskörpers, in dem die Lichtemission stattfindet, keine oder eine nicht genügend große transversale Relativbewegung gegenüber der Erde besitzt, und wenn dabei außerdem auf dem Wege des Lichts zwischen Himmelskörper und Erde keine (oder eine nicht genügend) seitliche Mitführung desselben durch den Äther des Raumes erfolgt. Ob dies z. B. mit Mondlicht der Fall ist, darüber könnte nur die Beobachtung entscheiden. Mit Sonnenlicht ist nach unserer Auffassung ein positives Ergebnis zu erwarten. Es spielt bei diesen Fragen die Art der Bewegung des Äthers im Sonnensystem und die zur vollen Mitführung des Lichts erforderliche Entfernung eine Rolle, worüber man bis jetzt nichts Bestimmtes weiß. Ferner wäre ein negativer Ausfall auch mit Aberrationslicht zu erwarten, wenn das Gesetz für die Reflexion an bewegten Spiegeln nicht das bis jetzt als gültig angenommene ist (worauf wir noch zu sprechen kommen). Nach *P. Lenard* ist ein negativer Ausfall des *Michelson*-versuchs mit Fixsternlicht nicht gegen seine Auffassung entscheidend. Dies kann nur für in der Richtung der Erdbewegung einfallendes Licht gelten. Ein negativer Ausfall mit senkrecht zur Erdbewegung einfallendem Fixsternlicht wäre dagegen nicht ohne weitere Abänderungen vereinbar mit seiner Auffassung, weil ein solches Resultat, wenn das Licht in dem zur Erdbewegung parallelen Schenkel des Apparats mit konstanter Geschwindigkeit c , sei es relativ zum Erdäther oder zum Uräther, läuft, nicht eintreten kann. Ein positiver Ausfall aber des mit außerirdischem Lichte angestellten *Michelson*-versuchs wäre deshalb von großer Wichtigkeit, weil er sowohl mit der bisherigen Wellentheorie vereinbar wäre als auch zu gleicher Zeit definitiv gegen die *Lorentzsche* Kontraktionshypothese und die *Einsteinsche* Relativitätslehre ebenso wie gegen die *Stokessche* Aberrationstheorie entscheiden würde, welche alle keine Streifenverschiebung erwarten lassen. Es handelt sich also um einen Versuch, dessen negativer Ausfall immerhin des Registrierens wert wäre, dessen positives Ergebnis jedoch von umwälzender Bedeutung für die Theorie

des Lichts werden müßte und der vielleicht auch dazu berufen wäre, manches jetzt noch bestehende Rätsel in der Bewegung der Gestirne zu lösen.

Auch wenn man nur transversale Masse im Lichtstrahle für vorhanden ansieht und keine longitudinale, ist also ein positiver Ausfall des mit Aberrationslicht angestellten *Michelson*-versuchs zu erwarten. Je nachdem man nun eine seitliche vollkommene Mitführung des Lichts der Himmelskörper durch den Äther des Raumes (nachdem es eine genügende Strecke in ihm durchlaufen hat) annimmt, oder überhaupt keine Mitführung, muß dabei der Betrag der Streifenverschiebung ein verschiedener sein. Im ersteren Falle würde in ihm die transversale Relativbewegung Erde-Äther des Raumes d. h. also die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne zum Ausdruck kommen (wenn das Sonnensystem als Ganzes im Äther ruht bzw. von einer Trift des Äthers von ungeheurer Ausdehnung getragen wird) und das senkrecht zur Erdbahn eintreffende Licht würde eine konstante, von v/c abhängige Streifenverschiebung aufweisen; im letzteren Falle würde der Betrag der Streifenverschiebung nur von der transversalen Relativbewegung Erde-Stern abhängen, also für die einzelnen Objekte auch bei stets senkrecht zur Erdbewegung eintreffendem Licht verschieden sein, und es müßte sich aus dem Betrag der Streifenverschiebung diese Relativbewegung annähernd schätzen lassen²⁾. (Dies gilt wenigstens für Fixsterne.)

Für den zu erwartenden, von v/c (v = Erdgeschwindigkeit, c = Lichtgeschwindigkeit) abhängenden Betrag der Streifenverschiebung bei nur transversaler Masse und senkrecht zur Erdbewegung einfallendem außerirdischem Licht ergibt die Rechnung folgendes:

Die Zeit, welche das irdische Licht zum Durchlaufen eines Schenkels des Apparats benötigt, wenn Apparat und Äther relativ zu einander ruhen, ist

$$T_1 = 2l/c \quad (l = \text{Spiegelabstand}).$$

Die gleiche Zeit benötigt auch aus dem Himmelsraum kommendes Licht ohne longitudinale Masse, das also stets vom Erdäther momentan in der Richtung des Strahls mitgenommen wird, zum Durchlaufen des parallel zur Richtung der Erdbewegung liegenden Schenkels des Apparats.

In dem zur Erdbewegung senkrechten Schenkel des Apparats verläuft das Aberrationslicht ebenso wie irdisches Licht nach der früheren Auffassung im absolut ruhenden Äther. Es ergibt sich also für die vom Aberrationslicht zum Durchlaufen dieses Schenkels benötigte Zeit in bekannter Weise der Wert:

$$T_2 = 2l/(c^2 - v^2)^{1/2}.$$

Wir setzen außerdem noch hierher den Wert für die Zeit, welche das Licht, nach der Auffassung vom absolut ruhenden Äther, zum Durchlaufen des zur Richtung der Erdbewegung parallelen Schenkels des Apparats benötigt:

$$T_3 = 2lc/(c^2 - v^2).$$

Die Ausdrücke ergeben nach dem binomischen Lehrsatz unter Vernachlässigung höherer Potenzen von v/c :

$$\begin{aligned} T_1 &= (2l/c) (1 + 0) \\ T_2 &= (2l/c) (1 + \frac{1}{2} v^2/c^2) \\ T_3 &= (2l/c) (1 + v^2/c^2). \end{aligned}$$

¹⁾ Siehe A.N. Nr. 5107, 1921, S. 305, unten, und S. 308, ferner *Starks* Jahrb. 17, S. 326, Anmerk. 3.

²⁾ Letztere Art der Lichtausbreitung nimmt *P. Lenard* an. Er sagt: „Senkrecht zur Emissionsrichtung stehende Geschwindigkeitskomponenten der Lichtquanten, herrührend von ebenso gerichteter Geschwindigkeitskomponente der Lichtquelle, nehmen wir als dauernd unverändert weiter bestehend an. (Über Äther und Uräther. S. 322. Anmerk. 2.)“

Es ergibt sich also für die Zeitdifferenz des vom Äther (bezw. von der Trägheit) beeinflussten Strahles gegenüber dem nicht beeinflussten Strahl im andern Schenkel

$$T_2 - T_1 = (l/c)(v^2/c^2)$$

und für den Wegunterschied

$$\Delta = lv^2/c^2$$

Die zu erwartende Streifenverschiebung ist also von gleichem Betrage wie die für den *Michelson*-versuch bisher berechnete, wie sich ergibt, wenn man die Differenz $T_3 - T_2$ bildet.

Ein Unterschied gegenüber dem in absolut ruhendem Äther ursprünglich erwarteten Ergebnis besteht jedoch darin, daß bei Drehung der Anordnung um 90° , also bei Beobachtung des Lichts eines Himmelskörpers, der im Apex oder Antiapex der Erdbewegung sich befindet, die Streifenverschiebung gleich Null werden müßte, weil in diesem Falle das den Apparat treffende außerirdische Licht sich ebenso wie irdisches Licht verhält.

Wir wollen nun das zu erwartende Versuchsergebnis für den Fall betrachten, daß dem Lichte außer der transversalen auch longitudinale Masse zukommt, d. h. daß es auch in der Fortpflanzungsrichtung Widerstand gegen Änderung seines Bewegungszustandes äußert. Dieser Fall ist verwickelter, da dann das Bezugssystem, auf welches die Lichtgeschwindigkeit bezogen werden soll, nicht eindeutig gegeben ist. Versteht man die Wirksamkeit vereinter longitudinaler und transversaler Masse dahin, daß die Lichtstrahlen sich beim Durchlaufen des Apparats und bei der wiederholten Spiegelung in demselben ebenso verhalten, als ob sie sich noch im Äther des Raumes d. h. außerhalb des Erdäthers befänden und der umgebende Äther seinen Bewegungszustand nicht geändert hätte, wird also als Bezugskörper für den Gang der Lichtstrahlen, relativ zu dem c konstant bleibt, der Äther des Raums genommen, den das Licht zuvor durchlaufen hatte¹⁾, bezw. das Sonnensystem, so muß das Versuchsergebnis das gleiche sein, welches für den mit irdischem Licht im absolut ruhenden Äther angestellten Versuch erwartet wurde. In diesem Falle müßte also bei parallel wie bei senkrecht zur Erdbewegung einfallendem außerirdischem Licht eine dem Wegunterschied lv^2/c^2 entsprechende Streifenverschiebung eintreten.

Es läßt sich jedoch, wie mir scheint, noch eine andere Wirkungsart der longitudinalen Lichtmasse denken als die, daß (zunächst) keine merkliche Geschwindigkeitsänderung relativ zum Äther des Raumes eintritt, den das Licht durchleitet, bevor es den Erdäther erreicht. Betrachten wir nämlich den Vorgang der Spiegelung unter Zugrundelegung der Lichtmasse allein, also nach der Emissionsvorstellung und ohne Rücksicht auf einen Äther, so lautet das anzunehmende Reflexionsgesetz: Reflexionswinkel gleich Einfallswinkel, Geschwindigkeit des reflektierten Lichts gleich Geschwindigkeit des auffallenden Lichts, bezogen auf das System des Spiegels. Dieses Gesetz wird nun offenbar nicht geändert, wenn der Spiegel bewegt wird, da ja (bei Nichtberücksichtigung eines Äthers) es sich offenbar immer nur um die Relativbewegung zwischen Lichtmasse und Spiegel handeln kann. Es ergibt sich dann ein Reflexionsgesetz für den bewegten Spiegel, das zwar hinsichtlich der

Richtung der Strahlen mit dem der Wellentheorie übereinstimmt, nicht jedoch hinsichtlich der Geschwindigkeit des Lichts im einfallenden und reflektierten Strahl, welche nun relativ zum Spiegel auch bei wechselnden Geschwindigkeiten für beide stets die gleiche bleiben soll. Dieses der Emissionsvorstellung entsprechende Gesetz für die Reflexion an bewegten Spiegeln wollen wir probeweise auf das uns beschäftigende Problem anwenden.

Zu diesem Zweck werden wir uns fragen müssen, ob bei Gültigkeit eines derartigen Reflexionsgesetzes die Interferenzerscheinungen, welche durch Spaltung eines Lichtstrahls an einem halbdurchlässigen bewegten Spiegel erzeugt werden, sich anders ausprägen würden, als es der reinen Wellenlehre entspricht. Da nach der gemachten Annahme die Gesetze für den Strahlengang relativ zum System des Spiegels bei Bewegung desselben unverändert bleiben, so kann eine Änderung der relativen Geschwindigkeit des einfallenden Lichts für sich allein bei konstant bleibender Wellenlänge keinen Einfluß auf die Ausbildung der Interferenzerscheinungen haben. Denn der Wegunterschied der interferierenden Strahlen bleibt der gleiche, und die stets übereinstimmende Änderung der Geschwindigkeit des Lichts auf beiden Wegen kann bei unveränderter Wellenlänge keine Verschiebung der Streifen hervorrufen. Ändert sich jedoch mit der Geschwindigkeit des einfallenden Lichts zugleich die Wellenlänge, so muß dies die Ausbildung der Interferenz beeinflussen, und zwar in einer Weise, die vom Wechsel der Wellenlänge und vom vorhandenen Gangunterschied abhängt (siehe die weiter unten folgende Rechnung). Im Falle longitudinaler Masse ist nun die Geschwindigkeit außerirdischen Lichts, das senkrecht und parallel zur Bewegungsrichtung der Erde einfallend den zentralen Spiegel des Apparats trifft, bezw. c , $c+v$ und $c-v$, also verschieden (relativ zum Apparat). Jedoch ändert sich die Wellenlänge nicht entsprechend, weil die Wellen in diesem Falle beim Eindringen in den Erdäther ihre ursprüngliche Geschwindigkeit beibehalten sollen. Es ist also selbst bei großen Gangunterschieden und unter Voraussetzung einer monochromatischen außerirdischen Lichtquelle keine Änderung der Interferenzerscheinungen als Folge der Erdbewegung zu erwarten, d. h. in dem Falle des angenommenen Reflexionsgesetzes muß der mit dem Lichte der Himmelskörper angestellte *Michelson*-versuch negativ ausfallen, auch wenn dieses eine Relativbewegung und geänderte Geschwindigkeit gegenüber irdischem Lichte besitzt, und zwar für jede Richtung des einfallenden Strahles.²⁾

Es ergibt sich also folgendes Schema für das je nach den gemachten Annahmen zu erwartende Ergebnis des mit außerirdischem Lichte angestellten *Michelson*-versuchs:

Einfallender Strahl	a	b	c
senkrecht zur Richtung der Erdbewegung	+	+	—
parallel „ „ „ „	—	+	—

a: nur transversale Masse, Verschiebung um Δ bei Drehung um 90° , allmählich seitliche Mitführung des Lichts.

b: auch longitudinale Masse, Verschiebung um 2Δ bei Drehung um 90° ; konstantes c relativ zum Äther des Raumes.

¹⁾ Diese Auffassung hat offenbar *P. Lenard*, wenn er ein positives Ergebnis erwartet. Nur tritt an die Stelle des Äthers des Raumes bei ihm der Uräther.

²⁾ Einen positiven Ausfall müßte in diesem Falle der Vergleich der Geschwindigkeit des in der Richtung der Erdbewegung einfallenden außerirdischen Lichts mit der des irdischen Lichts nach der Methode von *Fizeau*, *Foucault* oder einer ähnlichen ergeben, was mit sehr empfindlichen Apparaten wohl auch feststellbar wäre, vorausgesetzt, daß auf relativ kurze Entfernung keine erhebliche Mitführung erfolgt.

c : auch longitudinale Masse, aber abgeändertes Reflexionsgesetz.¹⁾

Da wir von der Annahme ausgingen, daß die Gesetze der reinen Undulationstheorie für eine Erklärung der in Rede stehenden Erscheinungen unzulänglich sind, so werden wir uns noch kurz mit dem Gedanken beschäftigen müssen, ob unter dieser Annahme und Zugrundelegung neuer plausibler Vorstellungen über Lichtausbreitung nicht auch eine Erklärung auf Grund der Hypothese eines nicht mit der Erde bewegten, also absolut oder im Sonnensystem ruhenden Äthers möglich sei. Die einfachste Vorstellung in dieser Hinsicht ist die, daß der Äther, welcher durch seine Bewegung die Geschwindigkeit einmal emittierten Lichts zunächst nur sehr wenig zu beeinflussen vermag, auch am Emissionsort des Lichts ohne merklichen Einfluß auf dessen Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist, daß also die Lichtgeschwindigkeit auf die Lichtquelle zu beziehen und wenigstens in deren näherer Umgebung stets relativ zu dieser annähernd konstant sei, womit sich der *Michelson*-versuch ohne weiteres erklärt. Dieser Auffassung braucht auch die Beobachtung an Doppelsternen nicht notwendig zu widersprechen, wenn man sich vorstellt, daß die Lichtgeschwindigkeit in größerer Entfernung von der Lichtquelle in die konstante Geschwindigkeit relativ zum Äther übergeht, wie dies der oben entwickelten Ansicht von dem Widerstand des Äthers gegen die Extrabewegung der longitudinalen Lichtmasse entspricht²⁾. Jedoch steht dieser Erklärungsmöglichkeit der Versuch von *G. Sagnac* entgegen, an dessen Zuverlässigkeit wohl nicht gezweifelt werden kann, und welcher die Unabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Bewegung der Lichtquelle, auch in deren nächster Umgebung, erwiesen hat.

An eine andere Erklärung des *Michelson*-versuchs läßt sich denken, wenn wir das oben probeweise aufgestellte Gesetz für die Reflexion an bewegten Spiegeln auf den mit der Erde durch den ruhenden Äther des Sonnensystems bewegten Apparat anwenden. Ändert sich die Orientierung des Apparats zur irdischen Lichtquelle, so ändert sich in diesem Falle auch die relative Geschwindigkeit des den zentralen Spiegel treffenden Lichts und zugleich auch dessen Wellenlänge, es wäre also nach den oben gemachten Ausführungen ein Einfluß der Erdbewegung auf die Streifenbildung im *Michelson*-schen Interferometer zu erwarten. Die Rechnung zeigt jedoch, daß dieser Einfluß viel zu gering ist, um beobachtbar zu sein.

Bezeichnen wir den Wegunterschied der beiden interferierenden Strahlen, welcher bei Ausbildung der Interferenzstreifen im relativ zum Apparat ruhenden Äther an einer bestimmten Stelle der Streifen vorhanden wäre, mit Δ , die in diesem Falle vorhandene Wellenlänge des den Apparat durchlaufenden monochromatischen Lichts mit λ , den Wegunterschied, ausgedrückt durch die Anzahl der auf ihn treffenden Wellenlängen λ mit δ , so ist $\Delta = \delta\lambda$. Da sich die relative Geschwindigkeit der beiden interferierenden

Strahlen stets in gleicher Weise ändern soll, so kommt für die Interferenz bei allen relativen Lichtgeschwindigkeiten stets dieser gleiche Wegunterschied in Betracht. Es ergibt sich also auch für eine andere Wellenlänge (wenn z. B. der Äther in einer bestimmten Richtung gegenüber dem System gleichförmig bewegt ist) $\Delta = \delta'\lambda'$, wenn δ' der Wegunterschied, ausgedrückt in Einheiten der geänderten Wellenlänge, ist.

Die Periode bleibt bei relativer Ruhe der Lichtquelle zum Apparat die gleiche, es ist also

$$T = \lambda/c = \lambda'/c' = \lambda'/(c \pm v)$$

wenn der Äther in der Richtung des einfallenden Strahls relativ zum System mit Erdgeschwindigkeit bewegt ist. Daraus ergibt sich

$$\delta' - \delta = \delta[c/(c \pm v) - 1]$$

oder annähernd

$$\delta' - \delta = \pm(v/c) \delta = \pm 0.0001 \delta.$$

$\delta' - \delta$ bedeutet die Änderung im Gangunterschied an der betrachteten Stelle, wenn sich die relative Lichtgeschwindigkeit der beiden interferierenden Strahlen von c in $c \pm v$ ändert. Dieser Änderung im Gangunterschied entspricht die zu erwartende Streifenverschiebung, sie beträgt also bei einer Drehung um 180° im Maximum das 0.0002fache des vorhandenen Gangunterschieds δ , d. h. erst bei einem Gangunterschied von z. B. 1000 Wellenlängen ist eine maximale Verschiebung um 0.2 Streifenbreite zu erwarten.

Der *Michelson*-versuch in gewöhnlicher Anordnung muß also negativ ausfallen. Bei einem Interferenzversuch mit großen Gangunterschieden würde jedoch ein deutliches positives Ergebnis zu erwarten sein. Ein derartiger Interferenzversuch ist bereits im Jahre 1871 von *E. Mascart* angestellt worden; trotz eines benützten Gangunterschieds bis zu 50000 Wellenlängen fiel der Versuch jedoch negativ aus. Es ließ sich, wenn der Apparat so gedreht wurde, daß der einfallende Strahl einmal im Sinne der Erdbewegung, das andere mal entgegengesetzt lief, keine Streifenverschiebung wahrnehmen.³⁾ Demnach besteht keine Möglichkeit, den *Michelson*-versuch auf die angegebene Weise zu deuten, und das Experiment spricht entweder für mit der Erde bewegten Äther oder gegen die Gültigkeit des angenommenen Reflexionsgesetzes.

Es findet sich also (abgesehen von der doch recht unbefriedigenden *Lorentz*-schen Kontraktionshypothese) keine Erklärungsmöglichkeit auf Grund der Vorstellung des unbewegten, im Raume ruhenden Äthers. Dagegen lassen, wie uns scheint, die in Betracht gezogenen Beobachtungen und Experimente in der angegebenen Weise eine Erklärung unter der Annahme des mit der Erde bewegten Äthers zu. Der *Fizeau*-versuch steht nach unserer Auffassung mit dieser Annahme nicht in Widerspruch, denn einmal kann der Äther zugleich mit den Planeten um die Sonne rotieren, in welchem Falle die seitliche Mitführung des in quer zur Fortpflanzungsrichtung bewegten Äther eingetretenen Lichtstrahls allerdings außerordentlich gering sein oder völlig fehlen müßte⁴⁾. Zweitens

¹⁾ Am sichersten und im größten Betrage ist also die Streifenverschiebung zu erwarten bei Beobachtung eines Sternes im Meridian zu Mitternacht und der Sonne im wahren Mittag, wobei der eine Schenkel des Apparats in die Nord-Südrichtung, der andere in die Ost-Westrichtung gelegt ist. Dabei wird das außerirdische Licht, ohne daß es die senkrecht zur Erdbewegung stehende Ebene verläßt, horizontal gespiegelt und trifft so auf den zentralen Spiegel des Apparats.

²⁾ Man könnte deshalb daran denken, den *Michelson*-versuch mit einer in möglichst großer Entfernung befindlichen irdischen Lichtquelle (z. B. Scheinwerfer) anzustellen.

³⁾ Ann. école normale sup. (2) 3.390, 1874. *Mascart* hatte freilich dabei nicht die Absicht, das Reflexionsgesetz der Wellentheorie zu prüfen. Er erwartete von vornherein das der reinen Wellentheorie entsprechende negative Ergebnis.

⁴⁾ Mit der *Lenards*-schen Auffassung wäre also eine derartige Ätherbewegung ohne weiteres vereinbar.

kann man unter der Voraussetzung auch longitudinaler Lichtmasse daran denken, daß möglicherweise im *Fizeau*-Versuch zwar Wasser und Luft wohl den Äther mit sich führen, jedoch dieser nicht in merklichem Grade das Licht. Die dem *Fresnel*-schen Mitführungskoeffizienten entsprechende beobachtete Mitführung des Lichts durch bewegte ponderable Medien erklärt sich dabei wie bisher nach der herrschenden Theorie als eine Abänderung der Lichtgeschwindigkeit durch die in der Materie mitbewegte elektromagnetische Energie, wie dies auch zur Erklärung der Aberration in Linsenfernrohren und des Versuchs von *Airy* notwendig ist. Der *Fizeau*-Versuch würde also nach dieser Auffassung der der *Hertz*-schen Theorie zugrunde liegenden Vorstellung, daß jeder materielle Körper, also auch die Erdatmosphäre, seinen Äther mit sich führt, nicht widersprechen, und es müßte die Lichtgeschwindigkeit um die Geschwindigkeit des ponderablen Mediums verändert werden, wenn sich die Lichtquelle innerhalb des bewegten Mediums befände. Dem scheint nun allerdings der Versuch von *Sagnac* zu widersprechen, da hier die Luft, wenigstens zum Teil, bei der Rotation des Apparats in Mitbewegung versetzt wurde. Es mag daher wohl richtiger sein, sich vorzustellen, daß nur große Massen, wie die Erde, den Äther in vollem Betrage mit sich führen, kleinere Körper aber, wie wir sie bei Experimenten in Bewegung setzen, nur in einem geringeren Betrage, d. h. in einem von ihrem Volumen oder ihrer Masse abhängigen Grade¹⁾.

Es wäre mit Rücksicht auf die Möglichkeit verschiedener Geschwindigkeiten des Lichts gegenüber dem Äther und auf die vorläufig unbekannte zur völligen Mitführung des Lichts nötige Entfernung, ferner mit Rücksicht auf die Möglichkeit kosmischer Bewegungen des Äthers nach unserer Meinung von großem Interesse, nachzuprüfen, ob nicht von der Richtung zum Sonnensystem abhängige kleinste gesetzmäßige Abweichungen im Aberrationswinkel vorhanden sind, ob sich z. B. für die Annahme einer Rotation des Äthers im Planetensystem sprechende derartige kleinste Abweichungen in der Ekliptikebene und in Sonnennähe ergeben. Der Aberrationswinkel ist ja nach der hier vorgetragenen Auffassung nicht mehr eine ein für allemal gegebene durch Beobachtung an einigen Sternen zu ermittelnde Konstante, sondern er mag sehr wohl eine für die einzelnen Sterne veränderliche Größe sein, für welche die Beziehung $\tan \alpha = v/c$ nur einen Näherungswert ergibt. Auch das *Michelson*-sche Interferometer ist, wenn es ein positives Ergebnis mit Licht der Himmelskörper liefert, wohl dazu berufen, in dieser Frage weiter zu helfen, z. B. durch Vergleich der Geschwindigkeit des von Fixsternen und Planeten kommenden Lichts. Vielleicht wird es so im Laufe der Zeit gelingen, durch feinste Beobachtungen der Aberrationswinkel und genaueste Messungen der relativen Geschwindigkeit des die Erde treffenden Lichts der Himmelskörper mit dem *Michelson*-schen Apparat Genaueres über die Gesetzmäßigkeit der Lichtausbreitung im Raume und über die kosmischen Bewegungen des Äthers zu ermitteln.

Die Auffassung, daß die Geschwindigkeit von Wellen nicht stets relativ zum Medium konstant bleibt und daß sich die Geschwindigkeit des Mediums zu der der Wellen nicht

stets ohne weiteres addiert, widerspricht freilich der geläufigen Vorstellung und mag zunächst befremdlich, ja unmöglich erscheinen. Nach der elektromagnetischen Lichttheorie beruht das Licht jedoch nicht auf mechanischen Bewegungen der Teilchen des Äthers selbst, sondern auf Schwingungen, d. h. periodischem An- und Abswellen eines uns in seinem Wesen nicht näher bekannten Zustandes im Äther, und es verlangt, wie uns scheint, nichts Unmögliches, sich zu denken, daß dieser Zustand neben seiner auf wellenartiger Ausbreitung beruhenden Fortpflanzungsgeschwindigkeit unter Umständen noch eine Eigengeschwindigkeit relativ zum umgebenden Äther besitzen kann, die nicht auf wellenartiger Fortpflanzung beruht. Es besteht also die Möglichkeit, daß dieser Zustand gegenüber dem Äther, oder richtiger, der Äther gegenüber diesem Zustand in eine Bewegung letzterer Art gerät und dieser relative Bewegungszustand beider so lange besteht, bis er an einem ihn begleitenden Widerstand erlischt. Die Lichtgeschwindigkeit und der Weg eines Lichtstrahls relativ zum Äther setzt sich dann zusammen aus zwei Komponenten: zu der konstanten, auf der Erregung von Wellen beruhenden Fortpflanzungsgeschwindigkeit des elektromagnetischen Zustandes addiert sich unter Umständen dessen dem Betrage nach wechselnde Eigenbewegung gegenüber dem Äther. Bedenken wir also, daß der Äther nicht gewöhnliche Materie ist, sondern etwas von Grund aus anderes, und daß die Lichtschwingungen nicht gewöhnliche mechanische Bewegungen der Teilchen des Mediums, wie z. B. Schallschwingungen sind, so wird man die gemachten Annahmen bis zu ihrer experimentellen Widerlegung wohl als zulässig erklären dürfen.

Daß es erlaubt ist, sich bei der Vorstellung von den elektromagnetischen Schwingungen und Wellen im Äther in erheblichem Grade von dem frei zu machen, was uns die unmittelbare Wahrnehmung der Wellenbewegung in festen Körpern, Flüssigkeiten und Gasen lehrt, geht vor allem daraus hervor, daß in letzterem Falle mit dem bewegten Medium stets dessen träge Masse bewegt wird, weil hier Medium und Masse nicht zu trennen sind, dem Medium die Masse unmittelbar innewohnt. Bewegt sich also die Masse des Mediums, so bewegt sich zugleich die Masse der Wellen und die Geschwindigkeit von Medium und Wellen addiert sich ohne weiteres. Anders jedoch beim Äther, wenn, wie es unserer Vorstellung entspricht, in ihm Medium und Masse nicht ohne weiteres zusammenfallen, vielmehr der nicht von elektromagnetischen Schwingungen durchsetzte, also von Energie freie Äther frei von Masse ist, Masse nur dem elektromagnetischen Zustand in ihm zukommt und mit den elektromagnetischen Schwingungen erst dem Äther übermittelt wird. Es ist wohl denkbar, daß in diesem Falle die Addition der Geschwindigkeiten des Mediums und eines in seinem Wesen nicht näher bekannten Zustandes im Medium unter besonderen Umständen anders, nämlich so wie oben beschrieben wurde, vor sich geht. Hinsichtlich des bisher angenommenen Satzes von der absoluten Konstanz der Lichtgeschwindigkeit relativ zum Äther ist man vielleicht noch zu sehr im Vorstellungskreis der mechanisch-elastischen Lichttheorie stecken geblieben.

München, 1922 Juli 10.

K. Vogtherr.

¹⁾ Vergl. dazu *E. Gehrcke* in *Drudes Optik*, III. Aufl., S. 474, Verh. Phys. Ges. 1918 S. 165 u. 1919 S. 67. Der Versuch von *Sagnac* unter abgeänderten Versuchsbedingungen (z. B. völlige Mitführung der Luft bei der Rotation, Bleimantel um die Lampe usw.) könnte vielleicht eine Mitbewegung des Äthers durch die Luft, bezw. in der Umgebung der Lampe erzielen, was fehlende oder geringere Streifenverschiebung erwarten ließe.