15 ccm fassenden Reagensrohr auf. Das Filtrat wird dann noch $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Stunde je nach der Menge des Blutfarbstoffes einen oder beide Streifen des Hämochromogens zeigen. — Zum Nachweis von Blutflecken auf Leinwand schneidet man ein etwa 0,5 cm breites Stückchen aus, bringt es auf einen Objektträger und untersucht nach Zugabe von 3—4 Tropfen Hydrazinreagens mikroskopisch mit schwachem Objektiv und großer Blendenöffnung, wobei die betreffende Stelle rot gefärbt erscheint. Darauf wird das Okular durch ein Mikrospektroskop oder ein Taschenspektroskop ersetzt, um die Absorptionsstreifen des Hämochromogens zu erkennen. *C. Mai.*

Popp: Die Beobachtung und Deutung von Blutspuren bei Kriminalforschungen. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1904, 10, 355—363.) — An Hand von Beispielen, Mikrophotogrammen u. s. w. wird ausgeführt, daß man nicht nur durch den chemischen Nachweis des Blutes allein, sondern auch in Verbindung mit dem biologischen Nachweis und durch die Beobachtung der Art der Blutspuren selbst, ihrer Form, sowie durch die Beobachtung der Fingerspuren der Kriminalforschung außerordentliche Dienste zu leisten vermag und daß es die Aufgabe des Chemikers, der an solche Fragen herantritt, ist, nicht planlos auf den Blutnachweis als solchen zuzusteuern, gleich Reaktionen anzustellen und dabei wichtiges Material zu zerstören, sondern daß es Pflicht ist, sich die Sachlage erst genau anzusehen, die Spuren durch Photographie, Zeichnung oder genaue Beschreibung erst genau festzustellen, sodaß später noch eine genaue Darlegung der Verhältnisse möglich ist und alle diese Momente dann zu seinem Gutachten zu benutzen. — Zum Sichtbarmachen kleiner Blutflecken auf Kleiderstoffen u. s. w. wird die Verwendung gefärbter Gelatinefolie als Lichtfilter empfohlen. Zur Identifizierung löst man den Fleck langsam in ganz wenig physiologischer Kochsalzlösung, und zwar in einer auf dem Objektträger zu bildenden kleinen feuchten Kammer, und sucht unter dem Mikroskop zwischen den Fasern nach Blutzellen. Sodann saugt man die Lösung in ein Haarröhrchen und unterwirft sie der spektroskopischen Prüfung. Darauf bläst man die Lösung wieder auf den Objektträger, trocknet langsam an und befeuchtet mit schwach-alkalischer Lösung von Wasserstoffsuperoxyd. Bei Anwesenheit von Blut tritt durch die Oxydasenwirkung Schaumbildung ein. Fügt man zu der schaumigen Masse noch eine Spur Phenolphthalin, so entsteht bei Anwesenheit von Oxydasen sofort starke Rotfärbung. Ob Blut vorliegt, muß neben der Spektralanalyse und der mikroskopischen Prüfung dann noch durch die Bildung von Häminkristallen nachgewiesen werden. *C. Mai.*

Fleisch, Fleischwaren und diätetische Nahrungsmittel.

Henry Nater: Die Produktion und der Verbrauch von Fleisch in der Schweiz. (Forsch. auf d. Gebiete der Landwirtsch., Festschrift zur Feier des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Adolf Krämer, Frauenfeld 1902, 295—318.) — Seine Ausführungen gründet Verf. auf die statistischen Erhebungen, welche zwecks Abschlusses von Handelsverträgen angestellt wurden. Nachdem die schweizerische Landwirtschaft infolge der Konkurrenz des ausländischen Getreides den Fruchtbau mehr und mehr verlassen hatte, wandte sie sich der Futter- und Milchproduktion und der Ausfuhr der Milcherzeugnisse zu. In neuerer Zeit sieht sich aber auch dieser Zweig der Landwirtschaft bedroht, da das Ausland einerseits selbst vielfach zur Erzeugung seines Milch- und Käsebedarfes übergegangen ist, und andererseits die schweizerischen Produkte mit einem erheblichen Zoll belegt. Aus diesen Gründen kommt der Fleischproduktion in der Schweiz eine erhöhte Bedeutung zu; freilich erwächst ihr eine gefährliche Konkurrenz durch die Einfuhr von italienischem, französischem und

ungarischem Vieh. An Schlacht-Rindvieh (einschließlich Kälber, Ochsen, Kühe) wurden im Jahre 1901 verbraucht 550828 Stück, wovon 541144 (= 98,24 %) aus der Schweiz selbst stammten. Die Einfuhr an Vieh betrug 53272 Stück, an frischem Fleisch 51969 D.-Z., während die Ausfuhr 13444 D.-Z. betrug. Von dem Gesamtfleischbedarf der Schweiz wurden 76,40 % durch die eigene Produktion gedeckt. Auf den Kopf der 3315443 Seelen zählenden Bevölkerung entfallen 27,41 kg. Der Verbrauch an Schweinefleisch hat in den letzten Jahren abgenommen, aber auch die Einfuhr hat eine beträchtliche Verminderung erfahren. Der Verbrauch an Schlachttieren betrug 1901 477612 Stück. Ein Vergleich zwischen dem Verbrauch an den verschiedenen Fleischsorten in den Städten und auf dem Lande ergibt, daß die Fleischsorten, die man gewissermaßen als Luxusfleisch bezeichnen könnte, nämlich Kalb-, Ochsen- und Hammelfleisch, hauptsächlich von der Stadtbevölkerung, Ziegen-, Rind- und Kuhfleisch dagegen im wesentlichen von der Landbevölkerung verzehrt werden, während das Schweinefleisch ziemlich gleichmäßig auf Stadt und Land verteilt ist. Bezüglich der weiteren zahlreichen Einzelheiten muß auf die Originalarbeit verwiesen werden.

A. Scholl.

H. S. Grindley: Die Stickstoffverbindungen des Fleisches. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1904, **26**, 1086—1107; auch Proceedings of the 20. Annual Convention of the Association of Official Agricultural Chemists, 19., 20., 21. Nov. 1903, S. 110—115. Herausgegeben von H. W. Wiley. Washington, Gouvernementsbuchhandlung, 1904.) — Verf. will nur eine vorläufige Mitteilung geben, die seiner größeren Arbeit über die Chemie der Stickstoffverbindungen des Fleisches entnommen ist. Bis jetzt ist die Kenntnis der Proteinkörper und der dem Protein ähnlichen Substanzen im menschlichen Körper noch sehr unvollständig und fast nur auf die Proteinsubstanzen des Blutes und des vom Blut befreiten Muskelfleisches beschränkt. Es ist daher sowohl für die Verdauungslehre als die Beurteilung des Nährwertes von Nahrungsmitteln von Wichtigkeit, die Kenntnis der Stickstoffverbindungen des Fleisches und seiner Zubereitungen zu vervollständigen. Zu diesem Zwecke behandelte Verf. Fleischproben nacheinander mit folgenden Reagenzien: kaltem Wasser, 10 %-iger Kochsalzlösung, 0,15 %-iger Chlorwasserstoffsäure, 0,15 %-iger Kalilauge und schließlich mit heißem Wasser, und bestimmte in jedem der Auszüge die gelösten Proteinstoffe. Verf. verwandte für seine Versuche zwei Proben mageres Rindfleisch von zweijährigen Tieren — mit I und II bezeichnet — und zwar die erste und einen Teil der zweiten Probe in frischem Zustande, während er die andere Hälfte der zweiten Probe auskochte, dadurch daß er sie zuerst 10 Minuten in heißes Wasser brachte und dann 5 Minuten hindurch in Wasser von 85° hielt. Nach Entfernung von Knochen, Knorpeln und Fett wurden alle drei Proben zerkleinert und jede dreimal durch eine Wurstmaschine gegeben. Die lufttrockene Substanz ergab folgende Zusammensetzung:

Art des Fleisches	Wasser	Protein (N $\times$ 6,25)	Fett	Asche	Gesamt-Stickstoff	
Probe I	77,12 %	19,96 %	1,46 %	1,08 %	3,19 %	
Probe II {	frisch	74,54 „	22,56 „	1,50 „	1,22 „	3,61 „
	gekocht	58,34 „	37,70 „	3,05 „	0,89 „	6,03 „

Doppelt abgewogene Mengen dieser Proben wurden mit eiskaltem, stickstoff-freiem Wasser 15 Minuten hindurch gerührt, wobei die Temperatur 10° nicht überschreiten durfte. Diese Operation wurde so oft wiederholt, bis nichts mehr in Lösung ging; der Auszug wurde auf ein bestimmtes Volumen gebracht und in aliquoten Teilen Gesamt-Rückstand, Asche, Gesamt-Stickstoff und Proteinsubstanzen bestimmt. Zur Abscheidung des koagulierbaren Eiweißes, des Albumins, wurde bis auf die Hälfte des Volumens eingedampft, mit $\frac{1}{10}$ N.-Natronlauge unter Anwendung von Lackmuspapier

neutralisiert, nochmals auf dem Wasserbade erwärmt, filtriert und mit heißem Wasser nachgewaschen. Der Filtrerrückstand wurde nach Kjeldahl verbrannt. Die Albumosen wurden aus dem bis auf 30 ccm eingedampften Filtrat durch Sättigung mit Zinksulfat gefällt und auf dem Wasserbade bis zur Klärung erwärmt. Nach 12 Stunden wurde der Niederschlag abfiltriert, in bekannter Weise ausgewaschen und der Albumosen-Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt. Die Peptone fällte Verf. im Filtrat der Albumosen-fällung durch Brom, und im Filtrat der Peptonfällung bestimmte er den durch obige Reagenzien nicht gefällten Stickstoff. — Der Fleischrückstand vom kalten, wässrigen Auszuge wurde mit 10%-iger Kochsalzlösung so lange extrahiert, bis eine Probe, nach Kjeldahl verbrannt, keinen Stickstoffgehalt mehr anzeigte. Zum Schluß wurde zur Entfernung des Salzes mit reinem Wasser nachgewaschen, das Filtrat auf ein bestimmtes Volumen gebracht und in einem aliquoten Teil die Trennung und Bestimmung der Proteinkörper, wie oben beschrieben, vorgenommen. Aus dem Rückstand des mit Kochsalzlösung behandelten Fleisches wurden mit 0,15%-iger Salzsäure die hierin löslichen Bestandteile ausgezogen und in dem Auszug Gesamt-Rückstand, Asche, Gesamt-Stickstoff, Albumin, Albumosen, Peptone und die schließlich noch übrig bleibende Stickstoffsubstanz bestimmt. In gleicher Weise wurde mit dem 0,15%-igen Kalilauge-Auszug verfahren und hierin Gesamt-Stickstoff, durch schwache Säure fällbares Eiweiß, Albumosen, Peptone und Rest-Stickstoff bestimmt. Der Rückstand der Fleischproben nach der Behandlung mit Kalilauge wurde mit Salzsäure unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator neutralisiert und schließlich noch mit heißem Wasser ausgekocht. Daß sich hierbei eine geringprozentige Kochsalzlösung bildete, kam nicht in Betracht, da das Fleisch schon vorher mit einer starken Salzlösung extrahiert war. Der heiße Auszug wurde auf dieselben Bestandteile, wie oben, untersucht. Nach allen diesen Extraktionen fand man im Rückstand der Fleischproben die ungelöst gebliebene Stickstoffsubstanz durch Verbrennung nach Kjeldahl. Verf. gibt dann eine große Anzahl sehr übersichtlicher Tabellen über die bei den einzelnen Auszügen gewonnenen Resultate, teils auf Proteinsubstanz, teils auf Stickstoff berechnet. Dieselben sind, soweit sie hier interessieren, in den nachfolgenden Tabellen zusammengefaßt:

Übersicht über die lösliche Stickstoff-Substanz, in Prozenten des
Fleisches ausgedrückt.

Form des Stickstoffs	In kaltem Wasser			In 10%-iger Kochsalzlösung			In 0,15%-iger Salzsäure			In 0,15%-iger Kalilauge			In heißem Wasser		
	I roh	II		I	II		I	II		I	II		I	II	
		roh	ge- kocht		roh	ge- kocht		roh	ge- kocht		roh	ge- kocht		roh	ge- kocht
Koagulierbares Eiweiß . . .	0,3485	0,4454	0,0080	0,7234	0,8370	0,0195	0,2861	0,3393	0,1842	0,2370	0,3398	0,5419	0,0083	0,0517	0,7145
Durch Zinksul- fat gefällt (Albumosen)	0,0126	0,0387	0,0190	0,0192	0,0189	0,0113	0,0085	0,0647	0,1329	0,1125	0,0396	0,1391	0,0020	0,0302	0,2600
Durch Brom ge- fällt (Peptone)	0,0043	0,0053	0,0160	0,0138	0,0125	0,0068	0,0107	0,0143	0,0071	0,0944	0,0138	0,0126	0,0019	0,0113	0,0268
Nicht gefällter Stickstoff . .	0,3365	0,3205	0,2788	0,0151	0,1536	0,1104	0,0112	0,0152	0,0226	0,0773	0,0648	0,1252	0,0066	0,0065	0,0162
Gesamt-Stick- stoff, berechnet	0,7019	0,8099	0,3218	0,8015	1,0220	0,1480	0,3165	0,4335	0,3468	0,5212	0,4570	0,8188	0,0188	0,0997	1,0175
Gesamt-Stick- stoff, bestimmt	0,7351	0,9175	0,3656	0,8449	1,1101	0,0886	0,3603	0,3855	0,3669	0,5771	0,3509	0,7739	0,0206	0,1325	0,9987

Übersicht über die Stickstoffverbindungen des Fleisches.

Art des Fleisches	a) In Prozenten des frischen Fleisches							b) In Prozenten des Gesamt-Stickstoffs						
	Gesamt- Stickstoff	Stickstoff, löslich in						Gesamt- Stickstoff	Stickstoff, löslich in					
		kaltem Wasser	10%-iger Kochsalz- lösung	0,15%-iger Salzsäure	0,15%-iger Kalilauge	heißem Wasser	ungelöst gebliebener Stickstoff		kaltem Wasser	10%-iger Kochsalz- lösung	0,15%-iger Salzsäure	0,15%-iger Kalilauge	heißem Wasser	ungelöst gebliebener Stickstoff
I. Roh	3,1900	0,7351	0,8449	0,3603	0,5771	0,0206	0,1130	23,05	26,49	11,29	18,09	0,65	3,54	16,89
II. { Roh	3,6100	0,9175	1,1101	0,3855	0,3509	0,1325	0,2170	25,42	30,76	10,68	9,69	3,67	6,02	13,76
Gekocht . .	6,0300	0,3656	0,0886	0,3669	0,7739	0,9987	2,9856	6,07	1,47	6,09	12,83	16,56	49,51	7,47

Verf. weist dann darauf hin, daß die kalten, wässrigen Fleischauszüge sauer reagieren, und daß beim Kochen der kalten Auszüge zur Abscheidung des Albumins die freie Säure zunimmt, was auch mit früheren Beobachtungen von Halliburton über Muskelfleischauszüge in Einklang stehen soll. Die Säure wurde als Milchsäure in Rechnung gezogen. Ferner untersuchte Verf. den Einfluß der Wärme auf den kalten, wässrigen Fleischauszug und fand, daß der neutralisierte Auszug beim Erwärmen auf 45° eine leichte Trübung zeigte, bei 55° milchig wurde und daß bei 61—65° eine starke flockige Ausscheidung erfolgte. Wurde nun filtriert und wieder erhitzt, so trat wieder bei 45° leichte Trübung und beim Kochen Ausscheidung ein. Hieraus schließt Verf. auf die Notwendigkeit, zur Abscheidung des Albumins auf ein geringes Volumen einzudampfen. Der Stickstoffverlust ist auf die Verwendung von Brom als Fällungsmittel für die Peptone zurückzuführen, da Brom aus Stickstoffverbindungen Stickstoff frei macht. Wie die Tabelle zeigt, ist ungefähr ein Drittel der Proteinsubstanzen des frischen Fleisches und nur 0,5% des gekochten Fleisches in 10%-iger Kochsalzlösung löslich, auch scheinen hierdurch mehrere Proteinkörper gelöst zu werden. Von Verf. sind weitere Untersuchungen darüber im Gange. Ebenso ist die Menge der in Salzsäure löslichen Proteinstoffe eine verhältnismäßig große und zudem abhängig von der Konzentration der Säure. Die Löslichkeit des rohen und gekochten Fleisches in Salzsäure ist die gleiche. Aus der Lösung der Eiweißstoffe in Kalilauge wurden diese durch die gewöhnlichen Reagenzien nur unvollkommen wieder gefällt, sodaß ein beträchtlicher Teil des Stickstoffs nach allen Behandlungen in Lösung blieb. Das gekochte Fleisch ist in Kalilauge löslicher als das rohe. Bei der schließlichen Auskochung mit heißem Wasser gibt rohes Fleisch nicht mehr viele Nährstoffe ab, gekochtes Fleisch dagegen hat nach den vorausgehenden Behandlungen wieder eine größere Löslichkeit gewonnen, und zwar sind hauptsächlich Albumosen in Lösung gegangen. Im ganzen ist beim rohen Fleisch 96,48 bzw. 93,98%, beim gekochten Fleisch nur 50,49% des vorhandenen Stickstoffes gelöst worden, was ein erneutes Licht auf die verschiedene Verdaulichkeit beider Fleischzubereitungen wirft. — An obige Untersuchungen schließt Verf. noch ein Kapitel an über die Natur der wasserlöslichen Stickstoffverbindungen des Fleisches. 10—15 g frisches Fleisch wurden nacheinander mit geringen Mengen kalten Wassers solange extrahiert, bis der Auszug 500 ccm betrug. In aliquoten Teilen desselben wurden Gesamtstickstoff, Asche und Stickstoff-Substanz bestimmt. Um Einblick in die Natur der Stickstoffverbindungen zu erhalten, wandte Verf. verschiedene Fällungsmethoden an, nämlich 1. mit Brom in schwach salzsaurer Lösung, 2. mit 1 g Kochsalz und einem geringen Überschuß einer wässrigen Tanninlösung, 3. mit Phosphorwolframsäure nach dem Ansäuern mit 5 ccm einer 50%-igen Schwefelsäure in der Kälte. In diesen drei Fällen wurde die Stickstoffsubstanz nach zwölfstündigem Stehen und Abfiltrieren nach Kjeldahl bestimmt; 4. wurde mit Phosphorwolframsäure in der Wärme gefällt und nach 3—4 Minuten langem Kochen rasch abfiltriert

und der Rückstand verbrannt. Der Ammoniakstickstoff wurde durch Destillation mit Magnesiumoxyd oder Baryumkarbonat gefunden. Diese Bestimmungen wurden bei Rind- und Kalbfleisch ausgeführt. Die nachstehenden tabellarischen Zusammenstellungen enthalten die Untersuchungsergebnisse des Verf.'s in einiger Verkürzung.

Übersicht über die in kaltem Wasser löslichen und unlöslichen Bestandteile des Fleisches.

a) Gesamt-Nährstoffe im ursprünglichen Fleisch:

Art des Fleisches			Wasser	Protein	Fleisch-	Fett	Asche	Son-	Zu-	Gesamt-	
			%	%	basen	%	%	stige	sammen	Stick-	
			%	%	%	%	%	Be-	%	stoff	
								stand-		%	
			teile								
Rohes Rindfleisch	Lende	mager	75,46	18,93	1,16	3,08	1,02	1,48	25,67	3,401	
		fett	60,39	16,07	0,84	20,89	1,11	1,39	40,30	2,840	
	Schinken	mager	74,01	18,71	1,21	4,63	1,05	3,13	28,74	3,382	
		fett	76,22	18,46	1,23	2,36	1,08	1,71	24,84	3,348	
	Mittel		71,52	18,04	1,11	7,74	1,07	1,93	29,89	3,243	
Rohes Kalbfleisch	Keule, mager	(2 Proben)	75,97	19,17	1,26	0,96	1,15	1,94	24,47	3,470	
			75,53	18,02	1,08	3,99	1,10	1,37	25,57	3,230	
	Mittel		75,75	18,60	1,17	2,48	1,13	1,66	25,02	3,350	

b) In Wasser lösliche Nährstoffe:

Rohes Rindfleisch	{	Lende	{	mager	—	2,31	1,16	0	0,91	1,48	5,86	0,742
			{	fett	—	1,81	0,84	0	0,77	1,39	4,81	0,559
	{	Schinken	{	mager	—	2,44	1,21	0	0,84	3,13	7,63	0,779
			{	fett	—	2,21	1,23	0	0,82	1,71	5,97	0,748
			Mittel	—	2,19	1,11	0	0,84	1,93	6,07	0,707	
Rohes Kalbfleisch	{	Keule, mager (2 Proben)	{	—	2,83	1,26	0	1,00	1,94	7,02	0,855	
			{	—	1,90	1,08	0	0,91	1,37	5,26	0,650	
			Mittel	—	2,37	1,17	0	0,96	1,66	6,14	0,753	

c) In Wasser unlösliche Nährstoffe:

Rohes Rindfleisch	Lende	mager	—	16,62	0	3,08	0,11	0	19,81	2,659	
		fett	—	14,26	0	20,89	0,34	0	35,49	2,281	
	Schinken	mager	—	16,27	0	4,63	0,21	0	21,11	2,603	
		fett	—	16,25	0	2,36	0,26	0	18,87	2,600	
	Mittel			—	18,58	0	7,74	0,23	0	23,82	2,536
Rohes Kalbfleisch	Keule, mager	(2 Proben)	—	16,34	0	0,96	0,15	0	17,45	2,615	
			—	16,12	0	3,99	0,19	0	20,30	2,580	
	Mittel			—	16,23	0	2,48	0,17	0	18,88	2,598

Übersicht über die im Fleisch vorhandenen Stickstoff-Verbindungen
(in Prozenten der Gesamt-Stickstoff-Substanz ausgedrückt).

Art des Fleisches	Durch kaltes Wasser aus- gezogen	Durch Hitze koagulierbar	Fällung durch						Als Protein im wässrigen Auszuge	Als Nicht- Protein im wässrigen Auszuge	Als freies Ammoniak	
			Zinksulfat (Albu- mosen)	Brom im Filtrate der Zinksulfat- Fällung	Brom direkt	Phosphor- wolfram- säure in der Wärme	Phosphor- wolfram- säure in der Kälte	Tannin- und Salz- lösung				
Rind- fleisch {	Lende	21,80	8,57	1,74	0,57	8,59	5,20	10,93	11,06	10,88	10,92	—
	„	19,66	9,53	0,52	0,13	8,67	9,37	9,49	9,02	10,18	9,48	0,22
	Schinken	22,04	10,63	0,79	0,11	7,24	10,59	11,27	11,32	11,53	11,51	0,62
	„	22,34	9,80	0,65	0,10	9,13	9,77	11,47	10,79	10,55	11,79	0,34
Mittel		21,71	9,63	0,93	0,23	8,41	8,73	10,79	10,55	10,79	10,92	0,39
Kalb- fleisch {	Lende	24,64	11,42	1,26	0,35	10,67	11,20	12,10	12,74	13,03	11,61	0,39
	„	20,13	8,18	0,74	0,46	6,99	7,28	7,84	8,97	9,38	10,75	0,61
	Mittel	22,39	9,80	1,00	0,41	8,83	9,24	9,97	10,86	11,21	11,18	0,50

Die Ergebnisse lassen sich in Worten kurz dahin zusammenfassen, daß die Proteinstoffe und Aschenbestandteile des Kalbfleisches etwas größere Löslichkeit in Wasser besitzen als die des Rindfleisches, doch kann man sagen, daß im Mittel $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ der gesamten Nährstoffe dieser Fleischsorten in kaltem Wasser löslich ist, und ferner, daß, je mehr Stickstoffsubstanz im Fleisch überhaupt vorhanden ist, um so mehr auch von kaltem Wasser gelöst wird. Der Gehalt an Albuminstickstoff ist im allgemeinen 10-mal so hoch wie der an Albumosenstickstoff und auch die Peptone sind nur in geringer Menge vorhanden. Das Gesamteiweiß wird durch Brom und Phosphorwolframsäure in der Wärme nicht vollständig gefällt, sodaß Brom nicht als geeignetes Fällungsmittel angesehen werden kann. Ammoniak ist nur in geringen Mengen anwesend. Die Tabelle zeigt schließlich, daß die Hälfte aller gelösten Stickstoffsubstanz als Eiweißstickstoff vorhanden ist.

A. Behre.

Bernhard Schöndorff: Über den Maximalwert des Gesamtglykogen-
gehaltes von Hunden. (Pflüger's Archiv 1903, **99**, 191—242.) — Verfasser
suchte den Maximalwert für den Gesamtglykogengehalt gut genährter Hunde festzu-
stellen. Zu diesem Zwecke stand es als notwendig fest, sich nicht nur mit der Gly-
kogenbestimmung in der Muskulatur und der Leber zu begnügen, sondern, da es sich
herausgestellt hatte, daß auch in den übrigen Organen nicht unbedeutliche Mengen
von Glykogen vorkommen könnten, auch in allen anderen Organen die Glykogen-
menge festzustellen. Es wurde in allen Versuchen das Glykogen bestimmt in der
Leber, den Muskeln, den Knochen, den Eingeweiden, worunter sämtliche innere Or-
gane mit Ausnahme von Herz und Gehirn und Leber zu verstehen sind, dem Fell,
dem Herzen, dem Gehirn und dem Blut. Bezüglich der Glykogenanalyse der Muskeln
und Knochen hat Verf. nicht die ganze Muskulatur und die ganzen Knochen auf
Glykogen untersucht, sondern das Tier genau in der Medianebene durchsägt und nur
das Glykogen der einen Hälfte bestimmt. Bei der Fütterung der Hunde ging Verf.
von der Erwägung aus, daß ein möglichst großer Glykogenansatz wahrscheinlich dann
stattfinden würde, wenn neben Kohlenhydraten eine größere Menge Eiweiß in der Nah-
rung sei, so daß vom Eiweiß der größere Teil des Stoffwechsels bestritten und das
aufgenommene Kohlenhydrat als Glykogen angesetzt würde. Es wurden deshalb die
Hunde mit Fleisch und Reis gefüttert. Da sich aber bei den beiden ersten Ver-
suchen herausstellte, daß die Reisstärke bei Hunden nicht sehr geeignet sei, eine

Glykogenanhäufung herbeizuführen, so wurden in den folgenden Versuchen neben Fleisch und Reis noch Kartoffeln und eine größere Menge Rohrzucker verfüttert und zwar bei Hunden von einem Gewicht von 6—9 kg anfangs 100, dann bis 150—200 g Rohrzucker täglich. Die Ausführung der Glykogenanalyse geschah nach den von Pflüger (*Z.* 1904, 7; 610) angegebenen Vorschriften zur Ausführung einer quantitativen Glykogenanalyse. Verf. gelangte zu folgenden Ergebnissen: 1. 1 kg Hund kann bei reichlicher Ernährung mit Fleisch und Kohlenhydraten in maximo 40,897 g Zucker, bezw. 37,87 g Glykogen enthalten. 2. Es kommen bei der Fütterung von Hunden mit derselben Nahrung sehr große Schwankungen im Gesamtglykogengehalt vor. Der niedrigste Wert beträgt pro Kilogramm Tier 8,19 g Zucker, bezw. 7,59 g Glykogen, der höchste 40,897 g Zucker, bezw. 37,87 g Glykogen. 3. Bei dem Vergleich des Glykogengehaltes der Leber mit dem des übrigen Körpers kommen ebenfalls solche große Schwankungen vor. Auf 100 g Leberglykogen können kommen im übrigen Körper 76,17 bis 398 g. 4. Der beobachtete Maximalglykogengehalt der Leber beträgt 20,17% Zucker, bezw. 18,69% Glykogen. 5. In einem Versuche war in verschiedenen Leberlappen ungefähr die gleiche Menge Glykogen, 20,28% und 19,88%. 6. Die Beziehung des Lebergewichtes zum Körpergewicht ergab bei reichlicher Kohlenhydratnahrung als Minimalwert 2,49%, als Maximalwert 12,43%, im Mittel 6,34%. 7. Der Glykogengehalt der Muskeln schwankt zwischen 0,78% Zucker, bezw. 0,72% Glykogen als niedrigstem und 4,01% Zucker, bezw. 3,72% Glykogen als höchstem Wert. 8. Außer Leber und Muskeln enthalten auch alle übrigen Organe ganz beträchtliche Mengen von Glykogen. 9. Es ist nicht notwendig, das gefällte Glykogen am nächsten Tage schon abzufiltrieren, sondern man kann damit längere Zeit warten, bis zu drei Wochen. Man muß nur dafür sorgen, daß die Bechergläser gut zugedeckt an einem kühlen Orte aufbewahrt werden und der verdunstete Alkohol erneuert wird.

Max Müller.

Georg Landsberg: Über den Alkoholgehalt tierischer Organe. (*Zeitschr. physiol. Chem.* 1904, 41, 505—523.) — Um den Alkohol qualitativ möglichst einfach und sicher nachzuweisen verfuhr Verf. folgendermaßen: Es wurde die zu untersuchende Flüssigkeit mit Schwefelsäure und Kaliumchromat in bestimmten Verhältnissen versetzt, destilliert und das Destillat in Fraktionen aufgefangen. Es sollte dabei der Alkohol in Aldehyd übergeführt und als solcher nachgewiesen werden. Zum Nachweis des Aldehyds dienten folgende Reaktionen: 1. Die Bildung von Aldehydharz durch Erhitzen mit konzentrierter Natronlauge. Bei einer Konzentration von 1 : 10000 tritt nur noch ganz schwache Gelbfärbung auf; daneben ist für die Reaktion ein Geruch charakteristisch, der an den Geruch geschmorter Birnen erinnert. 2. Die Reduktion von ammoniakalisch-alkalischer Silberlösung unter Bildung eines Silberspiegels. 3. Die Reaktion mit Neßler's Reagens nach Crismer, bei der bei Verdünnungen von 1 : 25000 noch ein schwacher Niederschlag, bei solchen von 1 : 100000 noch deutliche Gelbfärbung auftritt. 4. Die Jodoformprobe nach Lieben. Um festzustellen, wie groß man den Zusatz von Schwefelsäure und Kaliumchromat wählen muß, um die Oxydation des Alkohols bis zum Aldehyd und nicht darüber hinaus zu führen, wurden eine Reihe von Versuchen angestellt, die zu dem Ergebnis führten, daß man die stärksten Reaktionen findet bei Zusatz von 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure und 5 ccm einer 2%-igen Kaliumchromatlösung zu 100 ccm der Alkohollösung. Nach den angegebenen Methoden wurden nun folgende Organe auf ihren Alkoholgehalt untersucht: 1. Rinderleber, einige Stunden nach Tötung des Tieres; 2. Kalbsleber, am zweiten Tage nach der Tötung; 3. Kaninchenleber, 24 Stunden nach der Tötung; 4. Rinderleber, zwei Tage nach der Tötung; 5. Rinderleber, vier Tage liegend; 6. Muskelfleisch vom Rind, vier Tage nach der Tötung; 7. Muskelfleisch vom Rind, 7 Tage gelegen; 8. Rinderleber, zwei Tage alt; 9. Rinderleber, nach Zusatz von 1 g Glykose; 10. Rinder-

leber, zwei Tage im Brutofen stehend; 11. Rinderleber, nach Zusatz von 1 g Glykose, zwei Tage im Brutofen stehend. Bei diesen nicht lebensfrischen Organen fand sich stets Alkohol. In den Fällen, in denen die Organe noch nicht lange gelegen hatten, war er quantitativ nicht zu bestimmen; in den übrigen Fällen war auch seine Quantität bestimmbar; sie nahm mit der Dauer des Liegens der Organe vor der Verarbeitung bzw. mit der Intensität der Fäulnis zu. Ob der Zusatz von Glykose seine Menge vermehrte, ließ sich nicht mit Sicherheit feststellen. Diese Versuche des Verf. zeigten mithin, daß in tierischen Organen unter bakterieller Einwirkung Alkohol entsteht. Um nachzuweisen, ob sich auch Alkohol normalerweise in lebensfrischen Organen fände, verarbeitete Verf. Leber und Muskelfleisch von Kaninchen sofort nach der Tötung. Verf. kam hierbei zu folgenden Ergebnissen: Auch in ganz lebensfrischen Organen ließ sich der Alkohol qualitativ, in zwei Versuchen auch quantitativ, stets nachweisen, wobei es nicht sehr wahrscheinlich erscheint, daß die Ernährungsweise einen bestimmenden Einfluß auf die Konzentration des Alkohols bzw. seine Menge ausübt. Von Interesse war für den Verf. die Frage, ob sich etwa bei der Autolyse der Organe Alkohol bilde. Da die aseptische Autolyse infolge der Schwierigkeit ihrer Durchführung wenig aussichtsreich erschien, so wurde bei den diesbezüglich angestellten Versuchen die antiseptische Autolyse unter Zusatz von Toluol (2–5%) gewählt. In allen Fällen wurden lebensfrische Organe von Kaninchen verwendet. Verf. kommt bei den autolytischen Versuchen zu dem Ergebnis, daß in allen den Fällen, in denen durch Sterilbleiben der Gelatineröhrchen bakterielle Zersetzung ausgeschlossen werden konnte, eine irgendwelche merkbare Zunahme des Alkoholgehaltes nicht eintritt, auch nicht nach Zusatz von Glykose. Alkohol findet sich in geringen Mengen präformiert in den Geweben, bei der Autolyse nimmt seine Menge nicht merklich zu, wohl aber bei der bakteriellen Zersetzung.

Max Müller.

H. Wolff: Über die Beurteilung des Fäulniszustandes von Fleisch nach dem Gehalt an Bernsteinsäure. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 1904, 4, 254–258.) — In einer Mitteilung „Über Methoden zur Begutachtung des Fleischextraktes“ erwähnen Kutscher und Steudel (Z. 1904, 8, 300) die auffallende Tatsache der Anwesenheit großer Mengen von Bernsteinsäure in Liebig's Fleischextrakt; aus 50 g Fleischextrakt konnten 0,325 bis 1,103 g der Säure isoliert werden. Da nach Salkowski's und Blumenthal's Arbeiten sich Bernsteinsäure nicht in frischem Fleisch findet, sondern erst bei der Fäulnis als Stoffwechselprodukt von Bakterien auftritt, so schienen die Arbeiten von Kutscher und Steudel darauf hinzudeuten, daß bei der Bereitung des Extraktes faulendes Fleisch zur Anwendung gelange. Da nun Blumenthal in seiner Arbeit (Virchow's Archiv 1899, 137, 539) nur frisches und stark faulendes Fleisch untersucht hat, so schien es dem Verf. nicht ausgeschlossen, daß in einem Zwischenstadium, in dem sich das Fleisch noch als genießbar bezeichnen ließ, bereits soviel Bernsteinsäure gebildet sein konnte, wie den von Kutscher und Steudel gefundenen Mengen entspricht. Verf. hat nun nach dieser Richtung hin Versuche angestellt. Mit der Maschine zerkleinertes Rindfleisch wurde mit Wasser übergossen, zwei Stunden auf 100° erwärmt, dann koliert und scharf ausgepreßt. Das Filtrat wurde — nach dem Vorgange von Kutscher und Steudel — kalt mit Ammonsulfat gesättigt, von den abgeschiedenen Eiweißstoffen abfiltriert, mit etwas Soda versetzt und auf $\frac{3}{4}$ des Volumens verdampft. Nach dem Erkalten und Filtrieren wurde mit Schwefelsäure angesäuert, dreimal mit Äther ausgeschüttelt (zur Entfernung etwa vorhandener Hydrozimt- und Phenyllessigsäure), dann stark sauer gemacht und sechsmal mit Alkohol-Äther ausgeschüttelt. Von den gesammelten alkoholisch-ätherischen Auszügen wurde $\frac{1}{10}$ gesondert abgedampft, um zum qualitativen Nachweis der Bernsteinsäure mittels der „Husten-“ und „Pyrrolprobe“ zu dienen. Der Rest wurde zur quantitativen Bestimmung verwandt. Es wurde

in dieser Weise Fleisch untersucht, das ein bis neun Tage alt war. Verf. gelangt zu folgenden Resultaten: Vom 1. bis 3. Tag war gar keine oder eine nur qualitativ nachweisbare Menge Bernsteinsäure in dem noch frischen Fleisch vorhanden; vom 4. bis 5. Tage konnte man das Fleisch als nicht mehr frisch, aber doch genießbar ansehen. Die Menge der Säure betrug (auf 1 kg berechnet):

Berechnet aus dem Silbersalz	0,063	0,052	0,047 g
Direkt gewogen	0,056	0,047	0,043 g

Am 7. Tag war sowohl Fleisch wie wässriger Auszug faul. Es berechneten sich Bernsteinsäure 0,075 g, während 0,069 g auskrystallisierten. Am 9. Tag endlich wurden durch Berechnung 0,219 und 0,173 g, durch Wägung 0,201 und 0,168 g gefunden. Nach diesen Ergebnissen scheinen also die größten Mengen Bernsteinsäure in den letzten Stadien der Fäulnis gebildet zu werden. Nimmt man an, daß zur Herstellung von 50 g Fleischextrakt 3 kg Fleisch erforderlich sind, so müßten sich nach dem Verf. zur Deckung des kleinsten von Kutscher und Steudel gefundenen Gehaltes an Bernsteinsäure in 1 kg Fleisch über 0,100 g Bernsteinsäure finden. Das Fleisch, in dem Verf. jedoch solche Mengen fand, war als ungenießbar zu bezeichnen. Die Frage nach dem Ursprung der erheblichen Mengen Bernsteinsäure, die Kutscher und Steudel in Liebig's Fleischextrakt fanden, bleibt daher nach dem Verf. unbeantwortet.

Max Müller.

Muneco Kumagawa und Kenzo Suto: Über die Bestimmung des Fettgehaltes tierischer Flüssigkeiten nach Pflüger-Dormeyer. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. 1904, 4, 185—191.) — Verff. haben sich bemüht, das Verfahren von Dormeyer, welches auf der Aufschließung der Organe mit Pepsin-Salzsäure behufs nachheriger Extraktion des Fettes beruht, zu vereinfachen. Der Extraktionsapparat, dessen die Verff. sich bei ihren Versuchen bedienten, hatte folgende Beschaffenheit: Der Extraktionscylinder faßt etwa 150 ccm. Derselbe trägt ein weites Seitenrohr, welches zum Aufsteigen der Ätherdämpfe und zum Abfließen des kondensierten Äthers dient. Die konische Verlängerung des Cylinders ist in die Mündung des Siedekölbchens von ebenfalls 150 ccm Inhalt eingeschliffen. Innerhalb und etwas oberhalb des Konus befindet sich das untere Ätherückflußröhrchen mit seinem allmählich zugespitzten Ende. Dasselbe hat an seinem oberen und seitlichen Teil eine Öffnung, welche zum Aufsteigen des Ätherdampfes dient. Die obere Mündung des Extraktionscylinders wird von einem eingeschliffenen Glasstöpsel verschlossen, welcher eine Fortsetzung des darauf sitzenden Rückflußkühlers bildet. Der Glasstöpsel trägt innen das obere Ätherückflußröhrchen mit einer Öffnung für den Durchtritt des Ätherdampfes. Ein langes schmales Rohr (der „Ätherinjektor“), welches bei der Extraktion in den Cylinder hineingebracht wird, bildet den wesentlichsten Teil des Apparates. Das untere Ende desselben ist zu einer unten abgeflachten Kugel aufgeblasen, die seitlich drei feine Öffnungen trägt. Das obere cylinderförmig erweiterte Ende des Ätherinjektors nimmt die untere Spitze des oberen Ätherückflußröhrchens auf. Der obere Teil des Extraktionscylinders ist von erheblicher Länge, damit der mit Substanz beladene Äther nicht bis zur Mündung hinaufsteigt, vor allem aber, damit der im Injektor in hoher Schicht befindliche Äther einen genügenden Druck ausüben kann. Infolge dieses Druckes tritt der Äther aus den Öffnungen der kugelförmigen Erweiterung in feinen Strahlen heraus, welche, an die Wand des Extraktionscylinders stoßend, in feine Tröpfchen zerfallen und nun, indem sie gleichmäßig durch die ganze Flüssigkeit verteilt aufsteigen, die zu extrahierende Substanz aufnehmen. Die Öffnungen müssen im Mittel einen Durchmesser von etwa 0,4 mm besitzen. Verff. haben als Belege für die Brauchbarkeit des Apparates Versuche mit Lösungen angestellt, die 0,1% Salicylsäure und 0,1% Koffein enthielten und dabei sehr befriedigende Resultate

erhalten. Auch Milch, Blutserum und Ascitesflüssigkeit wurden mit dem Apparate auf ihren Fettgehalt untersucht. Nach den Ergebnissen, die Verff. hiermit erhielten, glaubten dieselben zu der Annahme berechtigt zu sein, daß ihre Methode für genaue MilCHFettbestimmungen den bisher gebräuchlichen Methoden vorzuziehen sei. Doch muß man bei allen Flüssigkeiten, welche wie Milch Eiweiß gelöst enthalten und daher beim Schütteln mit Äther dicke Emulsionen bilden, eine kurzdauernde Verdauung mit Pepsin-Salzsäure vorausgehen lassen. Eine fast ätherextraktfreie Pepsin-Salzsäure erhielten Verff. durch folgendes Verfahren: Die Magenschleimhaut eines eben geschlachteten Schweines wurde möglichst von Schleim befreit, abgewaschen und der rotgefärbte Fundusteil zu einem feinen Brei zerhackt, in ein Liter Salzsäure von 0,5% eingebracht und bei 40° C 15 bis 20 Stunden digeriert. Dann wurden etwa 20 g Blutkohle zugesetzt, noch einige Stunden digeriert und die Flüssigkeit schließlich auf ein Faltenfilter gebracht. Die so erhaltene Pepsin-Salzsäure ist fast vollkommen farblos und wasserklar und gibt, in dem Apparat der Verff. 30 Stunden extrahiert, nur 0,0019 g Rückstand bei Verwendung von 100 ccm der Pepsin-Salzsäure. Die MilCHFettbestimmung führten Verff. folgendermaßen aus: 10 ccm bzw. 10 g Milch werden mit 40 ccm Salzsäure von 0,5% und 50 ccm frisch bereiteter Pepsinsalzsäure versetzt, zwei bis fünf Stunden bei 40° C digeriert und dann in beschriebener Weise mit Äther extrahiert. Nach 10 Stunden andauernder Extraktion wird der Äther verdunstet, dann der Rückstand kurze Zeit bei 50° C getrocknet, nach dem Erkalten von neuem mit absolutem Äther aufgenommen und die Lösung durch ein Asbestfilter in ein gewogenes Bechergläschen filtriert. Nach Verdunsten des Äthers kurz dauerndes Trocknen erst bei 50° C, sodann im Vakuum über Chlorcalcium bis zum konstanten Gewichte.

Max Müller.

Adolf Beythien, H. Hempel und Paul Bohrisch: Fleischkonservierungsmittel. (Bericht des Untersuchungsamtes Dresden 1903, 5.) — Alu enthielt Aluminiumsulfat 3,31, Dinatriumphosphat 54,23, Wasser 42,64%. — Konservesalz bestand aus Kaliumnitrat 71,73, Chlornatrium 25,74, MilChzucker 0,98, Wasser 1,55%. — Assalin enthielt Aluminiumacetat 10, Kaliumnitrat 4,5, Rohrzucker 5,3, Glycerin 3,7, Wasser 76,5%. Eine Flasche mit 750 ccm der farblosen Flüssigkeit kostete 3,50 M., Wert 45 Pfg.

C. Mai.

Baier: Nachweis von Pferdefleisch in Wurst. (Bericht des Untersuchungsamtes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Brandenburg 1903, 5.) — Die chemischen und biologischen Verfahren des Pferdefleischnachweises lassen bei Würsten völlig im Stich, dagegen konnten verschiedene Proben auf Grund der auffallend faserigen Struktur der Fleischmasse bei der Ritzprobe als verdächtig eines Gehaltes an Pferdefleisch angesehen werden, ein Verdacht, der durch kriminelle Erhebungen mehrfach bestätigt werden konnte.

C. Mai.

Wacker: Albumina. (Bericht des Untersuchungsamtes Ulm 1902—1904, 26.) — Das unter dieser Bezeichnung von einer Stuttgarter Konservensalzfabrik vertriebene Pulver bestand aus einer Mischung einer billigen Gummisorte und Borax. Das Pulver bildet mit Wasser eine gallertartige Masse, die sich in jedem Verhältnis mit dem Wurstbrat vermischen läßt. Eiweiß war darin nicht nachweisbar.

C. Mai.

Adolf Beythien, H. Hempel und Paul Bohrisch: Wurstbindemittel. (Bericht des Untersuchungsamtes Dresden 1903, 6.) — Als Ersatz des Stärkemehles zur Erzielung größerer Bindigkeit der Wurstfüllung benutzen neuerdings die Fleischer Geheimmittel, die im wesentlichen aus Eiweiß bestehen; die Zusammensetzung eines derartigen Präparates Musalina war: Wasser 13,47, Fett 0,55, Stickstoffsubstanz 70,65, Asche, 9,86, Phosphorsäure 5,51%.

C. Mai.

Herbert E. Davies: Searl's Prüfung auf Hefenextrakt. (Pharmaceutical Journ. 1904, 72, 86.) — Im „Pharmaceutical Journal“ vom 10. Oktober 1903 war von A. Searl eine Reaktion zur Entdeckung und Bestimmung von Hefenextrakt im Fleischextrakt angegeben worden. Dieselbe bestand darin, daß beim Zusatz einer abgeänderten Fehling'schen Lösung von bestimmter Zusammensetzung zu einer Auflösung des Extraktes, durch Kochen des Gemisches ein starker käsiger blauweißer Niederschlag entstehen sollte, falls Hefenextrakt zugegen sei, während bei reinem Fleischextrakt dieser Niederschlag nicht eintrete. Auch sollte der Niederschlag zur quantitativen Bestimmung von Hefenextrakt geeignet sein. Verf. hat nun diese Angaben nachgeprüft und dabei gefunden, daß schon beim bloßen Erhitzen der abgeänderten Fehling'schen Lösung, die bedeutend weniger Seignettesalz enthält als die ursprüngliche, ein reichlicher Niederschlag von Kupferoxyd ausfällt, der bei Anwesenheit organischer Substanzen größere Mengen derselben mitreißt. Wenn man nun die Menge des Seignettesalzes in der Fehling'schen Lösung erhöht, so entsteht ein Niederschlag, selbst bei reinem Hefenextrakt, überhaupt nicht. Verf. hat zur Prüfung des Verfahrens zunächst mit reinem Hefenextrakt gearbeitet unter Verwendung verschiedener Proben von „Marmite“. Er fand dabei immer nur einen wechselnden Bruchteil von Kupferoxyd, vermischt mit organischer Substanz. Auch Versuche mit reinem Fleischextrakt ergaben gleichfalls Niederschläge von derselben Beschaffenheit wie beim Hefenextrakt. Verf. kommt daher zu dem Schluß, daß Searl's Reaktion zur quantitativen Untersuchung nicht geeignet sei.

Max Müller.

A. Searl: Bemerkung zu vorstehender Arbeit. (Pharmaceutical Journ. 1904, 27, 86—87.) — Auf obige Ausführungen Davies' erwidert Searl, daß er mit „Marmite“ nicht gearbeitet habe, weil dies zur Prüfung seiner Reaktion ganz ungeeignet sei, da es in keiner Weise die charakteristische Reaktion gebe, wie es bei den kontinentalen Hefenextrakten der Fall sei. Gäben auch einige reine Fleischextrakte bei Anstellung der Reaktion einen leicht flockigen Niederschlag, so sei dieser doch gänzlich von dem von ihm bei Anwesenheit von Hefenextrakt beschriebenen verschieden. Er habe ferner bei der Reaktion vorgeschrieben, ein bis zwei Minuten zu kochen, während Davies drei Minuten kocht; außerdem sei der Niederschlag von Kupferoxyd, der sich dann bilde, ein wesentlich anderer als der von ihm beschriebene. Auf das Gewicht des Niederschlages käme es nicht an, die Hauptsache sei das charakteristische Aussehen desselben.

Max Müller.

Adolf Beythien, H. Hempel und Paul Bohrisch: Dr. Eberhardt's Milchfleischextrakt. (Bericht des Untersuchungsamtes Dresden 1903, 16.) — Die Untersuchung einer Probe des dunkelbraunen, fleischextraktähnlichen Präparates ergab als Zusammensetzung: Wasser 22,74, Asche 22,41, Stickstoffsubstanz 34,05, stickstofffreie Extraktstoffe 20,8⁰/₁₀₀. Bestandteile des Fleisches waren nicht nachweisbar, es handelt sich hier also wohl um ein aus Milch hergestelltes Präparat. Die neuerdings beliebte Sitte, derartigen aus Milch, Hefe u. s. w. gewonnenen Erzeugnissen den Namen Fleischextrakt beizulegen, erscheint geeignet, Täuschungen herbeizuführen und ist daher unzulässig.

C. Mai.

Karl Dieterich: Milchmalzextrakt. (Helfenberger Annalen 1903, 16, 246—249.) — Eine Probe amerikanisches Milchmalzextrakt stellte ein hellgelbliches, angenehm nach Malz riechendes und schmeckendes Pulver dar, das in Wasser leicht zu einer weißlich trüben Flüssigkeit löslich war; es enthielt: Feuchtigkeit 5,46, Gesamtfett (durch Verdauung) 8,16—8,24, direkt ausziehbares Fett 1,12, MilCHFett 7,5, Maltose 32,15, MilChzucker (aus der verarbeiteten Milch stammend) 11,2, MilChzucker (direkt zugesetzt) 5—6⁰/₁₀₀. Zur Herstellung von 100 Teilen des Extraktes dürften auf 70 Teile gewöhnlichen Malzextraktes von 45,71⁰/₁₀₀ Maltosegehalt rund 250 Teile Milch verwendet worden sein. — Eine Probe deutsches Milchmalz-

extrakt „Robuston“ enthielt: Feuchtigkeit 9,11, Asche 2,66, Maltose (direkt) 57,52, Maltose (im alkohollöslichen Anteil) 37,08, Fett (direkt mit Äther ausziehbar) 1,36, Gesamtfett (durch Verdauung) 4,9, MilCHFett 4,2, Pflanzenfett 0,7 %.

C. Mai.

Ferruccio Bimbi: Nutrium. (Staz. sperim. agrar. Ital. 1903, **36**, 518—519.) — Dieses Nährpräparat, ein weißes bis gelbliches Pulver, besteht aus Kasein, Kochsalz und MilChzucker. Es löst sich in kaltem und besonders in warmem Wasser zu einer milchigen Flüssigkeit von etwas saurerer Reaktion und enthält 6,77 % Wasser, 29,1 % Stickstoff-Verbindungen, 2,0 % Fett, 56,33 % Laktose und 5,9 % Mineralstoffe. Der Säuregehalt stieg von 0,27 g, auf MilChsäure berechnet, an feuchter Luft bei 15° auf 0,33 nach 5 Tagen, auf 0,42 nach 10 und auf 0,88 nach 20 Tagen. Da sich bereits am 10. Tage Schimmelpilze zeigen, wird man das Nutrium nur in luftfreien Gefäßen in den Handel bringen und aufbewahren dürfen.

W. Roth.

M. Mansfeld: Nährmittel aus Kokosnüssen. (16. Jahresbericht. d. Untersuchungsanstalt d. allgem. österr. Apoth.-Vereines 1903/04, 8.) — Die Untersuchung eines aus Amerika stammenden derartigen Erzeugnisses ergab als Zusammensetzung: Wasser 3,79, Mineralstoffe 1,04, Fett 49,4, Protein 6,2, Cellulose 7,6, sonstige stickstofffreie Extraktstoffe (vorwiegend Rohrzucker) 31,9 %. Das Präparat ist wegen des hohen Fett- und Cellulosegehaltes unzweckmäßig zusammengesetzt; auch zeigt das Fett den Geruch des ungereinigten Kokosfettes.

C. Mai.

Eier.

P. Welmans: Untersuchungen von Eikonserven. (Pharm. Ztg. 1903, **48**, 665—667 und 804.) — Abgesehen von den unaufgeschlagenen konservierten Eiern kommen Eikonserven in den Handel als 1. Eigelb flüssig, konserviert, meist aus Rußland und China eingeführt, 2. Eigelb in Teigform, konserviert, wohl ausschließlich technisch Zweckdienend, 3. Eigelb trocken in Krümelform, 4. Trockenei, Gelbe und Weiße gemischt und getrocknet, in Krümelform. Die Untersuchung der Eikonserven hat sich zu erstrecken auf Feuchtigkeit, Ätherextrakt, wasserlösliche Bestandteile, Chlorgehalt derselben und Mineralbestandteile, ferner auf Geruch und Geschmack der Konserve, Geruch des Ätherextraktes und auf Konservierungsmittel. Nach den Untersuchungen des Verf. betrugen bei den Hühnereiern die Schalen 11,47 %, Weiße 58,33 %, Gelbe 30,20 % und die prozentische Zusammensetzung des Eiinhaltes Weiße 65,89 %, Gelbe 34,11 %. Der Trockenrückstand der großen und kleinen Eier wurde getrennt analysiert, indessen hatten die beiden Proben in zwischen wieder etwas Feuchtigkeit angezogen und es fanden sich:

	In großen Eiern	In kleinen Eiern
Feuchtigkeit	1,58 %	2,28 %
Ätherextrakt	41,88 „	39,75 „
In kaltem Wasser lösliche Substanz .	31,43 „	28,14 „
Mineralbestandteile	3,60 „	3,66 „
Stickstoff-Substanz (N × 6,25)	49,875 „	50,23 „
Stickstofffreie Extraktivstoffe	3,065 „	4,08 „
Jodzahl des Fettes	79,32	76,57
Säuregrade nach Burstyn	11,29°	10,80°
Natriumchlorid, durch Titration der wasserlöslichen Substanz bestimmt	1,636 %	1,636 %

Auf völlig wasserfreie Substanz berechnet, ergibt sich:

Ätherextrakt	42,57 %	40,68 %
Mineralbestandteile	3,66 „	3,72 „
Stickstoff-Substanz	50,68 „	51,40 „