die seitlichen drüsig-behaarten Blumenblätter; 6. durch die glatte, reichsamige, grosse Kapsel; 7. durch die Form und Kerbung der Blätter; 8. durch die wohlriechenden rosenfarbigen purpurpunktirten Blumenblätter. — Eine der distinktivsten Veilchenarten.

Wien, im März 1860.

Die siebenbürgischen *Plantago*-Arten.

Von Viktor v. Janka.

1. *Folia omnia basiliaria*. 2.
Folia in caule ramisque disposita. 14.
2. *Corollae limbus albus vel argenteo-nitens*. 3.
Corollae limbus fuscescens vel purpurascens. 6.
3. *Folia erecta longe petiolata* (petiolum saltem laminae dimidiam adaequans). 4.
Folia depressa rosulata brevissime petiolata. 5.
4. *Pusilla, ad summum spithamaea*; folia haud ultra pollicem lata;
P. sibirica Poir. = (*P. Schwarzenbergiana* Schur).
Robustior; folia magna lataque: . *P. maxima* Ait.
5. *Bractaeae obtusae. Petala ovali-oblonga, obtusa*:
P. media L.
Bractaeae acutae. Petala lanceolata, acuta:
P. brutia Ten.
6. *Corollae calycisque segmenta purpurascencia*:
P. gentianoides Sm.
Corolla fuscescens. 7.
7. *Folia ovalia vel elliptica*. 8.
Folia lanceolata, lineari-lanceolata vel linearia sensim in petiolum attenuata. 9.
8. *Capsula 4-sperma*: *P. Cornuti* Gouan.
Capsula 6—20-sperma: *P. major* L.
9. *Annua*: *P. tenuiflora* W. & K.
Perennes. 10.
10. *Spica tenuis sublinearis*. 11.
Spica latior, densa subcapitata vel cylindrica. 12.
11. *Folia linearia planiuscula*: *P. maritima* L.
Folia triquetro-filiformia: *P. carinata* Schrad.
12. *Folia plus minus puberula, haud sericea*: *P. lanceolata* L.
Folia sericea. 13.
13. *Semen laevissimum*: *P. argentea* Chaix.
Semen superficie rugulosum: *P. fuscescens* Jord.!
14. *Calycis segmenta difformia*; duo anteriora spatulata obtusa
reliqua lateraliala lanceolata, acuta:
P. arenaria W. & K.
Calycis segmenta conformia; omnia lanceolata, acuta:
P. Psyllium L.

St. Georgen bei Pressburg, am 5. April 1860.