(Aus dem physiol. Institut der k. k. böhm. Universität in Prag. Vorst.: Prof. F. Mareš.)

Ueber die Functionsänderungen des Warmblüter- muskels beim Sauerstoffmangel.

Von

Dr. **Camill Lhoták von Lhota**,
Assistenten des Institutes.

(Hierzu Tafel XXIII—XXVI.)

I.

1. Unter Aufnahme von atmosphärischem Sauerstoffe und unter Ausscheidung binärer Verbindungen geht in den thierischen Organismen beständig ein chemischer Process vor sich, als dessen Wirkung wir die Erzeugung von Wärme, mechanischem Effecte und sonstigen Energieformen kennen gelernt haben.

Sauerstoffaufnahme ist mit wenigen Ausnahmen (anärobe Bakterien etc.) eine Fundamenteigenschaft der gesammten organischen Natur; Sauerstoffmangel bringt die Functionen der Zellen (die Reizbarkeit, Bewegungsfähigkeit u. s. w.) zum Stillstand und führt schliesslich den Tod herbei.

Bei der grossen Verschiedenartigkeit des Stoffwechsels in den einzelnen Organismen, kann man erwarten, dass auch im Sauerstoffbedürfnisse grosse Unterschiede vorkommen werden.

Wenn es an systematischen Untersuchungen nicht mangelte, liesse sich gewiss dem Sauerstoffbedürfnisse nach eine ganze Reihe von Uebergängen im Thierreiche auffinden. Die Säugethiere und Vögel stünden dann an der Spitze dieser Reihe, denn für sie ist die ununterbrochene reichliche Sauerstoffaufnahme unerlässliche Bedingung der Leistungsfähigkeit, und sobald ihnen die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten ist, wird der in Oxyhämoglobin aufgespeicherte Vorrath in wenigen Minuten verzehrt, und sie gehen zu Grunde.

Bei den niederen Wirbelthieren kann der Respirationsact lange Zeit ohne Nachtheil unterbrochen werden; die asphyktischen Zustände

gehen nur allmählich in wahren Tod über, besonders wenn der Stoff- und Energienwechsel durch die niedrige Temperatur auf ein Minimum reducirt wird.

So lassen sich z. B. die Frösche nach Pflüger's Versuchen in der sauerstofffreien Atmosphäre viele Stunden am Leben erhalten, in welcher Zeit sie eine ziemlich beträchtliche Quantität von Kohlensäure ausathmen.

Noch grössere Unterschiede im Sauerstoffbedürfnisse als die Vertebraten weisen die Evertebraten auf.

Indem z. B. die Copepoden gegen den Sauerstoffmangel ausserordentlich empfindlich sind und schon in der Zeit von ca. 30–45 Minuten nach Beginn der Wasserstoffdurchleitung regungslos am Boden des Gefässes liegen (Loeb P. A. 62), zeigt ein Blutegel noch am Ende des dritten Tages nach der Sauerstoffentziehung deutliche Bewegungen, so dass die an diesen Würmern gemachten Beobachtungen eine von den Grundlagen für die Theorie von dem nicht-oxydativen Ursprunge der Muskelkraft bilden.

Die einfachsten Beispiele von dem Einflusse des Sauerstoffmangels bieten uns die Pflanzenzellen und elementare Organismen dar.

In den Pflanzenzellen, in denen das Protoplasma lebhaft strömt (Staubfadenhaare der *Tradescantia*, Zellen von Characeen), verlangsamt sich in Folge des behinderten Zutritts von Sauerstoff die Bewegung und hört bald ganz auf. Bei längerer Entziehung des Sauerstoffs folgt die Lähmung der Functionen, schliesslich der Tod des Protoplasmas unter Trübung, Gerinnung und Zerfall.

An Amöben und Plasmodien von *Myxomyceten* zeigte Kühne schon vor 40 Jahren Stillstand der Bewegung beim Sauerstoffmangel, welche Beobachtung seitdem auch für andere einzelligen Organismen mehrmals bestätigt wurde (Engelmann, Verworn u. A.).

Schliesslich ist noch die Thatsache zu erwähnen, dass auch die embryonale Entwicklung ohne Sauerstoff alsbald stillsteht und der Embryo zu Grunde geht.

Als feststehend muss also gelten, dass die Organismen nur bei beständiger Bindung des Sauerstoffs ihre Functionen vollführen können.

2. In Verbindung mit diesen an ganzen Thieren gemachten Versuchen stehen die Beobachtungen, durch welche die Sauerstoff-

avidität für die einzelnen Organe näher bestimmt wurde. Es lässt sich erwarten, dass verschiedene Organe höherer Thiere verschiedenes Sauerstoffbedürfniss haben werden, dass z. B. die höchst-organisirten Elemente, wie z. B. die Muskelfasern, den Sauerstoff energischer binden als indifferentere Gewebe.

Ehrlich (Das Sauerstoffbedürfniss des Organismus, Berlin 1885) versuchte diese Unterschiede in der Sauerstoffaffinität der lebenden, normal functionirenden Organe schärfer zu präcisiren.

Aus seinen Untersuchungen ergibt sich die wichtige Thatsache, dass die überwiegende Masse der functionirenden Bestandtheile des Organismus (fast die Gesamtheit der Muskel- und Drüsenparenchyme) bis zu einem hohen Grade sauerstoffungesättigt ist. Nur das Herz und Gehirn, die beiden Centralherde des Lebens, und noch bestimmte Abschnitte der Körpermuskulatur sowie die Nierenrinde, erfreuen sich einer maximalen Sauerstoffsättigung.

Es ist für uns von hohem Interesse, dass unter den Körpermuskeln nur die Muskeln von grosser functioneller Wichtigkeit (Zwerghell-, Augen-, Kehlkopf-, Zungenmuskeln) zu den mit Sauerstoff bestversorgten Organen gehören.

Alle Thatsachen weisen auch darauf hin, dass die Stellen der maximalen Sauerstoffsättigung den Sitz des intensivsten Lebensprocesses darstellen.

Die Nervenzellen können nicht (oder nur für sehr kurze Zeit) der Blutcirculation entbehren, denn die mindeste Schwächung des durch die Blutcirculation mitbestimmten Processes führt alsbald die tiefen Störungen des Lebens und den Tod herbei.

Ob bei diesem Einflusse der aufgehobenen Circulation die Sauerstoffsperre die wichtigste Rolle spielt, ist, wenigstens für die Nervelemente des Säugethiergehirns, noch fraglich (Hill und Nabarro, Journal of Physiol. Tom. 5, p. 18); directe Versuche an Kaltblütern scheinen aber dafür zu sprechen (Verworn, Arch. f. Physiol. 1900).

Auch für das Herz müssen wir aus den zahlreichen, sowohl am Kaltblüter- als auch am Säugethierherzen gemachten Untersuchungen folgern, dass der Sauerstoff für seine dauernd gleichmässige Thätigkeit unerlässlich ist. Indess ist zu bemerken, dass das Herz bei den Kaltblütern eine merkwürdige Widerstandskraft gegen den Sauerstoffmangel besitzt und dass auch für das Säugethierherz (wie aus Strecker's Versuchen [Pflüger's Arch. 80] folgt) eine ver-

hältnissmässig geringe Zufuhr von freiem Sauerstoffe genügt, um dasselbe eine Zeit lang am Leben und bei kräftiger Thätigkeit zu erhalten.

3. Bei der fundamentalen Bedeutung des Sauerstoffs für alle Bewegungserscheinungen ist es begreiflich, dass auch die Muskelfunction nach ihrem Sauerstoffbedürfnisse näher geprüft wurde.

Die Muskeln von allen Thieren sind noch geraume Zeit nach dem Tode erregbar; im Ganzen behalten aber die Muskeln der Kaltblüter die Contractionsfähigkeit viel länger als die der Warmblüter, was vermutlich von der verschiedenen Geschwindigkeit des Stoffwechsels abhängt.

Von grösstem Einfluss aber auf die Dauer dieses Ueberlebens des Muskels ist die Temperatur und Sauerstoffzufuhr. Bei niedriger Temperatur lassen sich die Muskeln von den Kaltblütern sowie von den Warmblütern viele Stunden bis Tage lang lebendig aufbewahren, und Mangold (Centralblatt für Physiologie 1892 S. 89) gelang es sogar, die ausgeschnittenen Muskelstückchen von verschiedenen Warmblütern mittelst kalter 0,6—0,8 %iger Kochsalzlösung bis zu 24 Stunden erregbar zu erhalten.

Der erregbarkeitserhaltende Einfluss des Sauerstoffs wurde öfters mit Sicherheit constatirt. Es ist eine festgestellte Thatsache, dass die ausgeschnittenen Froschmuskeln im Sauerstoffe und Luft länger erregbar bleiben als im Wasserstoffe oder Kohlensäure. Ebenso ist es aus Ludwig's Versuchen bekannt, dass nur sauerstoffhaltiges Blut die Reizbarkeit der aus dem Körper gelösten Muskeln (des Hundes) längere Zeit (bis 20 Stunden) erhalten kann, während bei der Durchleitung des sauerstofffreien Blutes der Muskel ebenso schnell abstirbt, als wenn gar keine künstliche Blutcirculation stattfand.

Was speciell die Veränderungen der Muskelfunction in den asphyktischen Zuständen des Thieres betrifft, liegen bisher nur wenige Untersuchungen vor, was durch den Umstand erklärbar ist, dass die höheren Thiere ohne Sauerstoff bald zu Grunde gehen.

Es gehören hierher die Untersuchungen von Broca und Richet (Arch. de Physiol. 1896) und dann noch nur die bei Gelegenheit anderer Untersuchung gemachte Beobachtung von Manille Ide (Arch. f. Physiol. 1898).

Broca und Richet fanden an narkotisirten Hunden, bei welchen die Asphyxie durch Verschluss der trachealen Canüle bewirkt wurde, dass die Muskelzuckungen bei directer Reizung zu-

gleich mit der Steigerung der Athemthätigkeit grösser werden, um dann mit den terminalen Athemzügen ganz aufzuhören.

Wurde die Asphyxie rechtzeitig unterbrochen (und künstliche Athmung eingeleitet), begannen die Zuckungen wieder zu wachsen.

Verschiedene Muskelarten verhalten sich jedoch gegen die Dauer der Asphyxie verschieden. Die Zungenmuskulatur bleibt noch einige Zeit nach dem Tode erregbar und erholt sich auch bald nach dem Unterbrechen der Asphyxie und Einleiten der künstlichen Athmung; wogegen die Contractionen der Beinmuskulatur oft ganz ausbleiben, wenn die Asphyxie längere Zeit gedauert hatte.

Zu diesen Untersuchungen gesellt sich nur noch die erwähnte Angabe von Manille Ide, welcher bewiesen hat, dass im vorgeschrittenen Stadium der Erstickung die Gefässwand erschlafft, weil die in sie eingebetteten Nerven und Muskeln gelähmt sind, nicht aber darum, weil es ihr etwa an äusseren Reizen fehlte.

Obzwar nun alle diese Thatsachen uns zu dem Schlusse führen, dass die Muskelfunction bei den höheren Thieren nur durch die Athmung unterhalten werden kann, liegen auf der anderen Seite ebenso festgestellte Thatsachen vor, nach welchen es wohl berechtigt ist, anzunehmen, dass bei der Muskelarbeit auch nichtoxydative Processe verlaufen, was besonders daraus hervorgeht, dass ausgeschnittene blutleere Froschmuskeln einige Zeit sogar im Vacuum sich contrahiren können (Hermann).

Es ist demnach noch eine offene Frage, inwieweit die Sauerstoffzufuhr an der Dauer und Grösse der Muskelleistung theilnimmt, und die hier vorgelegten Beobachtungen mögen vielleicht gewisse Aufschlüsse zur näheren Aufklärung dieser Frage bringen.

II. Versuchsanordnung.

Die mit Chloralmorphium narkotisirten Kaninchen wurden auf den mit Bleiklotzen beschwerten Steinach'schen Thierhalter fest aufgebunden, tracheotomirt und mit einer T förmigen Trachealcantüle versehen. Durch die Querarme dieser Cantüle wurde ein leichter Strom der Luft oder des zu athmenden Gases unter sehr geringem Drucke geleitet, so dass das Thier direct aus diesem Gasstrome athmete. Durch eine seitliche Oeffnung wurde die Cantüle mit der Marey'schen Trommel zum Registriren der Inspirationen verknüpft. (Natürlich handelte es sich bei diesen Beobachtungen allein um eine

Uebersicht über die Athmungsfrequenz.) Das ganze System der Gasleitung wurde mit einem Müller'schen Ventil und Manometer versehen, um den Druck controliren, eventuell auch ändern zu können.

Aus den Muskeln des Vorderarmes (welcher einzig bei der gleichzeitigen Registrirung der Blutdruckcurve in Betracht kommen kann) sind die beiden *Musc. extensores carpi radiales* am leichtesten zugänglich. Die Sehnen von diesen Muskeln, welche oberflächlich an der radialen Kante des Radius verlaufen, wurden fast bis zum Beginn der Muskelfasern blossgelegt, durchschnitten und mit einem festen Faden zusammengebunden; dann wurden sie mittelst eines Häkchens durchbohrt und an die Schreibfeder des Myographions direct befestigt. Der Faden lief stets genau in der Fortsetzung der Richtung der Muskelfasern.

Bei der Immobilisirung des Vorderarmes stösst man auf sehr grosse Schwierigkeiten, welche auch gewisse Störungen in die von Muskeln gezeichneten Curven hineinbringen.

Erstens müssen die asphyktischen Krampfbewegungen des betreffenden Vorderarmes vermieden werden, was dadurch geschieht, dass man *N. radialis* oder alle drei Nerven der vorderen Extremität durchschneidet, oder mit einem Faden stark abbindet, so dass die Muskeln ausser Zusammenhang mit den nervösen Centren stehen.

Zweitens müssen auch die durch die Krampfstösse des Rumpfes entstehenden Mitbewegungen des Vorderarmes womöglich eliminirt werden, zu welchem Zwecke das Olekranon durchbohrt und in das so entstandene Loch ein Nagel eingestossen wurde. Der Nagelkopf wurde dann auf das mit dem Aufbindebrett zusammenhängende Eisenstäbchen fest angeschraubt, um so eine starke Fixirung der betreffenden Knochen zu realisiren.

Die Pfote kann man mit einigen Stecknadeln an eine ebenso mit dem Aufbindebrett zusammenhängende Korkplatte genügend stark befestigen.

So gelingt es selbst während der Krämpfe die Zuckungen der gewählten Muskeln auf die Trommel zu übertragen.

Bei den Versuchen mit directer Reizung der Muskeln wurden zwei feine Stahlnadeln in die Muskeln eingesteckt, die eine am centralen Ende durch die Haut hindurch, die andere in Beginn der Sehnen.

Zum Erregen benutzte ich nur Oeffnungsschlag der secundären Rolle, zu welchem Behufe der Schliessungsschlag durch eine passende

Vorrichtung abgeblendet wurde. Die Schliessung und Oeffnung des Stromes in der primären Rolle wurde durch eine Balzar'sche Reizuhr in Intervallen von 1 Secunde erzielt.

Gezeichnet wurden die Zuckungen der mit 20 g belasteten Muskeln mittelst eines sehr leichten Aluminiumhebels auf die sehr langsam umlaufende Kymographiontrommel.

III. Die Veränderungen der Leistungsfähigkeit beim Erstickungstode.

Der Erstickungstod mit seinem Symptomencomplexe wurde schon so oft und genau beschrieben, dass es ganz überflüssig wäre, hier noch seinen Ablauf hinsichtlich der Blutcirculation und der Athmung zu besprechen. Die bei unseren Versuchen zugleich registrirten Athem- und Herzbewegungen bezwecken nur einen Vergleich zwischen diesen und der Muskelthätigkeit bei der Erstickung zu erlauben.

Die Erstickung wurde durch die Athmung des reinen Stickstoffs, Wasserstoffs oder in einigen Fällen auch Kohlendioxyds verursacht und in der Regel kurz nach Beginn der Muskelreizung eingeleitet.

Die ersten Erstickungssymptome zeigen sich erst in der Zeit, welche der maximalen Dyspnoe und Blutdrucksteigerung entspricht. (Fig. 1.) Es entwickelt sich nämlich am Ende der ersten oder am Anfange der zweiten Minute ein rasches Ansteigen der Muskelzuckungen, welches bei den kräftigen Thieren auch die doppelte Höhe der ersten Zuckung erreichen kann. Dieses Ansteigen der Hubhöhen geht sehr rasch vor sich und es wird sein Maximum durchschnittlich nach 5—20 Zuckungen erreicht. Sein Höhepunkt fällt mit der grössten Heftigkeit der mitunter auftretenden Krampfanfällen zusammen. Ehe noch aber die allgemeinen Krampfbewegungen aufhören, vermindern sich schnell die Zuckungshöhen, so dass sich in der Zeit, wo die Athmung still steht und der Blutdruck in Folge der Verlangsamung des Herzschlages nahe an die Abscisse sinkt, ein vollständiges Erlöschen der Erregbarkeit in erstaunlich kurzer Zeit entwickelt.

Dieses rasche An- und Herabsteigen der Erregbarkeit will ich als erstes Stadium der Muskelerstickung bezeichnen. Es ist besonders durch den letzterwähnten steilen Abfall der Erregbarkeit charakterisirt.

An dieses Stadium schliesst sich ein solches der allgemeinen Bewegungslosigkeit. Es entwickelt sich ein vollständiger Athmungsstillstand (die sogenannte präterminale Athempause), welcher mit der Verlangsamung oder dem vollständigen Stillstande der Herzbewegung im Allgemeinen zeitlich zusammenfällt. Die stürmische Erscheinung der rasch auf- und herabsteigenden Erregbarkeit macht einem Zustande der Erschlaffung, ja, man kann sagen der Lähmung des Muskels Platz. Wenn man in diesem Zustande die Reizung durch das Annähern der Rollen nach und nach verstärkt, kann man beobachten, dass sich die Muskeleerregbarkeit noch weiter vermindert, bis schliesslich selbst durch stärkste Schläge nur sehr kleine, in den meisten Fällen aber gar keine Contractionen bewirkt werden können.

Alle merkbaren Lebensfunctionen sind nun gehemmt. Die Erstickung erreicht ihren Höhepunkt.

Dauert aber dieser hohe Erstickungstod zwei bis drei Minuten hindurch fort, so erscheint kurz vor dem Tode noch ein letztes Aufflackern des Lebens. Man kann mit Gewissheit erwarten, dass das Herz seine durch Reizung des centralen Vaguskerens gehemmte Thätigkeit mit kräftigen Systolen wieder beginnen wird und dass auch der Athmungsstillstand, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle, durch sehr tiefe krampfhaft Athemzüge unterbrochen werden wird.

Erfolgt in dieser Zeit die Lebensrettung durch Sauerstoffzufuhr nicht, dann untergehen auch diese letzten Lebensäusserungen. Die terminalen Athemzüge verschwinden, die Herzcurven werden flacher, bis endlich abermals Alles stillsteht.

Während dieser ganzen Zeitdauer, welche wir als zweites Stadium der Muskelerstickung bezeichnen, ist der Muskel für mässige Reizungen vollständig unerregbar und noch einige Minuten nach dem definitiven Herztillstande und den terminalen Athemzügen erzielen die Reizungen, auch bei einem weit geringeren als dem vor der Erstickung sehr wirksamen Rollenabstande, nicht mehr den leisesten Erfolg,

Das Herz steht still, das Thier wird kühl, die Hornhaut trübt sich, man kann nun denken, dass auch die Leistungsfähigkeit des Muskels spurlos verschwunden ist.

Das ist aber nicht der Fall. Der Muskel ist keineswegs todt, denn setzt man mit Reizungen fort, so erscheinen in der 2. bis 30. Minute nach dem Herztode sehr kleine Contrac-

tionen, welche sich allmählich vergrössern, bis sie durchschnittlich ein Viertel, ja, auch die Hälfte der Höhe der ersten Zuckung erreichen, um dann nach und nach binnen einer halben Stunde wieder zu verschwinden.

Dieses letzte Aufflackern der Muskelerregbarkeit ist auch das letzte Stadium der Muskelerstickung.

IV.

1. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass die Erregbarkeitsänderung bei der Erstickung kein ganz einfacher Vorgang ist, wie z. B. die bei dem aus dem Blutstrome ausgeschalteten Muskel auftretende allmähliche Erregbarkeitserniedrigung, sondern dass hierbei verschiedene Stadien durchlaufen werden.

Die hier getrennt besprochenen drei Stadien sollen nur einen Typus der bei Muskelerstickung hervortretenden Erscheinungen bilden, welcher meistens unter womöglich übereinstimmenden äusseren Bedingungen vorkommt, nicht aber ein mit vollkommener Gewissheit auftretendes Gesetz; denn es machen sich, namentlich was die Dauer anbelangt, in allen drei Stadien manche Abweichungen bemerklich.

Ziemlich constant kommt nur das erste Stadium der erhöhten Erregbarkeit vor, es bedarf aber auch verschieden langer Zeit zu seiner vollen Entwicklung. Es kann auch so lange dauern, dass es mit der sogenannten Treppe zusammenfällt; in den meisten Fällen dauert es aber sehr kurz, und es tritt in einer weit prägnanteren Weise auf, als dass es mit der einfachen Erregbarkeitssteigerung bei der Treppe identificirt werden könnte.

Wichtig ist es, zu betonen, dass diese bei einem gewissen Grade des Sauerstoffmangels auftretende Zunahme und darauf folgende Abnahme der Energieentwicklung mit den heftigsten Athembewegungen und der darauf folgenden Athempause zeitlich zusammenfällt; man kann demnach berechtigt vermuthen, dass die Dyspnoe und Asphyxie nicht ausschliesslich auf der Erregbarkeits-erhöhung resp. Erniedrigung der Centren beruhen, sondern dass sie auch durch die erhöhte resp. gehemmte muskuläre Erregbarkeit bedingt sind.

Ich hoffe binnen Kurzem Gelegenheit zu finden, auf diese letzteren Fragen in einer besonderen Abhandlung zurückzukommen.

2. Fragen wir nun nach der Ursache des raschen Erlöschens der Muskelerregbarkeit bei Sauerstoffentziehung, so müssen wir zunächst bemerken, dass sich besonders diese Erscheinung nicht immer mit gleicher Schnelligkeit vollführt.

In der Regel verliert der Muskel nach wenigen kräftigen Zusammenziehungen seine Leistungsfähigkeit für einige Zeit vollständig. Es kommen aber auch Fälle vor, in welchen sich die Reizbarkeit auf gleicher Höhe erhält und zwar bis zur Zeit des definitiven Herzstillstandes, um sich erst dann — wie in den Fällen der aufgehobenen Blutcirculation — allmählich bis zur Null zu vermindern (Fig. 2).

Eine solche Abweichung vom typischen Verlaufe der Muskel-erstickung kommt besonders bei mageren, herabgekommenen Thieren vor.

Weitere Abweichungen beobachtet man, wenn man statt der *Musculi extensores carpi radiales*, die *Musculi abductor et extensor pollicis*, welche zu den rothen Muskeln gehören, verwendet.

Da erniedrigt sich die Erregbarkeit viel allmählicher, als wir es bei den weissen Muskeln kennen gelernt haben, so dass das ganze erste Stadium viel mehr in die Länge gestreckt erscheint.

Dabei zeigt sich häufig ein merkwürdiges Verhalten der Muskelirritabilität. Ihr Abfall, welchen wir als meist charakteristisch für dieses Stadium bezeichnet haben, vollführt sich nämlich in periodischer Erniedrigung und nachfolgender Erhöhung der Muskelzuckungen (Fig. 3 u. 4).

Es entsteht auf diese Weise vor dem tiefen Erniedrigen der Erregbarkeit des dritten Stadiums eine wellenförmige Erregbarkeitsfluctuation, und so bildet sich mit der Erregbarkeitserhöhung des dritten Stadiums eine Periodicität in den Veränderungen der Muskelirritabilität, welche besonders, wenn das Thier nicht vollständig reinen Stickstoff athmet, in schönster Weise zum Vorschein kommt.

So im Versuche Fig. 4 athmet das Kaninchen ein Gemisch von 98 % Wasserstoff und 2 % Sauerstoff. Man beobachtet im ersten Stadium ein allmähliches Erlöschen und darauf etwa zwei Minuten lang dauernde Wiederkehr der Erregbarkeit, dann eine weit tiefere und länger dauernde Erniedrigung der Reizbarkeit des zweiten Erstickungsstadiums und erst dann ein allmählich wachsendes und

mehr als 30 Minuten dauerndes Aufwachen der Muskelirritabilität im dritten Stadium.

Es lässt sich denken, dass in solchen Fällen die Muskelerstickung allmählich fortschreitet und dass die vorübergehende Erregbarkeitssteigerung durch die Durchspülung des Muskels mit dem noch geringe Menge Sauerstoffs enthaltenden Blute bei einer plötzlichen Blutdrucksteigerung bedingt ist (Fig. 4 bei f.).

3. Was nun das Erklären der beim Sauerstoffmangel auftretenden Thätigkeitshemmung und ihrer Abweichungen betrifft, so stehen uns mehrere Hypothesen zur Verfügung.

Am nächsten liegt der Gedanke, dieses Phänomen für eine chemische Action zu halten.

Nach dieser Vorstellung geht in einem thätigen Muskel ein chemischer Prozess vor sich, bei welchem verschiedene toxische Zerfallsproducte auftreten. Diese werden normaler Weise bei ungestörter Sauerstoffzufuhr oxydirt und dadurch unschädlich gemacht, bei bestehendem Sauerstoffmangel aber beschädigen sie tief den Muskel selbst. Je nach der Menge der producirten giftigen Substanzen kommt die Thätigkeitshemmung früher oder später vor.

Im Einklange mit dieser Hypothese behaupten Broca und Richet, dass nur durch die Arbeit bei der Asphyxie die Leistungsfähigkeit des Muskels gehemmt wird, nicht aber durch die Asphyxie selbst.

Nach unserer Erfahrung kann man aber dieser Meinung nicht beipflichten, denn auch der ruhende Muskel verliert seine Leistungsfähigkeit bei der Asphyxie (Fig. 5), und wenn es Fälle gibt, dass der ruhende Muskel bei der Asphyxie erregbar bleibt, so kommt es nur bei solchen Muskeln vor, welche auch bei der ununterbrochenen Thätigkeit (Reizung) ihre Leistungsfähigkeit während der ganzen Asphyxie nicht einbüßen (Fig. 10).

Dieser Erscheinung gemäss müssten wir also annehmen, dass in einigen Fällen durch die Asphyxie selbst in den Kreislauf die giftigen Producte kommen, welche alle Muskeln beschädigen und sie unfähig machen, ihre volle Energie zu entfalten.

Gegen diese sehr geläufige Annahme, welche sich allerdings durch eine Reihe verschiedener Beläge noch erhärten liesse, sprechen aber entschieden die Erscheinungen, welche man bei einer wiederholten Erstickung beobachtet.

Im Stadium der Asphyxie kann sich das Thier durch Sauerstoffzutritt leicht und schnell erholen; es genügen dazu einige asphyktische Athemzüge.

Sobald sich nun die Herz- und Athembewegungen wieder herstellen, kehren auch Contractionen des Muskels zurück, und zwar um so früher, je kürzer er im Zustande der Unerregbarkeit gewesen war. (Fig. 5, 7, 8.)

In Fällen, wo der Muskel lange Zeit im asphyktischen Zustande beharrte, dauert es bis 30 und mehr Minuten, ehe die ersten geringen Contractionen wieder erscheinen. Die Leistungsfähigkeit des Muskels wächst dann continuirlich, die Contractionen erhöhen sich nach und nach, bis sie endlich ihre ursprüngliche Höhe erreichen. (Fig. 5, 6, 7, 8.)

Diese Beobachtung ist desshalb von Wichtigkeit, weil sie uns lehrt, dass der asphyktische Zustand nicht die Muskelfunction in solchem Grade beschädigt, dass sie nicht in früherer Potenz zurückkehren könnte.

Allerdings konnten Broca und Richet eine solche genaue Restauration der Muskelfunction nur bei der Zungenmuskulatur constatiren. Die Contractionen der Beinmuskulatur erreichen nach ihnen niemals die frühere Höhe, ja, sie bleiben ganz aus, wenn die Asphyxie, auch ohne zum Tode zu führen, einige Zeit gedauert hatte.

Diese Angabe ist nur durch die abweichende Untersuchungsmethode erklärlich. Wie ich schon früher bemerkt habe, wurde in den Versuchen von Broca und Richet die Asphyxie durch Verschluss der Trachealcantüle bewirkt, was gewiss zu weit complicirteren Erscheinungen führt als die durch die Athmung des Stickstoffs bewirkte Asphyxie. Es ist wahrscheinlich, dass bei solcher Versuchsanordnung ausser dem Einflusse der Sauerstoffsperre noch andere die Muskelfunction und den ganzen Organismus alterirenden Momente zur Geltung kommen (z. B. das Anhäufen des Kohlendioxyds).

Aus der durch Athmung des Stickstoffs oder Wasserstoffs bewirkten Asphyxie erholt sich gewiss nach unseren zu diesem Zwecke speciell gemachten Untersuchungen das Thier schneller und leichter als aus der durch Verschluss der Trachealcantüle eingeleiteten Asphyxie, und es kann auch der auf die erste Weise erstickte Muskel nach Erholung lange Zeit von Neuem arbeiten; nichts weist

darauf hin, dass er schon solch eine tiefe Functionsstörung zu bestehen hatte.

4. Ich erwartete nun auch bei der wiederholten Erstickung denselben Erscheinungscomplex zu finden wie bei der ersten. Es zeigte sich aber im Laufe von einer Reihe von Beobachtungen, dass gerade die typischsten Erscheinungen bei wiederholter Asphyxie mehr und mehr an Bestimmtheit verlieren, ja, dass sie sogar ganz verschwinden können.

Bei einem zweiten Erstickungsversuche erscheint zwar auch die Erregbarkeitserhöhung, nicht aber so gross und auch die Krämpfe nicht so heftig wie zum ersten Male.

Die so für dieses erste Stadium der Muskelerstickung charakteristische, prompte und tiefe Erregbarkeitserniedrigung kommt bei zweiter Erstickung nur selten so ausgeprägt vor wie bei der ersten. Die Muskelcontractionen können zwar auch hier verschwinden, es genügt aber schon eine kleine Reizverstärkung, um merkbare Zuckungen hervorzurufen.

Dieselbe Erfahrung würden wir mit jedem weiteren Erstickungsversuche machen, jedoch mit noch einem vom ersten noch mehr abweichenden Resultate.

Bei dem dritten u. w. Erstickungsversuche ist die Erregbarkeitserniedrigung noch weniger deutlich als im zweiten, und es kommt schliesslich der Fall vor, wo der Muskel auch während der Asphyxie ungestört weiter arbeitet. (Fig. 11.)

Sehr interessant ist nun die Thatsache, dass eine solche Abweichung vom normalen Verlaufe der Muskelerstickung auch, wie es schon früher erwähnt wurde, gleich beim ersten Erstickungsversuche vorkommt, jedoch nur bei sehr herabgekommenen, schwachen Thieren, was die Vermuthung gestattet, dass es, auch bei wiederholter Erstickung, das Maltraitiren und Erschöpfen des untersuchten Muskels ist, was diese vom Typischen abweichenden Resultate verursacht.

Diesem Schlusse können wir dadurch eine weitere Stütze verleihen, dass diese continuirlich zunehmende Resistenz des Muskels gegen den Sauerstoffmangel, einmal erreicht, den Muskel nicht mehr verlässt, sondern sich noch befestigt, so, dass niemals der Fall vorkommt, dass ein Muskel, welcher gleich bei der ersten Asphyxie seine Arbeitsfähigkeit behalten hat, sie bei der zweiten oder dritten Asphyxie einbüssen

würde, wohl aber oft das Gegentheil. — Der Muskel, welcher bei der ersten Sauerstoffsperre seine Erregbarkeit rasch verliert, contrahirt sich bei weiteren Erstickungen regelmässig ohne Verminderung der Hubhöhen im Stadium der Asphyxie.

Dieser Umstand ist sehr zu berücksichtigen; er steht mit der Annahme der Autointoxication des beim Sauerstoffmangel arbeitenden Muskels im Widerspruche. Denn sollte man sich solcher Anschauung anschliessen, so müsste man dieser Thatsache gemäss annehmen, dass das Gift, welches sich während der Asphyxie im Muskel bilden soll, bei den weiteren Erstickungen in immer geringeren Mengen auftritt und so den Muskel in nach einander folgenden Erstickungen immer in geringerem Grade alterirt.

Eine solche Vermuthung wäre aber zu complicirt und für das Erklären gewisser Erscheinungen, insbesondere des dritten Stadiums ganz unbrauchbar, so dass es mir vortheilhafter erscheint, von anderen allgemeineren Gesichtspunkten den Zusammenhang dieser Erscheinungen herzustellen.

In neuester Zeit hat nämlich Loeb (dieses Archiv, Bd. 62) darauf aufmerksam gemacht, dass der Einfluss der Sauerstoffsperre nicht nur durch die Giftwirkung der dabei entstehenden Producte verursacht zu werden braucht, sondern dass dabei auch eine Structuränderung entstehen kann, welche die Umsetzung der chemischen Energie in den mechanischen Effect behindert und so den Stillstand der betreffenden Lebenserscheinungen herbeiführt.

Er hat für die Furchungsvorgänge im *Ctenolabrus* nachgewiesen, dass durch den Mangel an Sauerstoff moleculare und morphologische Aenderungen in den Zellen herbeigeführt werden, die ihrerseits erst die Ursache sind, dass die Furchung zum Stillstand kommt.

Er hat weiter gefunden, dass auch das Herz des *Ctenolabrus* embryos bei der Sauerstoffentziehung so rasch still steht, dass an ein Versiechen der Energiequelle kaum zu denken ist, und er hält es demnach für wahrscheinlich, dass ähnliche Structuränderungen wie diejenigen, die er an Furchungszellen direct beobachten konnte, auch die Umsetzung der chemischen Energie in die Herzcontractionen unmöglich machen.

Wäre es nun nicht denkbar, dass auch die rasche Hemmung der Muskelfunction die Folge einer durch Sauerstoffmangel herbeigeführten Structuränderung des Muskels ist?

Diese Auffassung würde sehr gut mit dem Umstand harmoniren, dass nach diesem raschen Verschwinden der Leistungsfähigkeit dennoch im dritten Stadium Contractionen erscheinen, und dass auch bei wiederholter Erstickung nach und nach geringere Hemmung der Thätigkeit auftritt.

Eben aus diesen Thatsachen geht sicher hervor, dass auch der Warmblütermuskel sich ohne Sauerstoffzufuhr contrahiren kann, und wir müssen diesem Umstande gemäss die rasche Thätigkeitshemmung, welche bei einem gewissen Grade des Sauerstoffmangels entsteht, für eine untergeordnete Einrichtung halten. Es scheint, als ob der Muskel bei solcher Thätigkeitshemmung in einen starreähnlichen Zustand gerathe, welcher aber die Muskelfunction nur vorübergehend alterirt, so dass der Muskel nach gewisser Zeit sich wieder contrahiren kann, ja, wenn er sauerstoffreiches Blut erhält, kann er sich dauerhaft für weitere Erstickungen von dem Einflusse der Sauerstoffsperre emancipiren.

Ich versuchte auch die bei diesem Zustande möglicher Weise auftretenden Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Muskels, z. B. der Elasticität, zu bestimmen, was aber bisher noch zu keinem befriedigenden Resultate führen konnte, besonders weil die Fixirung des Thieres, resp. des Humerus, zu solcher Untersuchung nicht passend ist.

5. Wir kommen nun zur merkwürdigsten Erscheinung der Muskelerstickung, nämlich zur schliesslichen Wiederkehr der Leistungsfähigkeit.

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass diese Wiederbelebung des Muskels um so früher auftritt und um so länger dauert, je kräftiger das Thier ist. Durchschnittlich treten die Contractionen in der 9. Minute nach dem Herzstillstande auf, vergrössern sich allmählich, um nach etwa halb- bis einstündiger Dauer zu verschwinden.

Die Contractionen sind in diesem Stadium immer nur klein, besonders wenn die Erstickung durch Athmung des Kohlendioxyds bewirkt wurde, was mit dem die Leistungsfähigkeit hemmenden Einflusse dieses Gases gut übereinstimmt. Arch. f. Physiol, Suppl. 1902. S. 45.

Allein auch in den günstigsten Fällen erreichen die Zuckungen niemals mehr als zwei Drittel der ursprünglichen Höhe; wichtig ist aber zu bemerken, dass sie sich durch verschiedene

mechanische Eingriffe, wie Dehnungen des Muskels, besonders aber durch Massiren, vergrössern lassen.

Es kann nicht angenommen werden, dass die Massage desshalb günstig wirkt, weil sie aus dem Muskel die durch Contraction entstandenen schadhaften Producte entfernt, denn es fehlt hier die Blutcirculation; man kann sich aber wohl nach unserer Hypothese von dem mechanischen Ursprunge der Thätigkeitshemmung beim Sauerstoffmangel vorstellen, dass dabei das Hinderniss der Thätigkeit vermindert wird, dass z. B. irgendwelches Gerinsel dislocirt wird.

6. Ganz wie der Muskel in diesem Stadium verhält sich auch das Herz des *Ctenolabrus*embryo. Loeb gibt in seiner schon früher citirten Arbeit an, dass die Herzbewegungen des *Ctenolabrus*embryo bei der Sauerstoffentziehung nach einem mehrminutigen vollständigen Stillstande mit einem Mal wieder erscheinen, etwa eine Minute dauern, um erst dann vollständig zu verschwinden.

Die Erklärung dieser beiden nahe verwandten Erscheinungen dürfte etwa in der Richtung zu suchen sein, wo sie Loeb für den letztgenannten Fall gesucht hat. Er spricht die Vermuthung aus, dass die Energiequelle für solche verspätete Thätigkeit aus Spaltungsvorgängen stamme.

Es ist oft vermuthet worden, die Quelle der Muskelkraft sei nicht in den Oxydationsvorgängen zu suchen, sondern in den Spaltungen. Gewisse Thatsachen scheinen dafür zu sprechen. Hermann fand, dass der Muskel ohne auspumpbaren Sauerstoff Arbeit zu leisten vermag; ähnliche Beobachtungen hat Pflüger und Bunge gemacht. Die Versuche von Loeb und endlich auch diese hier vorliegenden Beobachtungen weisen darauf hin, dass die Muskeln eine gewisse Zeit auch ohne unmittelbaren Zutritt vom Sauerstoff Arbeit leisten können, und dass nur auf längere Dauer die Bewegung ohne Sauerstoff unmöglich sei.

Alle diese Thatsachen kann man nun mit der am Warmblütermuskel beim Sauerstoffmangel erscheinenden raschen Thätigkeitshemmung durch die Hypothese in Einklang bringen, dass auch der Warmblütermuskel ohne Sauerstoff eine Zeit lang leistungsfähig bleibt, dass aber durch den Sauerstoffmangel im Muskel ein Hinderniss entsteht, welches sein normales Functioniren erschwert oder auch ganz unmöglich macht.

Dieses Hinderniss vermindert sich schon von selbst beim Ueberleben des Muskels, rascher durch gewisse mechanische Eingriffe, be-

sonders durch Massiren, am schnellsten aber durch den Zufluss des sauerstoffreichen Blutes.

Ich bin mir der Mängel wohl bewusst, welche dieser Hypothese noch anhaften, ich halte aber dennoch dafür, dass man durch sie einen befriedigenderen Einblick in die hier niedergelegten Thatsachen gewinnt, als es vom anderen Gesichtspunkte möglich wäre.

Zusammenfassung.

Die wichtigsten theoretischen Ergebnisse, die aus diesen Beobachtungen zu gewinnen sind, sind zum grössten Theil schon oben formulirt worden; ich möchte hier nur noch das Thatsachenmaterial kurz recapituliren:

1. Der Sauerstoffmangel erniedrigt rasch die Leistungsfähigkeit des Warmblütermuskels, manchmal bis zu Null.

Eine solche Erregbarkeitserniedrigung kommt auch vor, wenn der Muskel während der Asphyxie nicht thätig ist.

2. Die Erniedrigung der Leitungsfähigkeit ist jedenfalls nur vorübergehend, denn der Muskel kann lange Zeit nach dem Stillstande des Herzens noch eine ziemlich lange Reihe von Contractionen ausführen.

3. Die Leistungsfähigkeit des erstickten Muskels restaurirt sich also bis zu einem gewissen Grade von selbst, was durch mechanische Eingriffe, besonders aber durch erneute sauerstoffreiche Blutzufuhr beschleunigt werden kann.

4. Durch das sauerstoffreiche Blut kann sich der erstickte Muskel bis zum ursprünglichen Grade der Leistungsfähigkeit erholen.

5. An Muskeln von schwachen, mageren Thieren und sonst auch bei wiederholter Erstickung erscheint gar keine oder nur kleine Erniedrigung der Leistungsfähigkeit.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel XXIII—XXVI.

Sämmtliche Figuren sind bis auf $\frac{2}{3}$ der Originalcurven reducirt.

Die mit *A*, *B*, *C* bezeichneten Curven beziehen sich auf Athembewegungen bzw. Blutdruck und Muskelcontractionen.

Die Abschnitte *I*, *II*, *III* bezeichnen die drei Stadien der Muskelerstickung. Bei *a* Anfang der Erstickung.

Fig. 1. Typischer Erstickungstod durch Stickstoffgas. Krämpfe = fortgelassener Anfang der klonischen Krämpfe. Zweites Stadium (II) der Muskelerstickung dauert etwa zehn Minuten. Drittes Stadium der Muskelerstickung fängt an in der fünften Minute nach dem Herztode.

Wegen des Raummangels ist hier aus der ganzen Reihe von Contractionen nur jede fünfte Minute reproducirt.

Fig. 2. Allmähliches Verschwinden der Leistungsfähigkeit beim Erstickungstode. Atypischer Verlauf der Muskelerstickung bei einem weiblichen Kaninchen, welchem die vor fünf Tagen geworfenen Jungen weggenommen wurden.

Fig. 3. Erstickungstod bei Einathmung reines Stickstoffs. Periodische Fluctuation der Muskelirritabilität im ersten Stadium.

Sehr ausgeprägtes drittes Stadium der Muskelerstickung, welches fast gleich nach dem Herztode anfängt und beinahe 40 Minuten dauert. Die Zuckungshöhen erreichen dabei mehr als die Hälfte von der ursprünglichen Höhe.

Fig. 4. Erstickungstod bei Einathmung von 98 % H, 2 % O. Periodische Fluctuation der Muskeleirregbarkeit während der Asphyxie. Aus dem dritten Stadium ist nur der Anfang, die Mitte und das Ende reproducirt. f = Blutdrucksteigerung.

Fig. 5 und 6. Hemmender Einfluss der Asphyxie auf einen nicht thätigen Muskel. b = Blutdrucksteigerung nach künstlicher Ventilation mit Luft. Bei c wurde die Reizung des Muskels unterbrochen bei d wieder begonnen.

Obwohl sich der Blutdruck und die Athemthätigkeit nach Ventilation genügend restaurirt hatten, erscheinen dennoch bei Reizung des Muskels (bei d) nur kleine Contractionen, welche allmählich bis zur ursprünglichen Höhe anwachsen. (Ende der Fig. 6.)

Fig. 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Einfluss wiederholter Erstickungen.

Fig. 7 und 8. Erster typischer Erstickungsversuch. Die Lungenventilierung mit Luft hebt rasch den Blutdruck empor; kleine Contractionen erscheinen aber erst in der fünften Minute nach künstlicher Ventilation (Fig. 8 d).

Fig. 9. Kleine Erniedrigung der Muskelzuckungen bei zweiter Erstickung und rasches Ansteigen derselben nach Lungenventilierung mit Luft.

Fig. 10. Beim dritten Erstickungsversuche wurde die Reizung während der Asphyxie (von e bis zu f) unterbrochen, jedoch ohne Einfluss auf die Zuckungshöhen (bei g erscheint nur sehr kleine, rasch vorübergehende Erregbarkeitserniedrigung).

Zwischen $h-i$ wurde die Reizung während des gesteigerten Blutdruckes unterbrochen; auch diesmal ohne Einfluss auf die Zuckungshöhen.

Fig. 11 und 12. Beim Erstickungstode nach diesen wiederholten Erstickungsversuchen erfolgt während der Asphyxie keine Thätigkeitshemmung. Die Contractionen erniedrigen sich auch nach dem Herztode nur allmählich.

(Die Blutdruckänderungen, welche nach wiederholten Erstickungen hervortreten und ganz prägnant auch in den Figuren 7, 9, 10, 11 erscheinen, beabsichtige ich noch genauer zu untersuchen.)

Scheinbilder farbloser subj. Gesichtsobjecte.
Schwarze Scheiben.

Beob. 28.

ohne Ton:

c:

c₁:

c₂:

Beob. 29.

ohne Ton:

c:

c₁:

c₂:

Beob. 30.

ohne Ton:

c:

oder:

c₁:

c₂:

Beob. 32.

ohne Ton:

hin u. herspringend

c:

c₂:

Beob. 34.

ohne Ton:

c:

c₂:

Beob. 38.

ohne Ton:

c:

bei starkem Ton:

Nadelstich d. Wange:

Berührung d. Wange:

ohne Bewegung

Beob. 39.

ohne Ton:

c:

oder:

Quantit. subj. Aenderungen der Farb.-Empfind. im object. Gesichtsfelde.

Beob. 70.

Grün.

Beob. 71.

Beob. 73.

Beob. 75.

c.)

e.)

Beob. 84.

Links: Rechts: Nachbild: Links: Rechts:

Kälteeinwirkung auf die Stirne :

die Wange :

Wärmeeinwirkung auf die Stirne :

die Wange :

den Nacken :

Geräusch eines Inductionsapp. :

Beob. 86.

Links: Rechts: Nachbild: Geschmackserregung:

Zucker :

Salz :

Zucker u. Salz :

Essig :

Geruchserregung:

Essig-Geruch :

Schwaches Streichen :

der Nase :

der Lippe :

der Stirne :

der Wange :

links :

des Ohreingangs :

rechts :

links :

Beob. 87.

Links:

Rechts:

Nachbild:

Zucker:

Salz:

Essig:

Salz u Zucker:

Schwaches Streichen:

der Nase:

der Lippe:

der Wange:

rechts:

links:

des Ohres:

rechts:

links:

Lautes Zurufen von:

a:

e:

i:

o:

u:

Lautes Sprechen:

Das Nachbild wird schwarz.

Gegenseitiges Verhalten zweier verschiedener Farbenempfindungen im Nachbilde:

Gegenseitiges Verhalten von 4 verschiedenen Farben im Nachbilde:

Wettstreit:

Gleichfarbige u. complementäre Nachbilder :

Dauer der Vorstellung einer Farbe:

Beob. 90. Nachbild: Grün. 1 Sec. vorgestellt, Nachbild:

2 " " "

3 " " "

4 od 5 Sec " "

10 " " "

Willkürlich gewählte Stelle d. vorgestellten Farbe im Nachbilde:

Beob. 93 a) Nachbild: linkes + gelb gedacht, durch einige Sec:

beide " " " " " " "

linkes + gelb gedacht, anhaltend:

beide " " " " " " "

Beob. 93 b) Nachbild: linkes gelbes + grün gedacht (kurz):

" " " " " (lang):

Nachbild: ++ gelb weiter gedacht:

Vorstellung farbloser oder gefärbter Zeichnungen:

Beob. 95. + gedacht: O gedacht:

Blaues Feld.

Beob. 96. gedacht, im blauen Felde erscheint:

" " " " " " "

Willkürliche Beeinflussung d. Farbenempfind. im obj. Gesichtsfelde.

Beob. 97 a.)

97 b.)

Beob. 98.

Beob. 99.

Beob. 100 a.)

100 b.)

Beob. 109, I. Empfindlichkeit d. Auges für Farben.

I. Links:

rechts:

Nachbilder:

bei beiderseits offenen Augen:

rechts Auge offen, links A. geschlossen:

recht. Aug. offen, vor d. linken Auge 1 Kartenblatt:

2 Kartenblätter:

3 "

4 "

5 "

Beob. 109, II.

II. Links:

rechts:

Nachbilder: bei offenem rechten Auge, vor dem linken Auge:

5 Kartenblätter:

4 "

3 "

2 "

1 Kartenblatt:

links geschlossenes Augenlid:

linkes Auge offen:

Beob. 110.

Links:

Rechts:

Dem linken Auge werden 5, u. dem rechten Auge 5 Kartenblätter vorgelegt : kein Nachbild.

" " " " 4 " " " " 4 " " :

" " " " 3 " " " " 4 " " :

" " " " 3 " " " " 3 " " :

" " " " 2 " " " " 3 " " :

" " " " 2 " " " " 2 " " :

" " " " 1 " " " " 2 " " :

" " " " 1 " " " " 1 " " :

Das linke Auge ist geschlossen " " " " 1 " " :

Beide Augen sind geschlossen :

Das linke Auge ist geschlossen, das rechte offen :

Beide Augen sind offen :

Beob. 104 a.)

104 b.)

105.

Fig. 1.

Abzisse.

→

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 3.

←

Winterberg, Complic.
Lith. Anst. v. F. Witz, Darmstadt.

Verlag v. Emil Steiner, Bonn.

Fig. 5.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 18.

Fig. 20.

Winterberg, Campbell.

Lehrbuch d. F. Naturgeschichte.

Verlag v. J. Neumann, Neudamm.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

I

II

Example

Fig. 4