Zeitschrift

für

Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel, sowie der Gebrauchsgegenstände.

Heft 7.

1. April 1912.

Band 23.

Die Zersetzung der Fette durch höhere Pilze.

I. Der Abbau des Glycerins und die Aufnahme der Fette in die Pilzzelle.

Von

A. Spieckermann.

Mitteilung aus der Landwirtschaftlichen Versuchsstation Münster i. W.

Einleitung.

Untersuchungen über die Bedeutung der Fette und Fettsäuren als Nährstoffe für Pilze sind erst verhältnismäßig spät und auch dann mehr gelegentlich ausgeführt worden. Die ersten stammen von Schmidt¹⁾, der 1891 im Pfeffer'schen Laboratorium die Aufnahme und Verarbeitung von fetten Ölen durch Pflanzen verfolgte und als Versuchspflanzen auch höhere Pilze, insbesondere *Aspergillus niger* benutzte. Schmidt hat damals festgestellt, daß Mandelöl, Ölsäure, Schweineschmalz, Palmitinsäure und Walrat von den Pilzen als Kohlenstoffnährquelle mehr oder minder gut verwertet werden können. Er hat ferner gezeigt, daß die Zersetzung der Glyceride stets mit einer Spaltung in Glycerin und Fettsäure beginnt. Über die Art, in welcher Fette und Fettsäuren in die Pilzzelle aufgenommen werden, ist er allerdings nicht ins klare gekommen und er beschränkt sich daher auf einen Analogieschluß aus seinen Versuchen an grünen Pflanzen.

Die Frage der Fettzersetzung hat dann zehn Jahre geruht, bis sie um das Jahr 1900 herum gleichzeitig von zwei Seiten auf Grund von Beobachtungen im praktischen Leben wieder aufgeworfen wurde. Rubner²⁾ stellte Untersuchungen über den Verbleib der Fette im Boden an und wies nach, daß sie hier durch Schimmelpilze und Bakterien zerstört werden, von denen Schreiber³⁾ dann eine Reihe genauer untersuchte. König, Spieckermann und Bremer⁴⁾ zeigten, daß auch das Verschwinden der Fette in lagernden Ölkuchen auf biologische Vorgänge zurückzuführen ist. Die Fähigkeit, Fette und Fettsäuren (Öl-, Palmitin-, Stearinsäure) zu zerstören, wurde bei einer großen Zahl der höheren Pilze festgestellt. Weniger wesentlich waren die Fortschritte dieser neueren Arbeiten in bezug auf die inneren Vorgänge bei der Fettzersetzung. Die Frage der Fettaufnahme in die Zelle blieb ungelöst. Meine eigenen Beobachtungen darüber kamen, da ich mich an Schmidt's

¹⁾ Flora 1891, 74, 300.

²⁾ Arch. Hygiene 1900, 38, 67.

³⁾ Arch. Hygiene 1902, 41, 328.

⁴⁾ Diese Zeitschrift 1901, 4, 721.

Methode der Untersuchung hielt, über die von diesem geschaffene Auffassung nicht hinaus. Bestätigt wurden die Beobachtungen Schmidt's über den Beginn der Fettzersetzung mit der Fettspaltung. Nach Rubner und Schreiber soll diese Spaltung bei den Glyceriden des Butterfettes und Mandelöles gleichmäßig ohne Bevorzugung einzelner Glyceride erfolgen. Die Angaben Schmidt's über die Verwertbarkeit der Fette und Fettsäuren bei Abwesenheit jedes anderen organischen Nährstoffes wurden von Spieckermann und Bremer¹⁾ bestätigt. Ferner wiesen sie damals schon einen schnelleren Verbrauch der Ölsäure im Cottonöl nach und machten wahrscheinlich, daß bei der Zerstörung der Fette ein Abbau bis zu Kohlensäure und Wasser stattfindet. Ferner wurde im Mycel der verwendeten Pilze eine butyrinspaltende Lipase nachgewiesen.

Wenn bei der damaligen Bearbeitung der Fettfrage sowohl von Rubner und Schreiber als auch von König, Spieckermann und Bremer systematische und eingehendere Untersuchungen über die inneren Vorgänge bei der Fettzerstörung nicht ausgeführt worden sind, so ist dies zum Teil auf äußere Gründe, zum Teil wohl aber auch darauf zurückzuführen, daß dem praktischen Interesse mit den Ergebnissen der Untersuchungen zunächst genügt war. Ich habe seitdem die Frage im Auge behalten, Untersuchungen darüber aber infolge der Inanspruchnahme auf anderen Arbeitsgebieten nur gelegentlich und mit großen, oft jahrelangen Unterbrechungen ausführen können. Inzwischen sind einige weitere Arbeiten über die Fettzersetzung erschienen, ohne daß aber ein wesentlicher Fortschritt in ihrer tieferen Erkenntnis zu verzeichnen wäre. Laxa²⁾ hat im Gegensatz zu Rubner eine verschiedenen schnelle Spaltung der Glyceride des Butterfettes festgestellt. Von den neueren Arbeiten von Haselhoff und Mach³⁾, Rahn⁴⁾ und de Kruyff⁵⁾ berühren nur die beiden letzteren die inneren Verhältnisse der Fettzersetzung bis zu einem gewissen Grade. Rahn hat die Veränderungen festgestellt, die die Konstanten (Acidität, Reichert-Meißl'sche Zahl, Jodzahl) des Palm- und Butterfettes bei spontaner Zersetzung durch Schimmel- und Bakteriengemische und bei Impfung mit Reinkulturen einiger Bakterien- und Pilzarten, die er durch ein Anreicherungsverfahren mit Fetten aus dem Boden gewonnen hatte, erfahren. Er hat eine Zunahme der Acidität, eine Abnahme der Reichert-Meißl'schen Zahl und eine Zunahme der Jodzahl gefunden, zieht aber mit vollem Recht aus diesen Veränderungen weitergehende Schlüsse nicht. de Kruyff hat ebenfalls durch ein Anreicherungsverfahren aus Böden Bakterien gewonnen, die Fettspaltungsvermögen besitzen, und die er in einer physiologischen Gattung *Lipobacter* zusammengefaßt hat. Er hat weiter gezeigt, daß diese Bakterien nicht nur Glyceride spalten (Tristearin, Tripalmitin, Triolein, Tributyrin), sondern auch die entsprechenden Fettsäuren zerstören. Aus den Analysenzahlen, die gleichzeitig angesetzte Kulturen mit den verschiedenen Glyceriden und Fettsäuren ergeben haben, glaubt de Kruyff folgern zu sollen, daß eine Bevorzugung einzelner Glyceride und Fettsäuren nicht stattfindet. Besondere Aufmerksamkeit hat de Kruyff den Lipasen zugewendet. Zu ihrem Nachweis schlägt er Agarplatten mit fein suspendiertem Tributyrin oder -olein vor, auf denen bei Ausscheidung von Lipase um

¹⁾ Landw. Jahrbücher 1902, **31**, 88.

²⁾ Arch. Hygiene 1902, **41**, 119.

³⁾ Landw. Jahrbücher 1906, **35**, 445.

⁴⁾ Zentralbl. Bakteriöl. II. Abt., 1906, **15**, 545, 422.

⁵⁾ Bull. Dép. de l'Agric. aux Indes Néerland. No. IX. Buitenzorg. 1907.

die Pilzkolonie eine Aufhellung bzw. eine Ausscheidung von Krystallnadeln zu sehen ist, die de Kruyff für Elaidinsäure zu halten geneigt ist, da sie nur bei Verwendung von Nitraten als Stickstoffquelle entstehen. Eykman¹⁾ hat in einer kürzeren Mitteilung ein Verfahren zum Nachweis der Lipasen gegeben.

Auf die Einzelheiten der Versuchsergebnisse der hier zitierten Arbeiten wird an gegebener Stelle noch genauer eingegangen werden. Kurz lassen sich ihre Ergebnisse dahin zusammenfassen, daß es zweifellos zahlreiche Bakterien- und Pilzarten gibt, die imstande sind, Glyceride zu spalten und Fettsäuren zu zerstören, und daß die Zerstörung der Fette stets mit einer Spaltung in Glycerin und Fettsäuren durch Enzyme (Lipasen) beginnt; dagegen sind die Fragen nach der Art der Aufnahme der Fette und Fettsäuren in die Pilzzelle, des Ortes der Spaltung der Glyceride, des Verhaltens der Lipasen gegen verschiedene Glyceride, des Abbaues des Glycerins und der Fettsäuren, der Assimilierbarkeit der verschiedenen Fettsäuren bisher gar nicht oder unzureichend bearbeitet, oder die Anschauungen der Beobachter gehen darüber sehr auseinander.

Der Ursachen dieser unbefriedigenden Verhältnisse sind mehrere. Einerseits hat die Frage der Fettzersetzung zurzeit kein dringliches technisches Interesse. Andererseits aber bietet ihre experimentelle Bearbeitung größere Schwierigkeiten, die in der Unzulänglichkeit der analytischen Verfahren und der Schwierigkeit der Versuchsanordnung liegen. Die chemische Analyse der Fette beschränkt sich zurzeit bekanntlich im wesentlichen auf die Bestimmung gewisser Konstanten, während die Bestimmung bestimmter Anteile nur in einzelnen Fällen möglich ist. Die Bestimmung dieser Konstanten verliert aber in zersetzten Fetten erheblich an Wert und kann nur mit Vorsicht benutzt werden.

Durch die Untersuchungen, deren Ergebnisse hier mitgeteilt werden sollen, ist versucht worden, die oben genannten Lücken nach Möglichkeit auszufüllen. Ein erschöpfendes Bild können sie ihrer geschilderten Entstehungsweise nach nicht geben. Auch beschränken sie sich auf das Verhalten eines einzigen Pilzes, da die Bewältigung eines größeren Materials unmöglich war. Es ist als Versuchspilz ein aus dem Staub gewonnenes *Penicillium „glaucum“* verwendet worden. Doch lassen gelegentliche Beobachtungen an anderen Schimmeln, sowie die bisherigen anderweitigen Mitteilungen über solche Pilze den Schluß zu, daß die mit dem *Penicillium* erzielten Ergebnisse auch für die Mehrzahl der „Schimmel“ zutreffen werden.

In der vorliegenden Mitteilung soll außer einer Darstellung der angewendeten Arbeitsverfahren die Zersetzung des Glycerins und die Aufnahme der Fettsäuren und Fette in die Pilzzelle behandelt werden. Es sollen in Bälde die zum größten Teil abgeschlossenen Untersuchungen über den Abbau und den Assimilationswert der Fettsäuren, über die Spaltung der Glyceride und die Änderung der Konstanten der wichtigsten Fette beim Schimmeln folgen.

Eigene Versuche.

1. Methodisches über Ernährungsversuche mit Fetten und höheren Fettsäuren.

Bei dem üblichen Verfahren der Ernährungsversuche an Schimmeln wird der zu prüfende Stoff in einer Nährlösung bekannter Zusammensetzung angewendet. Auch bei den Untersuchungen über die Zersetzung der Fette hat man bisher in erster Linie

¹⁾ Zentralbl. Bakteriöl. I. Abt. 1901, 29, 847.

diese altbewährte Anordnung benutzt. Sie leistet zweifellos in den Fällen, in denen der zu prüfende Stoff in Wasser löslich ist oder durch Sekrete der Pilze in wasserlösliche Form übergeführt wird, vorzügliche Dienste. Bei den Fetten und Fettsäuren, soweit sie nicht in Wasser löslich sind, liegen die Verhältnisse ungünstiger, da sie auch durch Sekrete nur in geringem Maße zur Lösung gebracht werden. Ferner ist es wegen der bei exakten Versuchen unumgänglichen Sterilisierung der Nährflüssigkeiten nicht möglich, Fette und Fettsäuren in fein verteilter Form darzubieten. Infolgedessen wird die Angriffsfläche für die Pilze und somit auch der Stoffumsatz sehr gering. Belege dafür bieten alle früheren Arbeiten. Bei de Kruyff wurden auf Nährlösungen in 12 Tagen zerstört von Stearinsäure 78—82 mg, Palmitinsäure 71 bis 89 mg, Tristearin 56—91 mg, Triolein 100 mg, Tripalmitin 102 mg und nur von Tributyrin, das die lösliche Buttersäure liefert, 299 mg. Bei Rahn betrug in Penicillium-Kulturen nach 45 Tagen der Verlust an Stearinsäure 16,1—27,6 mg, an Palmitinsäure 24,7—31,9 mg. Auch bei dem flüssigen Mandelöl hat Schmidt nach 45 Tagen von 1,501 g noch 0,929 g zurückerhalten, während bei Palmitinsäure nach 30 Tagen nur 60 mg verschwunden waren. Diese Verhältnisse bessern sich auch nicht wesentlich, wenn man die Kulturen monatelang stehen läßt. Bei einem Versuch, bei dem ich 1 g Fettsäure auf 50 ccm der später beschriebenen Lösung S in Erlenmeyer-Kolben mit breitem Boden nach dem Sterilisieren durch Schütteln bis zum Erstarren so fein wie möglich verteilte, waren nach 4 Monaten durch Penicillium zerstört an

Laurinsäure	0,2340 g
Myristinsäure	0,2710 g
Palmitinsäure	0,1750 g
Stearinsäure	0,0470 g

und an Ölsäure in $3\frac{1}{2}$ Monate alten Kulturen von 2 g 0,5540 g bzw. 0,8205 g.

Sind diese Zahlen auch erheblich höher als die der anderen Beobachter, so ist doch die Versuchszeit zu lang. Für vergleichende Versuche ist dieses Verfahren zudem unbrauchbar, da es unmöglich ist, die Fette und Fettsäuren stets in gleicher Weise zu verteilen und so eine gleichmäßige Angriffsfläche zu schaffen. Es ist daher auch nicht gerechtfertigt, wenn de Kruyff aus den Analysenergebnissen seiner nebeneinander angesetzten Kulturen mit verschiedenen Fettsäuren und Glyceriden Schlüsse auf die Assimilierbarkeit dieser Stoffe ziehen will, ganz abgesehen davon, daß die Gewichtsverluste in seinen Versuchen sehr gering sind. Auf die Schwankungen, die die verschiedene Verteilung auch der flüssigen Fette in den Kulturmedien in den Analysenergebnissen erzeugt, hat übrigens auch schon Schmidt hingewiesen.

Völlig versagt die Kultur in Nährlösungen bei der Untersuchung von Gemischen fester Glyceride und Fettsäuren, da aus ihnen beim Erkalten nach dem Sterilisieren die Anteile getrennt krystallisieren, sodaß eine Entmischung eintritt. Auch die Schwierigkeiten, die die quantitative Gewinnung der Fette und Fettsäuren aus Flüssigkeiten bereitet, sind nicht gering und fallen schwer ins Gewicht, wenn es sich um zahlreiche Versuche handelt.

Diese Schwierigkeiten der Kultur in Flüssigkeiten sind auch von den Beobachtern stets empfunden worden. So hat Schmidt schon mit Gemischen von Quarzsand, Seifen und Nährlösung gearbeitet, Schreiber hat Emulsionen von Mandelöl und Gummi arabicum verwendet, deren Verarbeitung aber recht umständlich ist und die durch die Hinzufügung des Gummi für die meisten Fragen der Ernährungsversuche mit Fetten an sich wenig brauchbar sind.

Ich habe schon bei meinen ersten Versuchen mit Fetten und Fettsäuren im Jahre 1900 eine andere Form der Kulturen verwendet, die eine feine, ganz gleichmäßige Verteilung der Stoffe, dadurch eine große Angriffsfläche und starke Durchlüftung, ferner eine leichte analytische quantitative Verarbeitung gestattet und für kleine und größere Fettmengen gleich brauchbar ist. Als Grundlage für diese Kulturen dient reine, in einer Tonmuffel im Gebläseofen vollständig ausgeglühte Kieselgur, die mit den Fetten oder Fettsäuren im Porzellanmörser auf das Innigste verrieben, dann mit einer entsprechenden Menge Nährlösung gemischt und wieder verrieben wird, sodaß ein völlig homogenes Pulver entsteht. Das Verhältnis zwischen Kieselgur, Fett und Nährflüssigkeit muß so gewählt werden, daß die fertige Mischung gut feucht, aber noch krümelig ist, sonst sintert sie beim Sterilisieren zusammen und die Pilze wachsen auf der zu dichten Masse schlecht. Genauere Vorschriften lassen sich darüber nicht geben, da die Kieselgur verschiedener Herkunft ein sehr verschiedenes Absorptionsvermögen für Wasser zeigt.

Die feuchte Kulturmasse wird aus dem Mörser mittels entsprechend geformter Hornspatel quantitativ in einen so geräumigen Erlenmeyer-Kolben übertragen, daß in ihm eine etwa 2, höchstens 3 cm hohe Schicht entsteht. Für die Sterilisierung genügt bei Verwendung von schwach sauren, dem Pilze sehr zusagenden Nährlösungen, eine 20 Minuten lange Erhitzung in strömendem Wasserdampf, wobei auch die ungesättigten Säuren der Ölsäurereihe keine Veränderung erleiden. Die Impfung erfolgt durch Abstäubung einer mit Konidien des Pilzes besetzten Platinöse in den Kulturkolben. Sobald in den ersten auf der Oberfläche entstehenden Pilzkolonien Konidienbildung eintritt, schüttelt man den Kolben tüchtig um und infiziert so den ganzen Inhalt kräftig. Man erzielt auf diese Weise ein schnelleres und energischeres Wachstum, als wenn man das von den Kulturen auf anderen Nährböden übertragene Impfmateriäl gleich durch die ganze Masse verteilt.

Penicillium wächst auf diesen Kieselgur-Fett-Kulturen auch bei Fehlen jedes anderen organischen Nährstoffes meist gut; wesentlich ist aber, daß man das Impfmateriäl von frischen Kulturen entnimmt, sonst treten Fehlschläge ein.

Soll die Kultur chemisch untersucht werden, so wird der Inhalt des Kolbens je nach dem Zweck der Untersuchung und der Natur der verwendeten Fettsäuren und Fette im Dampftrockenschrank oder im Wasserbade im Kohlensäurestrom getrocknet, dann in eine getrocknete Filtrierpapierpatrone gefüllt und in der bekannten Weise mit Äther oder Petroläther extrahiert. Das Extraktionsmittel wird im Kohlensäurestrom verjagt und der Extrakt im Wasserbade getrocknet.

Ein Nachteil des Verfahrens ist der, daß die Extraktionsmittel auch etwaige lösliche Stoffe des Pilzmycels lösen und in das Fett bringen. Indessen leidet die Kultur in Flüssigkeiten an demselben Mangel, denn die Pilzfäden haften den Fetttropfchen fest an und können von ihnen nur durch fettlösende Stoffe getrennt werden. Die in Äther nicht löslichen Stoffe der Kulturen sind in der Kieselgur enthalten und können aus ihr genau so wie aus Wasserkulturen gewonnen werden.

Die Kieselgurkultur liefert ausgezeichnete Ergebnisse bei den in Wasser unlöslichen Fettsäuren von C_{12} an und bei den Glyceriden der im menschlichen Haushalt und für die Fütterung der Haustiere hauptsächlich verwendeten Fette (Butter, Palmfette, Erdnuß-, Rüb-, Baumwollsaatöl). Dagegen ist sie nicht brauchbar für die wasserlöslichen Säuren. Diese Säuren besitzen für Penicillium auch in geringen Konzentrationen stark entwicklungshemmende Eigenschaften. Über das Verhalten des

von mir verwendeten *Penicillium* in Kulturen der später beschriebenen Lösung S mit verschiedenen Mengen einiger normaler löslicher Fettsäuren gibt folgende Tabelle einige Anhaltspunkte, wobei die Zahlen die mg KOH angeben, die zur Neutralisierung der in 100 ccm Nährlösung gelösten Fettsäure nötig waren:

	Gutes Wachstum	Schwaches Wachstum	Kein Wachstum
Essigsäure	157,5 ¹⁾	—	—
Propionsäure	83,5	101,5 ²⁾	117,5
Buttersäure (normal)	36,0	46,0	56,0
Capronsäure	noch bei 8,5 nicht üppig	27,0	34,5
Caprylsäure	„ „ 5,5 „ „	12,0	16,5

Diese Zahlen stellen keine Grenzwerte dar, diese müßten durch Versuchsreihen mit noch weiteren Konzentrationsabstufungen festgestellt werden; für meine Zwecke genügten die hier angeführten Daten. Sie zeigen, daß die Essigsäure von dem verwendeten *Penicillium* in ziemlich starker Konzentration vertragen wird, daß aber von der Propionsäure ab schon in schwachen Konzentrationen Entwicklungshemmung eintritt und daß die Giftigkeit bis zu der Fettsäure mit 8 Kohlenstoffatomen mit dem Molekulargewicht steigt.

Bei der Nonylsäure trat bei der Sättigung der angewendeten Nährlösungen S und A mit ihr weder Sporenkeimung noch Weiterentwicklung einer in die Lösung eingetragenen Mycelflocke einer lebenskräftigen Kultur, bei Caprinsäure bei Sättigung der Nährlösung wohl eine kräftige Entwicklung einer Mycelflocke aber keine Keimung von Sporen mehr ein.

Laxa ist in bezug auf die Giftigkeit der löslichen Fettsäuren für Schimmel schon früher zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Er beobachtete, daß in 0,1⁰/o-igen Lösungen von Essig- und Buttersäure ein *Penicillium* und *Oidium* gut, in gleichkonzentrierter Capronsäurelösung nicht wuchsen, daß *Penicillium* auch bei 39 mg Capronsäure in 100 ccm Nährlösung noch nicht, bei 24 mg sehr schwach wuchs und daß in etwa ebenso konzentrierten Caprylsäurelösungen überhaupt kein Wachstum eintrat.

Von den Fettsäuren mit 12 Kohlenstoffatomen an ändert sich dann das Bild; von hier an wirken die in der Nährlösung sich lösenden Spuren weder auf die vegetative Entwicklung noch auf die Sporenkeimung hemmend.

Man ist daher beim Arbeiten mit den löslichen Fettsäuren auf die flüssigen Kulturen angewiesen. Auch die Caprinsäure wird in Kieselgurkulturen nur noch bei Impfung mit einer Mycelflocke vom Pilze vertragen.

Zu erörtern bleibt an dieser Stelle noch der Bedarf des verwendeten *Penicillium* an Nährsalzen und an Stickstoffverbindungen. An ersteren bedarf der Pilz lediglich eines Gemisches von Magnesiumsulfat und Kaliummonophosphat. Als Stickstoffquelle können ihm außer organischen Verbindungen (Eiweißstoffen, Aminen) auch Nitrate und anorganische Ammoniumsalze dienen. Schon Schmidt hat mit Gemischen dieser anorganischen Stickstoffverbindungen mit Erfolg gearbeitet ich habe bei meinen früheren Arbeiten wiederholt Ammoniumsalze angewendet. Es ist also leicht möglich, Fette und ihre Komponenten frei von allen anderen organischen Verbindungen in die Untersuchung zu bringen. Über den Wert der verschiedenen Stickstoffverbindungen für den Pilz und ihren Einfluß auf den Verlauf der Fett-

¹⁾ Mit stärkeren Konzentrationen ist nicht gearbeitet worden.

²⁾ Nur minimale Vergrößerung einer eingeeimpften Mycelflocke.

zersetzung wird in den entsprechenden Abschnitten Näheres mitgeteilt werden. Hier sei nur die Zusammensetzung der hauptsächlich verwendeten Nährlösungen angeführt, die hinfort, um Wiederholung zu vermeiden, als Lösung S, A und P bezeichnet werden sollen. Es enthalten in 1 Liter Wasser:

Lösung S	Lösung A	Lösung P
5 g Natriumnitrat	5 g Ammoniumsulfat	5 g Pepton Witte
+ 2 g Kaliummonophosphat + 1 g Magnesiumsulfat		

2. Abbau des Glycerins.

Daß das bei der Spaltung der Glyceride entstehende Glycerin ein guter Pilznährstoff ist, ist bekannt, und es verschwindet, wie Schmidt feststellte, so schnell aus Mandelölkulturen, daß es nicht nachzuweisen ist, wird also wohl, wie es entsteht, weiter zersetzt, während die Fettsäuren sich anhäufen. Wenig zu vereinbaren ist damit allerdings zunächst Schmidt's weitere Beobachtung, daß Schimmel (*Penicillium*, *Aspergillus*, *Mucor*, *Phycomyces*) in Nährlösungen mit Glycerin und anorganischen Salzen (KNO_3 , NH_4NO_3 , CaN_2O_6 , MgSO_4 , KH_2PO_4) schlechter wuchsen als in solchen mit Ölsäure. Auch bei meinen Versuchen habe ich beobachtet, daß Glycerin in zersetzten Fetten in keinem Stadium nachzuweisen ist, also wohl im Entstehen weiter zersetzt wird. Ebenso verschwinden aus flüssigen Kulturen relativ große Mengen Glycerin sehr schnell. In Lösung A und S waren 5% Glycerin meist schon nach 8 Tagen völlig zersetzt, wenn für die Kulturen große Erlenmeyer-Kolben verwendet wurden, in denen die Flüssigkeitsschicht so niedrig blieb, daß eine reichliche Durchlüftung möglich war. Beim Abdampfen der Kulturen verblieb nur ein anorganischer Rückstand; Oxalsäure war darin nicht enthalten. Das Wachstum des *Penicillium* in diesen Glycerinkulturen war je nach der Stickstoffquelle sehr verschieden. In Lösung S, ferner bei Ersatz des Natriumnitrates durch die entsprechenden Kalium- und Calciumsalze entstanden die Flüssigkeit völlig bedeckende, fest zusammenhängende Myceldecken mit üppiger Fruktifikation. Bei monatelangem Stehen wurde die Decke auf den Natriumnitratkolben meist grau, und die Flüssigkeit färbte sich gelb. In Lösung A, ferner bei Ersatz des Ammoniumsulfates durch das Nitrat bildeten sich kleinere Pilzinseln, am Glase meist ein Pilzring, beide erheblich dicker als in den S-Kulturen, oft stark gefaltet. Diese Wucherungen behielten lange Zeit eine rein weiße Farbe und nur in der Mitte fand eine spärliche Fruktifikation statt. Die Reaktion der Kulturen in Lösung S war schwach oder stark alkalisch, der in Lösung A stark sauer, während die ursprüngliche Nährlösung schwach saure Reaktion zeigte. So verbrauchten 100 ccm Kultur nach kurzem Aufkochen zur Neutralisierung (Indikator: Phenolphthalein) an Kaliumhydroxyd:

Stickstoffquelle	Kontrolle	Kultur	
		I	II
Kaliumnitrat	81,4 mg	0	0
Natriumnitrat	87,2 „	0	0
Ammonium- { Monokaliumphosphat (KH_2PO_4)	110,5 „	273,4 mg	274,5 mg
sulfat + { Dikaliumphosphat (K_2HPO_4) .	69,8 „	145,4 „	157,0 „

Um einen Einblick in die Ursachen dieser Reaktionsänderung, den Umsatz der Stickstoffverbindungen und des Glycerins zu erhalten, wurden Bilanzversuche über Stickstoff- und Kohlenstoffverbrauch aufgestellt.

A. Versuche mit verschiedenen Stickstoffverbindungen.

Erster Versuch.

Je 100 ccm einer Lösung von 0,2% Monokaliumphosphat, 0,1% Magnesiumsulfat und 5% Glycerin wurden mit 0,5 g Kalium-, Natrium-, Calcium-, Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat versetzt. In einem weiteren Versuch mit Ammoniumsulfat war das primäre Kaliumphosphat durch das sekundäre ersetzt. Die Lösungen befanden sich in Erlenmeyer-Kolben von 250 ccm Inhalt. Sie wurden 20 Minuten bei 100° sterilisiert und mit je einer Öse Penicillium-Sporen infiziert. Der Versuch dauerte sieben Wochen. Nach dieser Zeit war die Reaktion gegen Lackmus in den Kulturen mit Kalium- und Natriumnitrat schwach alkalisch, in denen mit Calciumnitrat neutral, in allen Ammoniumsalzkulturen stark sauer. Die Pilzdecken wurden abfiltriert, mit warmem Wasser gewaschen, auf dem Filter bei 105° bis zur Konstanz getrocknet, gewogen und dann nach Kjeldahl verbrannt. In dem Filtrat wurden durch Destillation mit Magnesia Ammoniakstickstoff, nach Ulsch Salpeterstickstoff und durch Verbrennen mit Schwefelsäure — wenn nötig nach vorausgegangener Reduktion des Salpeterstickstoffs — der Gesamtstickstoff bestimmt. Die Ergebnisse zeigt nebenstehende Tabelle I.

Tabelle I.

Stickstoffquelle			I	II	III	IV			V	VI	VII	VIII	IX
			Geerntete Trocken- masse	Stickstoff in der Pilzernte		In der Kultur am Schlusse des Versuches			Ammoniak- Stickstoff	Salpeter- Stickstoff	Summe aus II u. IV	Ausnutzung des	
				Gesamt- Stickstoff	mg	%	mg	mg				mg	Salpeter- Stickstoffes %
			mg	mg	%	mg	mg	mg	mg	mg	mg	%	%
Kaliumnitrat	Kultur	1	406,2	17,0	3,7	52,1	3,7	44,5	69,1	24,1	—		
	„	2	413,7	15,8	3,8	47,3	3,4	42,6	63,1	31,0	—		
	Kontrolle	1	—	—	—	68,6	0	68,6	68,6	—	—		
	„	2	—	—	—	68,6	1,6	68,6	68,6	—	—		
Natrium- nitrat	Kultur	1	327,4	—	—	63,7	3,0	57,9	—	24,9	—		
	„	2	374,7	10,8	2,9	63,7	5,7	57,9	84,5	24,9	—		
	Kontrolle	1	—	—	—	84,8	0	84,8	74,8	—	—		
	„	2	—	—	—	84,8	1,7	84,8	84,8	—	—		
Ammonium- nitrat	Kultur	1	544,6	30,9	5,7	—	51,9	83,7	166,5 ¹⁾	6,0	40,5		
	„	2	469,6	25,9	5,5	—	63,0	80,8	169,7 ¹⁾	9,2	27,8		
	Kontrolle	1	—	—	—	175,6	89,1	86,6	175,6	—	—		
	„	2	—	—	—	177,9	85,4	92,5	177,9	—	—		
Ammonium- sulfat + Monokalium- phosphat (KH ₂ PO ₄)	Kultur	1	432,8	26,6	6,2	74,9	72,3	—	101,6	—	28,5		
	„	2	455,8	27,0	5,9	75,9	72,3	—	102,9	—	27,6		
	Kontrolle	1	—	—	—	103,8	103,8	—	103,8	—	—		
	„	2	—	—	—	105,7	105,7	—	105,7	—	—		
Ammonium- sulfat + Dikalium- phosphat (K ₂ HPO ₄)	Kultur	1	511,8	25,9	5,1	79,1	73,6	—	105,0	—	26,8		
	„	2	535,4	27,4	5,1	75,3	68,8	—	102,7	—	30,3		
	Kontrolle	1	—	—	—	107,5	107,5	—	107,5	—	—		
	„	2	—	—	—	108,6	108,6	—	108,6	—	—		

¹⁾ Diese Zahlen sind, da die Gesamtstickstoffbestimmungen verunglückten, um die etwaigen kleinen Mengen gelösten organischen Stickstoffs zu niedrig.

Es ergibt sich zunächst aus Spalte I, daß die Produktion an Pilzmasse in den verschiedenen Gruppen außerordentlich verschieden ist. Am geringsten ist sie in den Natriumnitratkolben, erheblich höher in den Kaliumnitratkolben. Von den Calciumnitratkolben, die in der Tabelle fehlen, ist einer verloren gegangen. Die Ernte im anderen betrug 577,9 mg. Erheblich besser ist die Ausnutzung des Glycerins in den Ammoniumsalzkolben gewesen. Sie übersteigt in den Sulfatkolben mit primärem Kaliumphosphat die in den Kaliumnitratkolben bereits um ein Geringes, in den Sulfatkolben mit sekundärem Phosphat und in den Nitratkolben ziemlich erheblich, sodaß sich für die Pilzernten, wenn man die der Kaliumnitratkolben gleich 100 setzt, die Werte in den Ammoniumsalzkolben in obiger Reihenfolge auf 108, 128, 124 belaufen. Eine Beziehung zwischen dargebotener Stickstoffmenge und der Trockenmasse läßt sich aus den Zahlen nicht ohne Weiteres folgern. Zwar ist die Trockenmasse in den an Stickstoff reicheren Ammoniumsalzkulturen erheblich größer als in den Alkalinitratkulturen. Aber in den Ammoniumsulfatreihen ist trotz gleicher Stickstoffmengen die Trockenmasse je nach Verwendung des primären oder sekundären Kaliumphosphates sehr verschieden groß; auch zeigen die Spalten VIII und IX, daß überall der größte Teil des Stickstoffes ungenutzt geblieben ist.

Die Ausnutzung des Stickstoffes beträgt in allen Fällen nur etwa 24—30 %. Für die Ammoniumnitratkolben sind die in der Tabelle nicht enthaltenen Werte für die Gesamtausnutzung nur 23,3 bzw. 18,6 %, dagegen ist in diesen Kulturen der Ammoniakstickstoff ebenso stark wie in den Sulfatkolben, der Nitratstickstoff aber nur in sehr geringem Maße verwendet werden, sodaß also der Pilz seinen Stickstoffbedarf leichter aus der Ammoniumgruppe als aus der Nitratgruppe decken kann, eine Beobachtung, die auch Czapek¹⁾ gemacht hat. Man könnte versucht sein, auch den geringen Stickstoffgehalt der Pilzernten (Spalte III) in den Nitratkulturen (für eine in der Tabelle nicht aufgeführte Kultur auf Calciumnitrat betrug er 2,6 %) auf die geringere Assimilierbarkeit der Nitratgruppe zurückzuführen. Indessen gemahnt eine Beobachtung Czapek's zur Vorsicht, der in seinen Versuchen in normal entwickelten Rasen von *Aspergillus niger* stets 10—11 % Stickstoff und größere Schwankungen nach oben und unten nur bei nicht normaler Entwicklung gefunden hat.

In dem vorliegenden Versuche sind während des Pilzwachstums aber zweifellos nachteilige Veränderungen der Nährlösung eingetreten. In den Alkalinitratkolben entsteht bald eine alkalische Reaktion. Diese kann, wie Spalte V zeigt, nicht auf Ammoniakbildung aus der Nitratgruppe zurückgeführt werden, sondern ihre Ursache nur in der eliminierenden Einwirkung des Pilzes auf die Ionen der Nitrate haben, indem die Anionen NO_3 in den Stoffwechsel gezogen werden und die Kationen zurückbleiben. Ähnliche Verhältnisse bestehen nach Burri und Stutzer²⁾ bei der Denitrifikation, und Kohn und Czapek³⁾ haben für höhere Pilze das gleiche bei fettsauren Salzen der Alkalien nachgewiesen.

Andererseits wirkt in den Ammoniumsalzkolben die bald einsetzende stark saure Reaktion hemmend. Hier tritt dieselbe auch äußerlich an dem beschränkten Wachstum der einzelnen Pilzinseln, ihrer faltigen Form und der mangelhaften Fruktifikation deutlich hervor. Die höhere Pilzernte in den Kolben mit sekundärem Phosphat ist

¹⁾ Hoffmeister's Beiträge z. chem. Physiologie 1902, 1, 539.

²⁾ Zentrbl. Bakteriöl. II, Abt. 1895, 1, 412.

³⁾ Hoffmeister's Beiträge z. chem. Physiologie 1906, 9, 307.

zweifellos auf die teilweise Neutralisierung der entstehenden Säure zurückzuführen. Die saure Reaktion entsteht auch in diesem Falle lediglich durch Elektion der Kationen, wie die folgende Bilanz von Kationen und Anionen einer Kultur auf Ammoniumsulfatlösung zeigt:

	Stickstoff im Pilzrasen	In der Lösung				Phosphat-Ion (PO ₄)
		Stickstoff	Magnesium	Kalium	Sulfat-Ion (SO ₄)	
Kontrolle	—	264,5 mg	26,5 mg	142,5 mg	1004,5	353,0 mg
Kultur	29,0 mg	233,0 „	26,0 „	144,2 „	1013,5	358,5 „
Es entsprechen:						
	Kontrolle	Kultur				
26,5 mg Mg	106,5 mg SO ₄	26,0 mg Mg	104,4 mg SO ₄			
264,5 mg N	906,9 mg SO ₄	233,0 mg N	794,6 mg SO ₄			
Also gebunden:	1013,4 mg SO ₄	Also gebunden:	899,0 mg SO ₄			
142,5 mg K	347,1 PO ₄	144,2 mg K	351,3 mg PO ₄			

Demnach sind in der Kultur freie anorganische Säuren enthalten, die etwa 114,5 mg SO₄ entsprechen, während die im Pilzmycel festgelegten 29 mg Stickstoff 99,9 mg SO₄ erfordern würden. Auf ähnliche Verhältnisse bei anorganischen Ammoniumsalzen haben schon früher Nikitinsky¹⁾ und Czapek (a. a. O.) hingewiesen. Trockenmasseerzeugung und Stickstoffausnutzung in den Glycerinkulturen sind also komplexe Vorgänge, die bei gleicher Stickstoffmenge von der Art der Bindung des Stickstoffes und der Art der Zahl der in der Nährlösung verbleibenden nicht in den Stoffwechsel gezogenen Ionen der Stickstoffverbindungen abhängen, ferner aber, da die Zahl dieser Ionen mit der Lebenstätigkeit des Pilzes steigt, auch von der Menge des Glycerins. Bei der üblichen Anwendung gleicher Mengen der Stickstoffverbindungen in den Nährlösungen werden die Verhältnisse durch die verschiedenen Mengen Stickstoff und die Ionenzahl unnötig kompliziert. Klarer wird das Bild, wenn man mit äquimolekularen Mengen der Stickstoffverbindungen arbeitet und so gleiche Stickstoffmengen und gleiche Ionenzahl erhält. In dem folgenden Versuch sind diese Verhältnisse berücksichtigt worden.

Zweiter Versuch.

Es wurde eine Grundlösung von 2,0 g Kaliummonophosphat, 1,0 g Magnesiumsulfat, 20 g Glycerin und 1000 ccm destilliertem Wasser verwendet, der an Stickstoffverbindungen 10,1 g Kaliumnitrat, 8,5 g Natriumnitrat, 8,0 g Ammoniumnitrat, 6,6 g Ammoniumsulfat pro Liter zugesetzt wurden. Für jede Kultur dienten 200 ccm in einem 500 ccm-Erlenmeyer-Kolben. Der Versuch dauerte nur 14 Tage und es war daher in den Alkalinitätskolben erst ein Teil der natürlichen Acidität neutralisiert, während die Ammoniumsalzkolben fast alle schon kräftig sauer reagierten und auch in der Gestalt der Pilzrasen deutlich die Hemmung zeigten. Es gebrauchten 100 ccm Lösung zur Neutralisierung (Indikator: Phenolphthalein) an Kaliumhydroxyd:

	Kultur 1	Kultur 2	Kultur 3	Kontrolle 1	Kontrolle 2
Natriumnitrat . . .	64,6 mg	61,6 mg	58,8 mg	78,4 mg	78,4 mg
Kaliumnitrat . . .	61,6 „	—	58,8 „	81,2 „	84,0 „
Ammoniumnitrat . .	100,8 „	137,2 „	126,0 „	103,6 „	100,8 „
Ammoniumsulfat . .	232,4 „	226,8 „	201,6 „	95,2 „	98,0 „

¹⁾ Jahrb. f. wissenschaft. Botanik 1904. 40, 1.

Über die Pilzernte und die Verhältnisse der Stickstoffverbindungen gibt die folgende Tabelle Aufschluß.

Tabelle II.

Stickstoffquelle		I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII
		Geerntete Trocken- masse	Stickstoff in der Pilzernte		In der Kultur am Schlusse des Versuches			Summe aus II, IV und V	Ausnutzung des	
		mg	mg	%	Ammoniak- Stickstoff mg	Salpeter- Stickstoff mg			Ammoniak- Stickstoffes %	Salpeter- Stickstoffes %
Kaliumnitrat	Kultur 1	551,5	28,7	5,2	0	247,0	275,7	—	—	13,7
	„ 2	589,0	31,4	5,4	3,9	247,0	278,4	—	—	13,7
	„ 3	660,0	32,2	4,9	0	247,0	279,2	—	—	13,7
	Kontrolle 1	—	—	—	3,9	282,2	282,2	—	—	—
	„ 2	—	—	—	0	290,1	290,1	—	—	—
Natriumnitrat	Kultur 1	332,0	26,3	7,9	3,9	247,0	273,3	—	—	13,4
	„ 2	390,0	25,9	6,6	3,9	250,9	276,8	—	—	12,1
	„ 3	391,0	21,5	5,6	0	250,5	272,0	—	—	12,2
	Kontrolle 1	—	—	—	3,9	286,2	286,2	—	—	—
	„ 2	—	—	—	3,9	284,4	284,4	—	—	—
Ammonium- nitrat	Kultur 1	680,0	42,2	6,2	246,8	274,6	563,6	12,7	—	6,1
	„ 2	1104,0	61,7	5,6	238,8	262,7	563,2	15,5	—	10,2
	Kontrolle 1	—	—	—	282,6	294,5	577,1	—	—	—
	„ 2	—	—	—	282,6	290,5	573,1	—	—	—
Ammonium- sulfat	Kultur 1	1062,0	54,0	5,1	207,0	—	261,0	25,2	—	—
	„ 2	817,0	49,4	6,0	222,9	—	272,3	19,4	—	—
	„ 3	691,0	37,4	5,4	226,9	—	264,3	18,0	—	—
	Kontrolle 1	—	—	—	274,6	—	274,6	—	—	—
	„ 2	—	—	—	278,6	—	278,6	—	—	—

Aus Spalte I der Tabelle ergibt sich zunächst, daß die Trockenmasseerzeugung in den Ammoniumsalzkolben außerordentlich ungleichmäßig verlaufen ist. Dies hat seinen Grund in der Art der Aussaat. Beim Ausstäuben der Pilzsporen werden nicht alle Teile der Flüssigkeitsoberfläche gleichmäßig getroffen und es entstehen daher entweder einzelne größere oder zahlreiche sehr kleine Pilzinseln, die sich in bezug auf Wachstum und Fruktifikation sehr verschieden verhalten. Dagegen ist die Trockenmasseerzeugung in den Alkalinitratkolben verhältnismäßig gleichartig verlaufen. Indessen geht auch trotz der ungleichmäßigen Entwicklung der Ammoniumsalzkulturen aus den Zahlen deutlich hervor, daß die Trockenmasseerzeugung bei gleich großer Stickstoffmenge in den Ammoniumsalzkolben, besonders in den Sulfatkolben höher als in Alkalinitratkolben gewesen ist, ebenso die absolute Stickstoffaufnahme und die Ausnutzung des Stickstoffes; wie im ersten Versuch, so ist auch hier in den Ammoniumnitratkolben vorwiegend der Ammoniumstickstoff verwendet worden. Nimmt man hinzu, daß die Ammoniumsalzkolben abnorme, die Alkalinitratkolben normale Pilzdecken zeigten, so geht aus diesen Versuchen die Überlegenheit der Ammoniumgruppe über die Nitratgruppe klar hervor.

Weiter zeigt sich, daß die Trockenmasseproduktion in den Natriumnitratkolben erheblich geringer ist als in den Kaliumnitratkolben, ebenso die Stickstoffaufnahme, wenn auch nur in geringem Maße, sodaß der Stickstoffgehalt der Pilzrasen auf Natrium-

nitratkulturen um etwas höher ist auf Kaliumnitratkulturen. Dementsprechend ist die Alkalibildung in beiden Kulturreihen (Vergl. S. 314) etwa in gleichem Schritt vor sich gegangen. Man darf also aus diesem Versuch wohl folgern, daß unter den gewählten Konzentrationsbedingungen das Natriumsalz dem Kaliumsalz in bezug auf Massenproduktion nachsteht, wobei dahingestellt werden muß, ob lediglich die Alkaliwirkung oder sonstige physiologische Wirkungen der Na-Ionen ausschlaggebend sind.

Aus den angeführten Versuchsreihen ergeben sich also folgende Schlüsse:

1. Durch das Pilzwachstum wird in den Kulturflüssigkeiten, die als Stickstoffquelle nur Alkalinitrate enthalten, infolge stärkerer Elektion der NO_3 -Ionen Alkali, in den Kulturflüssigkeiten, die nur anorganische Ammoniumsalze enthalten, durch Elektion der NH_4 -Ionen Säure erzeugt.

2. NH_4 -Ionen sind für die Stickstoffversorgung des Pilzes besser geeignet als NO_3 -Ionen.

3. Bei Stickstoffversorgung durch Alkalinitrate wird kein Ammoniak ausgeschieden.

4. Die Produktion von Trockenmasse ist bei Anwendung äquimolekularer Mengen der Nitrate des Kaliums, Natriums, Ammoniums und des Ammoniumsulfates bei den Ammonsalzen größer als bei den Alkalinitraten.

5. Bei Ernährung mit Kaliumnitrat bildet der Pilz mehr Trockenmasse als mit äquimolekularen Mengen Natriumnitrat.

Es bleibt nun die Frage, ob diese Unterschiede in der Trockenmasseerzeugung, wie sie in den vorstehenden Versuchen in 5 und 2%igen Glycerin-Lösungen zutage treten, unter allen Umständen eintreten werden. Da Alkali- und Säureproduktion von der Lebenstätigkeit des Pilzes und somit von der Konzentration der Glycerinlösung abhängig sind, so wird bei einer genügenden Verdünnung der Glycerinlösung voraussichtlich die Alkali- und Säureausscheidung die Grenzwerte, bei denen merkliche Hemmung des Wachstums eintritt, nicht erreichen, und die Massenproduktion in Alkalinitrat- und Ammoniumsalzkulturen sich nicht wesentlich unterscheiden. Der letzte Versuch, der zugleich ein Bild über die quantitativen Verhältnisse beim Abbau des Glycerins geben sollte, wurde daher so eingerichtet, daß das Glycerin nur in $\frac{3}{4}$ —1%iger Lösung vorhanden war.

B. Versuch über die quantitativen Verhältnisse beim Abbau des Glycerins.

0,4—0,5 g Glycerin, genau gewogen, wurden in zweimal je 50 ccm der Lösungen A und S gelöst, die sich in Erlenmeyer-Kolben von 250 ccm Inhalt mit eingeschliffenem Glasstopfen befanden, durch den ein Rohr fast bis auf die Oberfläche der Flüssigkeit reichte, ein zweites unter dem Stopfen abschnitt. Durch die sterilisierte, geimpfte Kultur, die nach beiden Seiten durch mit verdünnter Schwefelsäure gefüllte, in Verbindung mit dem Kulturkolben sterilisierte Liebig'sche Kaliapparate nach außen abgeschlossen war, wurden täglich 20 l entkohlensäuerte und entkeimte Luft geleitet. Die Versuchstemperatur betrug etwa 20°.

Der Pilz entwickelte sich auf der Oberfläche beider Kulturflüssigkeiten sehr üppig, fruktifizierte normal, auch auf den A-Kolben, und es trat sehr schnell eine starke Kohlensäureentwicklung ein, die aber bald nachließ. Nach 2 Monaten wurde der Versuch abgebrochen. Die Kulturen wurden unter stetem Durchleiten

von Luft erst im Wasserbade, dann auf der freien Flamme bis auf etwa 90° erwärmt, um alle Kohlensäure auszutreiben; die schwach alkalisch reagierenden Lösungen S wurden sodann mit je 2 g KH_2PO_4 versetzt und nochmals erhitzt, um gebundene Kohlensäure zu entfernen; bei den sauer reagierenden Lösungen A unterblieb dies. Dann wurden die Kulturen durch geblühte Kieselgur im Gooch-Tiegel filtriert, sodaß das Mycel in der Kieselgur zurückblieb. Nach genügendem Auswaschen mit Wasser wurde der Tiegelinhalt getrocknet und mit Kupferoxyd unter Anwendung der nötigen Vorsichtsmaßregeln zum Zurückhalten von Stickstoffoxyden etc. verbrannt.

Das in den Barytwasserröhren ausgefallene Bariumcarbonat wurde abfiltriert, in Salzsäure gelöst und das Barium in üblicher Weise als Sulfat bestimmt. Das Filtrat der Kultur wurde zur Trockene verdampft; es hinterblieb ein fester Rückstand.

Der Kohlenstoffgehalt des verwendeten Glycerins (reinstes von Merck pro analysi) betrug 31,8 %, wie die mehrfach sowohl mit Kupferoxyd wie nach König mit Permanganat in Lösung ausgeführte Verbrennung übereinstimmend ergab. Unter Verwendung dieser Zahl ergab sich folgende Bilanz für den ein- und ausgeführten Kohlenstoff:

Bezeichnung der Lösung	I	II	III	IV	VI		VII
	Eingeführter Kohlenstoff mg	Kohlenstoff in der Atmungs-Kohlensäure mg	Kohlenstoff in der Pilzernte mg	Summe von II und III	Von 100 Teilen verbraucht für die Atmung	Kohlenstoff für den Körperaufbau	Summe
A 1	0,1771	0,1344	0,0580	0,1924	75,9	32,8	108,7
A 2	0,1803	0,1311	0,0567	0,1878	72,9	31,5	104,2
S 1	0,1512	0,1149	0,0396	0,1545	76,0	26,2	102,2
S 2	0,1542	0,1093	0,0444	0,1537	70,9	28,8	99,7

Die Bilanzen stimmen so gut, wie man dies bei derartigen Versuchen eben verlangen kann. Das Glycerin wird also, wie es schon nach den früher angeführten Befunden wahrscheinlich war, glatt zu Kohlensäure und Wasser verbrannt und zwar werden etwa $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ des Kohlenstoffes für energetische und der Rest für plastische Zwecke verbraucht.

Eine Erntebestimmung hat bei diesem Versuche leider unterbleiben müssen, da die Mycelteile dem Kulturgläse teilweise so fest anhafteten, daß sie mittels Kieselgur abgerieben werden mußten. Nach den in Spalte VI befindlichen Zahlen dürfte aber ein wesentlicher Unterschied in der Trockenmasseerzeugung unter den hier angewendeten Konzentrationsverhältnissen nicht bestanden haben.

Die Endprodukte des Abbaues des Glycerins durch das hier verwendete Penicillium sind also wenigstens in verdünnten Lösungen sowohl bei Ernährung mit Ammoniumsalzen wie mit Alkalinitraten lediglich Kohlensäure und Wasser. Ob diese Zerlegung je nach der Stickstoffquelle verschieden schnell erfolgt, ist nicht quantitativ untersucht worden, nach der Fällung des Barytwassers zu schließen aber sehr wohl möglich. Für organische Stickstoffverbindungen dürften die Verhältnisse je nach dem Aufbau ebenso wie bei Ammoniumsalzen und Alkalinitraten liegen.

Es bleibt nun noch zu erörtern, ob sich die Zersetzung des Glycerins bei der Abspaltung aus Fetten wesentlich von der in Lösungen unterscheiden wird. Die Zersetzung der Fette wird in der Natur und im menschlichen Haushalte gewöhnlich

in Nährböden und unter Verhältnissen erfolgen, in denen ein schneller allgemeiner Stoffaustausch durch alle Teile hindurch nicht in dem Maße wie in Nährlösungen erfolgen kann (z. B. im Boden, in Futtermitteln, Samen, Butter u. ä.). Während daher in letzteren ansgeschiedene alkalische oder saure Reste der stickstoffhaltigen Nährstoffe bald den Nährboden im Ganzen vergiften, wird unter natürlichen Verhältnissen der hemmende Stoff auf die nächste Nähe der Pilzfäden beschränkt bleiben, sodaß deren fortwachsende Spitze immer wieder in „unvergiftete“ Zonen gelangt. Abbau des Glycerins und Erzeugung von Trockenmasse werden sich also unter natürlichen Verhältnissen — und ebenso in Kieselgurkulturen — in der Weise abspielen, wie es für verdünnte Nährlösungen auf S. 316 dargestellt worden ist.

3. Die Aufnahme der Fettsäuren und Fette in die Pilzzelle.

Versuche über die Mechanik der Aufnahme der Fettsäuren und Fette in die Pilzzelle hat bisher nur Schmidt angestellt; alle anderen Beobachter haben diese Frage unbeachtet gelassen, trotzdem ihre Lösung für das Verständnis der verschiedenen Assimilierbarkeit der Fettsäuren und Fette von großer Bedeutung ist, bei der neben den Vorgängen im Inneren der Zelle das schnellere oder langsamere Durchdringen der Zellhaut sicher eine große Rolle spielt. Nur Eykman hat sie kurz gestreift, worauf weiter unten zurückgekommen werden soll. Schmidt, der seine Beobachtungen an Massenkulturen, ferner an Kulturen im hängenden Tropfen anstellte, ist zu einem klaren Ergebnis nicht gekommen. Eine extracelluläre Spaltung der Fettsäuren hat er nicht nachweisen können, was aber, wie er hervorhebt, nicht gegen die intermediäre Entstehung wasserlöslicher Spaltungsstücke spricht. Seifenbildung glaubt er ausschließen zu müssen, da die untersuchten Pilze auf Gemischen von Quarzsand, anorganischer Nährlösung und Natriumoleat nur sehr kümmerlich wuchsen. Versuche, eine direkte Wanderung gefärbter Öle in Emulsionen mit Seifen durch die Pilzmembran mikroskopisch nachzuweisen, scheiterten an der Kleinheit der Objekte. Da Schmidt ein enges Anschmiegen der Pilzfäden an die Krystallglomerate oder Tropfen der Versuchsfette (Mandelöl, Ölsäure, Palmitinsäure, Schweineschmalz) beobachtete, so glaubt er, daß dennoch eine Art Lösung stattfindet. Er sagt: „Immerhin muß die Aufnahme der festen Körper in die Zellen hinein stattfinden. Wenn dies nicht durch eine Spaltung der Fette in wasserlösliche Körper oder durch die Bildung wasserlöslicher Verbindungen der Fettsäuren geschieht, so ist doch eine durch die Mycelfäden bedingte Lösung oder Schmelzung an den Berührungsstellen durchaus notwendig.“ Da Schmidt beobachtete, daß mit Alkanna gefärbte Ölsäure, ferner Mandelöl mit geringen Mengen freier Säure leicht, dagegen Neutralfette sehr schwer von Zellen grüner Pflanzen aufgenommen wurden und anscheinend unverändert im Protoplasma erschienen, so glaubte er schließen zu dürfen, daß auch bei den Pilzen „das Durchdringen der Fette durch lebende Cellulosehäute in der Weise vor sich geht, daß ein in der Zellhaut befindlicher Körper mit den freien Fettsäuren eine seifenartige Verbindung bildet. Diese durchtränkt einerseits die Cellulosemembran und erhöht dadurch die Capillarattraktion derselben für Fette; andererseits emulgiert sie auch einen Teil des Fettes und vermittelt auf diese Weise den Durchgang desselben.“ Schmidt's Standpunkt läßt sich also im wesentlichen kurz dahin präzisieren, daß Fettsäuren und Fette unverändert in Form einer Emulsion mit seifenartigen Verbindungen, die innerhalb der Zellmembran entstehen, diese passieren. Czapek¹⁾ bemerkt dazu,

¹⁾ Czapek, Biochemie der Pflanzen 1, 132.

daß der Durchtritt künstlich gefärbten Fettes, den auch Hofbauer¹⁾ beobachtet hat, nichts für oder gegen eine Fettspaltung beweist, weil der Farbstoff auch in Fettsäuren löslich ist und bei nachträglich erfolgter Fettsynthese einfach gelöst bleiben könnte. Wohl beweisen diese Beobachtungen nach Czapek aber, daß nicht das gesamte Fett bei der Resorption in neutrale Seifen gespalten wird, weil sonst eine Farbenänderung des Alkannins eintreten müßte.

Ich habe die Frage des Durchtrittes der Fettsäuren und Fette durch die Zellwand des verwendeten *Penicillium* an einer größeren Zahl von Objekten experimentell geprüft und will zunächst meine Befunde bei den Fettsäuren mitteilen.

Was zunächst die Angabe Schmidt's betrifft, daß fettsaure Salze für Schimmel eine wenig geeignete Kohlenstoffquelle seien, so ist sie in dieser Allgemeinheit nicht zutreffend. Daß die Alkalisalze, wenn sie in der Kultur in größeren Mengen gereicht werden, nicht gut vertragen werden, ist nicht verwunderlich, da sie in wässriger Lösung bekanntlich Alkali abspalten und damit eine dem Pilzwachstum ungünstige Reaktion schaffen. Ferner aber werden diese Verhältnisse dadurch noch ungünstiger, daß bei der Oxydation der Seifen durch die Pilze übrig bleibendes und ausgeschiedenes Alkali die Alkalität der Nährlösung noch erhöht. Wendet man Seifen an, deren alkalische Reste das Pilzwachstum weniger stark beeinflussen, wie Ammonium- und Kalkseifen, so gedeiht *Penicillium* auf solchen Kulturen ziemlich gut, wenn auch bei weitem nicht so freudig wie bei Anwesenheit der freien Fettsäuren oder der Glyceride. Für die nach dieser Richtung angestellten Versuche dienten Kieselgurkulturen, in denen die Seifen sehr fein verteilt dargeboten wurden. Die Bestimmung der in den Kulturen unzersetzt verbliebenen Seifen geschah in der Weise, daß die Kieselgurkultur in einer Porzellanschale mit Spiritus erwärmt, dann mit Salzsäure versetzt und auf dem Dampfbade zur Trockene verdampft wurde. Der Rückstand wurde nochmals mit Spiritus erwärmt und mit Salzsäure eingedampft und diese Behandlung noch ein drittes Mal wiederholt. Der trockene Rückstand wurde dann in üblicher Weise mit Äther ausgezogen und die freie Fettsäure gewogen.

Versuch 1.

Die neutralen Kalium-, Natrium-, Ammonium-, Calciumsalze der Myristin- und Erucasäure wurden in Mengen, die 1 g freier Säure entsprachen, mit Lösung S und A, die Ammoniumsalze mit einer Nährlösung mit 0,2% Monokaliumphosphat (KH_2PO_4) und 0,1% Magnesiumsulfat, sowie einer solchen mit 0,2% Dikaliumphosphat (K_2HPO_4) und 0,1% Magnesiumsulfat in Kieselgur angesetzt. Die Ammoniumsalze wurden nicht sterilisiert, sondern den wie üblich sterilisierten Kieselgurkulturen unmittelbar vor der Impfung zugesetzt.

Es entwickelte sich ein gutes Wachstum in sämtlichen Ammonium- und Calciumsalzkulturen, von letzteren in denen mit Lösung S schwächer. Besonders die Ammoniumsalzkulturen zeigten eine sehr starke Fruktifikation. In den Natrium- und Kaliumsalzkolben trat kein merkliches Wachstum ein.

Der Versuch dauerte 6 Wochen.

	1. Ammoniumseifen.			2. Calciumseifen.		
	Kontrolle	Geimpft		Kontrolle	Geimpft	
		Monokalium- phosphat	Dikalium- phosphat		Lösung A	Lösung S
Myristinsäure	0,9234	0,0345	0,0230	0,9148	0,3165	0,5280
Erucasäure	0,9518	0,2916	0,3438	0,9327	0,3922	verloren

1) Pflügers Archiv 1900, 81, 263.

Versuch 2.

1 g neutraler Kalium- und Calciumseifen der Laurin-, Myristin-, Palmitin-, Öl- und Erucasäure wurden in Kieselgur mit Lösung S, die entsprechenden Ammoniumseifen mit einer Lösung von 0,2% Monokaliumphosphat und 0,1% Magnesiumsulfat angesetzt. Der Versuch dauerte 6 Wochen.

1. Ammoniumseifen.

	Laurinsäure	Myristinsäure	Palmitinsäure	Ölsäure	Erucasäure
Geimpft	0,0217	0,1348	0,1691	0,0494	0,3540
Kontrolle	0,9035	0,9020	0,9002	0,8910	0,9696

2. Calciumseifen.

	Palmitinsäure	Erucasäure
Geimpft	0,3135	0,4018
Kontrolle	0,8294	0,8050

3. Kaliumseifen.

	Palmitinsäure	Erucasäure
Geimpft	0,8501	0,4476
Kontrolle	0,8383	0,8311

Versuch 3.

Neutrale Natrium- und Kaliumseifen der Myristin- und Erucasäure, entsprechend 1 g der freien Säuren, wurden mit Lösung S und A angesetzt. Der Versuch dauerte 3 Wochen.

	Lösung S	Lösung A
Natriummyristat	—	0,7854 0,6771
Kaliummyristat	0,5742	0,4033
Natriumerucat	0,6897 0,7259	0,6901
Kaliumerucat	0,6113	0,6545

Es wurden also in der Kieselgurkultur erhebliche Mengen der Ammonium- und Calciumseifen durch den Pilz zerstört, während dies bei den Kalium- und Natriumseifen weniger gut gelang, auch wenn als Stickstoffquelle Ammoniumsalze und damit die Gelegenheit gegeben wurde, das Alkali im Laufe des Versuches zum Teil unschädlich zu machen.

Die Möglichkeit, daß die Fettsäuren in Form ihrer Salze in die Pilzzelle gelangen, ist also nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen und erscheint auch bei den Alkaliseifen in anderem Lichte, wenn man erwägt, daß der Pilz in der Kultur auf den Fettsäuren oder Glyceriden die Alkaliproduktion regulieren kann.

Die beste Aussicht für die Klärung der Frage bot die mikroskopische Untersuchung des Verhaltens der Pilzhyphen gegen Fettsäurekristalle. Schmidt hat diesen Weg bereits eingeschlagen. Wenn er dabei nicht zum Ziel gekommen ist, so liegt dies einerseits daran, daß er mit Kulturen im hängenden Tropfen gearbeitet hat, in dem die Fette nicht genügend fein verteilt werden können. Für diesen Zweck sind feste Nährböden viel geeigneter. Ferner hat Schmidt bei seinen Versuchen die Reaktionsänderungen nicht berücksichtigt, die die Pilze in den anorganischen Nährlösungen hervorbringen und die für die Aufnahme der Fettsäuren von größter Bedeutung sind. Auch hierfür kommt wieder nur der feste Nährboden in Betracht, in dem diese Veränderungen periodisch leicht verfolgt werden können. Ein dritter wichtiger Faktor zur Erzielung eines klaren Einblickes in die Aufnahme der Fettsäuren ist die Prüfung möglichst vieler Säuren mit verschiedenem Molekulargewicht. Ich habe meine Versuche an in Agarplatten suspen-

dierten Fettsäuren ausgeführt. Der Versuchsagar war eine 3⁰/₁₀-ige Lösung eines einige Tage in fließendem Wasser ausgelaugten Streifenagars in destilliertem Wasser, der auf 1 l 2 g Monokaliumphosphat und 1 g Magnesiumsulfat und entsprechende Stickstoffverbindungen zugefügt wurden. Zur Herstellung der Fettsäureplatten wurde in die verflüssigten Agarröhrchen eine kleine Messerspitze oder ein Tröpfchen Fettsäure gegeben und durch kräftiges Schütteln möglichst fein emulgiert. Bei den niedrig schmelzenden Fettsäuren wurde diese Emulsion kurz vor dem Erstarren des Agars (etwa 40⁰) zu Platten ausgegossen, bei den höher schmelzenden natürlich früher. Die niedrig schmelzenden Säuren kann man auf diese Weise in sehr feinen Krystallen im Agar verteilt erhalten (Tafel I, Fig. 1). Bei den höher schmelzenden tritt infolge des Auskrystallisierens lange vor dem Erstarren des Agars leicht Bildung größerer Krystalldrusen ein. Vorteilhaft ist es für die meisten Zwecke, die Emulgierung so zu führen, daß auch bei den leicht schmelzenden Säuren einige größere Tropfen in der Platte erhalten bleiben. Man legt am besten mehrere Platten mit verschiedenen Mengen der Fettsäuren an, da die mikroskopischen Bilder je nach dem physiologischen Zustand der Pilzkultur nicht bei allen Konzentrationen gleich klar und charakteristisch hervortreten.

In die Mitte der Fettsäureplatten werden einige Penicilliumsporen gebracht. An den Rändern der daraus erwachsenden Pilzkolonien kann man die Vorgänge bei der Aufnahme der Fettsäuren mikroskopisch gut verfolgen. Die Erscheinungen auf den Platten verschiedener Fettsäuren lassen sich am besten an dem folgenden Auszuge aus einem Versuchsprotokoll erkennen. Die Versuche sind in großer Zahl mit verschiedenen Abänderungen wiederholt worden und haben stets dieselben Erscheinungen gezeigt.

Versuche mit Lösung S.

Für die Versuche wurden verwendet Laurin-, Myristin-, Palmitin-, Stearin-, Arachin-, Öl- und Erucasäure. Die Platten erschienen in der Durchsicht durch die Fettsäurekryställchen getrübt.

Laurinsäure. (Tafel I, Fig. 2.) Die Pilzkolonie entwickelte sich üppig. Um sie herum entstand eine mit bloßem Auge sehr deutlich erkennbare, zuweilen bis zu 1 cm breite meist aber etwas schmalere aufgehellte Zone. In dieser waren die Fettsäurekrystalle verschwunden. Am Rande dieser Zone sah man an Stelle der kleinen Säurekrystalle lange Krystallnadeln und -tafeln anderer Struktur. Auch größere Fettsäuretropfen waren am Rande dicht mit diesen Krystallnadeln besetzt und zeigten im übrigen Abschmelzungserscheinungen. Innerhalb der Pilzkolonie waren Fettsäurekrystalle nicht mehr zu sehen, nur Reste besonders großer Fettsäureklumpen waren zuweilen stellenweise zu finden. Mit dem Fortschreiten der Pilzkolonie verschwand die Fettsäure allmählich, die Platte wurde durchsichtig und war nach etwa 8 Tagen völlig säurefrei. (Tafel I, Fig. 3.)

Myristinsäure. Hier waren die Erscheinungen dieselben wie bei der Laurinsäure.

Palmitinsäure. Das Wachstum des Pilzes war kümmerlicher. Die Fettsäure war in größeren Krystallen und vielfach in Drusen ausgeschieden. Eine aufgehellte Zone war auch hier vorhanden, aber sie blieb stets sehr schmal. Ausscheidung von Krystallnadeln wurde seltener beobachtet, am besten, wenn zwei Pilzkolonien auf der Platte vorhanden waren, in der Zone zwischen ihnen. Auch an den größeren

Säureconglomeraten traten am Rande zuweilen kurze Krystallnadeln hervor. Dagegen zeigte sich auf den Palmitinsäureplatten eine schon an größeren Myristinsäurezuweilen auch schon bei besonders großen Laurinsäuretropfen bemerkbare Erscheinung, die sich bei den Säuren der gesättigten Reihe mit höherem Molekulargewicht stets wiederholte: Die Krystalldrusen wurden von dem Pilzmycel dicht umspinnen, sodaß Mycelknäuel entstanden. In diesen Knäueln verschwand die Fettsäure allmählich. In den älteren Teilen der Kolonie sah man diese nach dem Vergehen der Fettsäure hinterbleibenden Mycelknäuel in großer Zahl (Taf. I, Fig. 5 u. 6; hier sind den hier beschriebenen völlig gleichende Erscheinungen an später beschriebenen Kulturen abgebildet). Dieses Umwuchern von Fettsäurekrystallen und Fetttropfen hat schon Schmidt im hängenden Tropfen beobachtet.

Stearin-, Arachin-, Erucasäure. Das Wachstum des Pilzes war kümmerlich. Das Mycel streifte in langen dünnen Fäden in wenigen Tagen über die ganze Platte und umklammerte in dichten Knäueln die Krystalldrusen. Eine aufgehellte Zone war nicht zu sehen. Nur zuweilen trat an Tropfen der Stearin-, öfter der Erucasäure am Rande die Bildung kurzer Krystallnadeln ein. In den Erucasäureplatten waren zuweilen auch wie in denen der Laurinsäure freiliegende große Krystalltafeln zu sehen. Auch nach Wochen war die Fettsäure aus den Platten nicht ganz verschwunden.

Ölsäure. Der Pilz entwickelte sich üppig. Eine aufgehellte Zone wurde meist nicht beobachtet. Dagegen entstand zuweilen um die Säuretropfen herum eine fein gekörnte, nach außen allmählich in den Agar verschwimmende Zone, die vielleicht auf sehr feine Krystalle zurückzuführen war. Das häufigst beobachtete Bild war, daß der Rand der Tropfen unscharf und unregelmäßig, der ganze Tropfen stark gekörnt und undurchsichtig wurde und am Rande Krystallnadeln anschossen, sodaß die Tropfen sich ganz in morgensternartige Drusen verwandelten (Taf. II, Fig. 7). Diese wurden dann von Mycel ganz durchwuchert. Größe der Tropfen und Konsistenz des Agars, aber auch der physiologische Zustand der zur Impfung verwendeten Kultur spielen anscheinend beim Zustandekommen der verschiedenen Bilder auf Ölsäureplatten eine Rolle.

Beachtenswert war, daß die Pilzkolonien auf Ölsäureplatten in den Mycelfäden der Randeile der Kolonien stets eine große Zahl stark lichtbrechender Fetttropfen zeigten.

Aus dem verschiedenen Wachstum der Pilzkolonien geht zunächst hervor, daß der Nährwert der Fettsäuren mit dem Steigen des Molekulargewichtes abnimmt, allerdings, wie die Verhältnisse bei der Ölsäure zeigen, nicht allgemein. Das Wachstum des Pilzes auf fettsäurefreien Platten entsprach etwa dem auf den Stearin- und Arachinsäureplatten. Dann aber zeigen diese Versuche, besonders die mit Laurin- und Myristinsäure, daß die Fettsäuren außerhalb der Pilzzelle und ohne Berührung durch die Pilzfäden, vielmehr in weiter Entfernung von ihnen in andersartige krystallinische, in der Nährlösung lösliche Stoffe verwandelt werden und in Form dieser Lösung die Zellhaut durchdringen. Auch die Erscheinungen auf den Platten mit Palmitin-, Stearin-, Arachin-, Öl- und Erucasäure sind als denen auf den Laurin- und Myristinsäureplatten gleichartig anzusprechen. Die etwas anderen Bilder erklären sich ohne Zwang durch die schwerere Löslichkeit der Umwandlungsprodukte, sodaß es zur Auflösung und späteren Abscheidung größerer Mengen aus der Nährlösung nicht so leicht kommt, die Krystallbildung sich auf den Rand der

Säureklumpen beschränkt und nur unter besonders günstigen Umständen auch frei in der Platte stattfindet.

Es liegt sehr nahe, die aus den Fettsäuren entstehenden Krystalle für solche der fettsauren Salze zu halten, zumal wenn man das im vorhergehenden Abschnitt über die Zersetzung der Nährlösung S durch den Pilz Mitgeteilte im Auge behält. Veränderungen der Fettsäurekrystalle in der Nähe der Pilzfäden würden also auf eine Abscheidung von Alkali durch diese zurückzuführen sein. Experimentell wurde diese Vermutung bestätigt, wenn man zu den Fettsäureplatten mit Lackmusinktur versetzten Agar verwendete. Es entstand dann bei allen Säuren um die Pilzkolonie herum ein blauer Hof, der bei den Säuren mit niederem Molekulargewicht der aufgehellten Zone und der Ausdehnung der Krystallbildung entsprach. Bei der Laurin- und Ölsäure war die Blaufärbung meist nur schwach, am stärksten trat sie bei den hochmolekularen Säuren hervor, eine Erscheinung, die sich aus der leichteren Löslichkeit der Laurate und Oleate und der dadurch bedingten schnelleren Fixierung des Alkali erklärt. Auch auf den säurefreien Kontrollplatten trat der blaue Hof sehr stark auf. Bemerkenswert war das ganz allgemein üppigere Wachstum des Pilzes auf den mit Lackmuslösung versetzten Platten. Daß aber die Alkalibildung nicht auf Zersetzung von Stoffen der Lackmuslösung zurückzuführen ist, konnte man leicht nachweisen, wenn man ohne diese Lösung hergestellte Fettsäureplatten nach genügender Entwicklung der Pilzkolonie oberflächlich mit Lackmuslösung befeuchtete, oder einen Streifen rotes Lackmuspapier von der Kolonie radiär zum Plattenrande auf den Agar drückte; es entstand sofort um die Kolonie herum ein blauer Hof.

Die Aufnahme der Fettsäuren in die Pilzzelle erfolgt also, wenn die Verteilung weit genug geführt wird, zweifellos lediglich in Form der Lösung von Seifen. Bei der Verwendung von Natriumnitrat dürften in erster Linie Natriumseifen beteiligt sein, in geringerem Grade vielleicht auch Kaliumseifen. Durch Betupfen der Fettsäureplatten mit sehr verdünnten Lösungen von Natrium- und Kaliumhydroxyd kann man Krystallisationen und aufgehellte Zonen von genau derselben Struktur wie durch Pilzkolonien erzielen. Im Zweifel kann man nur darüber sein, ob bei weniger feiner Verteilung, besonders bei Säuren mit größerem Molekül, nicht neben der Aufnahme in Form einer Seifenlösung auch noch eine Aufnahme der unveränderten Säuren in Form einer Emulsion durch die diesen größeren Krystallen angepreßten Hyphen erfolgt. Indessen ist es sehr schwer zu verstehen, wie eine solche Emulsion bei den festen Säuren durch den Pilz hervorgebracht werden sollte. Ich glaube, man kommt auch für die Aufnahme der weniger fein verteilten und schwerlöslichen Säuren, bei denen die Umklammerung der Fettkrystalle durch die Pilzhypen allgemein auftritt, mit der Seifenbildung vollkommen aus. Die Knäuelbildung ist nur die Folge des Reizes, den die lediglich in der nächsten Umgebung der Säuredrusen in den sonst nährstoffarmen Agar diffundierende Seifenlösung auf den Pilz ausübt. Verteilt man die Laurinsäure im Agar in möglichst großen Tropfen, so treten dieselben Umklammerungserscheinungen auf wie bei den hochmolekularen Säuren.

Ersetzt man in der Nährlösung S das Natriumnitrat durch das entsprechende Kaliumsalz, so sind die Erscheinungen im wesentlichen die gleichen. Nur entstand hier öfter auf den Ölsäureplatten um die Kolonie herum eine mit bloßem Auge sichtbare breitere weißliche Zone, die sich unter dem Mikroskope als in Krystalldrusen umgewandelte Ölsäuretropfen darstellte. Auch traten hier im Agar zahlreiche Drusen

langer Krystalltafeln und -nadeln auf, während diese innerhalb der Kolonie ebenso wie die Ölsäuretropfen verschwunden waren. Eine Umwandlung von Ölsäuretropfen in Krystalldrusen hat auch de Kruyff bei seinen Lipobacterkulturen beobachtet. Er spricht, da sie nur bei Gegenwart von Nitraten und bei Reduktion dieser zu Nitriten erfolgt, die Vermutung aus, daß eine Umlagerung der Ölsäure in die stereoisomere Elaidinsäure stattgefunden habe. Diese Umlagerung erfolgt bekanntlich bei Gegenwart von freier salpetriger Säure. Daß diese in den Nährböden entstanden sein sollte, ist wenig wahrscheinlich. Vielleicht hat de Kruyff wie ich Oleatkrystalle vor sich gehabt, die durch Alkaliauscheidung der Bakterien erzeugt worden sind.

Ähnlich wie auf den Ölsäureplatten war auf den Erucasäureplatten nach einer ziemlich breiten aufgehellten Zone eine milchige Zone von Krystalltafeln und mit solchen am Rande gespickter Säuretropfen zu sehen, die im Innern der Kolonie deutliche Auflösungserscheinungen zeigten. Überall war auch hier die Alkaliauscheidung nachzuweisen.

Die gleichen Erscheinungen zeigten sich bei Anwendung von Calciumnitrat.

Hat man es bei diesen Versuchen mit der Abscheidung von Alkali aus den Nährsalzen zu tun, so muß man ähnliche Erscheinungen auch da erwarten, wo der Pilz durch Zersetzung organischer Stickstoffverbindungen Alkali erzeugt. Verwendet man für den Agar eine Nährlösung mit 0,2 % Monokaliumphosphat, 0,1 % Magnesiumsulfat und 0,5 % Asparagin, so erhält man dieselben Bilder wie bei Anwendung der Nitrate infolge der Abspaltung von Ammoniak aus dem Asparagin. Ebenso verhält sich das Kaliumsalz des Glykokolls, ferner Fleischwasser, wobei fraglich bleiben muß, ob hier eine Alkaliabspaltung aus Nährsalzen oder organischen Stickstoffverbindungen stattfindet. Als ein Beispiel gebe ich das Bild einer Ölsäure-Asparaginplatte (Taf. II, Fig. 9).

Wenn man erwägt, daß ähnliche Ernährungsverhältnisse, wie sie in diesen Versuchen geboten wurden, bei der Zerstörung der Fettsäuren in der Natur meist vorhanden sein werden, so dürfte der Durchtritt der Fettsäuren durch die Pilzhaut unter natürlichen Verhältnissen stets in Form von Seifen stattfinden.

Die negativ verlaufenen Ernährungsversuche mit Kalium- und Natriumseifen sprechen dagegen nicht, denn der Pilz kann die Alkalibildung entsprechend regulieren und ist durch andauernde Abspaltung des in den Seifen aufgenommenen Alkali imstande, mit einer geringen Alkalimenge große Mengen Fettsäure in die Zelle zu bringen.

Natürlich wird sich dieser Vorgang, wie ich dieses schon gelegentlich der Ernährungsversuche mit Glycerin in Abschnitt 2 zum Ausdruck brachte, in den Kieselgurkulturen oder anderen krümeligen Medien etwas anders abspielen als in den Agargallerten. Während in diesen, die Lösungen sind, das Alkali tiefer in den Nährboden diffundiert und die oben beschriebenen Zonen erzeugt, in denen Seifenbildung erfolgt, wird sich in krümeligen Nährböden die Alkaliwirkung auf die nächste Nähe der Pilzhypen beschränken und eine Anhäufung von Seifen kaum stattfinden. Man erhält daher auch aus Kieselgurfettsäurekulturen mit Lösung S nach Behandlung des Extraktionsrückstandes mit Salzsäure keine merklichen Extrakte.

Kulturen mit 1 g Fettsäure zeigten folgendes Verhalten:

	Am Schluß des Versuchs extrahiert	Aus dem Rückstand nach Behandlung mit Salzsäure extrahiert
Myristinsäure	0,4325 g	0,0462 g
Erucasäure	0,8133 „	0,0245 „
Palmitinsäure	0,8100 „	0,0237 „

Anders wird die Sache bei Anwesenheit reichliche Mengen Ammoniak liefernder Stoffe liegen; hier kann sehr wohl eine Seifenanhäufung stattfinden. In der Natur (im Boden, in Futtermitteln) dürften die Verhältnisse ähnlich wie in den Kieselgurekulturen mit Lösung S liegen.

Ist die Art der Fettsäureaufnahme in die Pilzzelle unter den beschriebenen Versuchsverhältnissen leicht zu verstehen, so entstehen doch gewisse Schwierigkeiten, wenn man die Ernährungsbedingungen so ändert, daß eine sichtliche Alkaliauscheidung nicht mehr stattfindet. Dies ist der Fall, wenn man an Stelle der Alkalinitrate Ammoniumsalze verwendet. Ebenso wie ich dies im vorigen Abschnitt für die Zersetzung des Glycerins geschildert habe, findet auch in Fettsäurekulturen mit Lösung A infolge geringeren Verbrauches der sauren Ionen eine Säureausscheidung in den Nährboden statt. Trotzdem werden die Fettsäuren zerstört. Aber die Bilder, die man dabei erhält, sind wesentlich andere als die auf den Platten mit Lösung S. Es sei hier wieder ein Versuch als Beispiel für viele geschildert. Das Wachstum des Pilzes war auf allen A-Platten etwas kümmerlicher als auf S-Platten. Die Kolonien waren flacher und mehr auseinander gezogen, die Fruktifikation erheblich geringer.

Versuche mit Lösung A.

Auf Laurinsäureplatten entstand um die Kolonie eine sehr schmale, meist nur mikroskopisch deutlich sichtbare aufgehellte Zone. Unmittelbar am Kolonienrande verschwanden die kleinsten Fettsäurekrystalle, ohne daß ein Abschmelzen oder eine Ausscheidung anderer Krystalle zu sehen war. Eine Berührung dieser Krystalle mit den Pilzfäden fand nicht statt (Tafel I, Fig. 4). Größere Säuretropfen wurden von Mycel dicht umwachsen (Tafel I, Fig. 5) und verschwanden allmählich in diesen Knäueln, die dann in großer Zahl innerhalb der Kolonien zurückblieben (Tafel I, Fig. 6). Ähnliche Bilder erhielt man auf Myristin- und Palmitinsäureplatten. Auf Eruca- und Stearinsäureplatten war von einer Lösung nichts mehr zu sehen, hier trat lediglich die Umwucherung der Krystalldrusen hervor. Auf den Ölsäureplatten wurden die Säuretropfen von Mycel völlig durchwuchert und verschwanden allmählich. (Tafel II, Fig. 8).

Wurden die Platten in der oben beschriebenen Weise mit Lackmustinktur geprüft, so zeigte sich überall um die Kolonien herum ein intensiv roter Hof, der sich mit dem Vorschreiten des Pilzwachstums über die ganze Platte erstreckte.

Wir haben also auch in diesem Falle zweifellos eine extracelluläre Lösung der Säuren vor uns, die aber wesentlich langsamer geht und dem Pilz ersichtlich mehr Mühe macht. Das zeigt das kümmerlichere Wachstum, die Schmalheit der aufgehellten Zone und besonders das Umklammern der Säuretropfen auch bei der Laurinsäure, das auf den Nitratsäureböden häufiger erst bei der Palmitinsäure und am ausgeprägtesten von der Stearinsäure an aufwärts zutage tritt. Ersetzt man das Ammoniumsulfat durch das Nitrat, so entstehen dieselben Bilder. Es wird also, wie dies schon bei den Versuchen über den Abbau des Glycerins festgestellt wurde, von Ammoniumnitrat abweichend von den Alkalinitraten auch bei der Ernährung mit Fettsäuren nicht die Nitrat- sondern die Ammoniumgruppe zur Deckung des Stickstoffbedarfes vorgezogen.

Daß es sich tatsächlich auch auf den Platten mit Lösung A um eine extracelluläre Lösung der Fettsäuren handelt, wird deutlicher, wenn man zu den Versuchen einige Säuren mit niedrigerem Molekulargewicht heranzieht. Von solchen Säuren

kommen besonders Caprin- und Nonylsäure in Betracht. Beide lösen sich in der Nährflüssigkeit in geringem Maße, doch genügen diese Spuren, um auf den Agarplatten die Penicilliumsporen nicht mehr keimen zu lassen. Es gelingt aber, auf Caprinsäureplatten Pilzkolonien zu erzeugen, wenn man eine Mycelflocke überträgt. Bei Verwendung von Lösung S entsteht um die Kolonie eine mit Salzkristallen erfüllte breite aufgehellte Zone; die Krystalle verschwinden mit dem Fortschreiten des Wachstums allmählich. Verwendet man die Lösung A, so lösen sich die Säurekrystalle nur in unmittelbarer Nähe der Kolonie (Tafel II, Fig. 10). Hier sind Abschmelzungserscheinungen an ihnen sehr deutlich zu sehen; vollständig fehlt aber eine Umwucherung auch der größten Tropfen durch Pilzhyphe.

Auf Nonylsäureplatten ist auch Mycel nur dann zu weiterem Wachstum zu bringen, wenn man durch einen Tropfen sehr verdünnter Kalilauge ein kleines neutrales Diffusionsfeld herstellt, von dem der Pilz aus fortwachsen kann. Auf Platten mit Lösung S entsteht eine sehr breite aufgehellte Zone ohne Salzausscheidung; die Säuretropfen lösen sich einfach. Auf Platten mit Lösung A entsteht nur eine sehr schmale aufgehellte Zone. Auch hier findet keine Umklammerung der Tropfen statt; sie lösen sich in der Nährlösung. Caprin- und Nonylsäure verhalten sich in dieser Beziehung auf Platten mit Lösung A zu den Säuren von C_{12} an, wie die Laurinsäure auf Platten mit Lösung S zu den Säuren von C_{16} an. Nimmt man hinzu, daß die Lösung auf den Laurinsäureplatten mit der Feinheit der Verteilung der Fettsäure wächst und im Idealfalle vollständig sein wird, so ist der Schluß zulässig, daß auch in den A-Kulturen die Umklammerung der Säurekrystalle ebenso zu bewerten ist, wie in den S-Kulturen, und daß auch unter diesen Umständen die Fettsäuren in gelöster Form durch die Zellhaut treten. Freilich ist dieser Lösungsvorgang schwerer zu verstehen. Die Fettsäuren müssen, da die Reaktion der Umgebung gegen Lackmus deutlich sauer reagiert, als solche oder als irgendwelche Spaltungsprodukte gelöst werden. Die saure Reaktion in der Umgebung der Pilzkolonie entsteht durch Ausscheidung der nicht in den Stoffwechsel gezogenen anorganischen Säuren, die Nährlösung muß also in dieser Region Phosphorsäure und Schwefelsäure, sowie neben dem schon vorhandenen sauren Phosphat vielleicht auch saure Sulfate enthalten. Eine Spaltung der sehr festen Kohlenstoffkette außerhalb der Pilzzelle ist unter den vorliegenden Versuchsbedingungen ausgeschlossen. Es muß also in der sauren Lösung um die Kolonie herum die Caprinsäure leichter löslich sein als in der angewendeten Lösung A und in Wasser; daran ist nach den Vorgängen in der Agarplatte kein Zweifel. Man kann sich den Vorgang auch so denken, daß die Lösung lediglich die Folge des Verbrauches der gelösten Caprinsäure durch den Pilz ist. Titrimetrisch ist mir der Nachweis einer irgendwie erheblicheren Löslichkeit der Caprinsäure in Lösung A und in derselben nach Zusatz von 50 bzw. 100 mg Schwefelsäure auf 100 ccm nicht gelungen; die Unterschiede lagen innerhalb der Fehlergrenze. Wenn man aber berücksichtigt, daß an sich die Caprinsäure zweifellos löslich ist und daß es sich in den Kulturen nur um mikroskopisch nachweisbare Lösungsvorgänge handelt, so liegen hier für die Deutung Schwierigkeiten kaum vor. Aber auch für die Säuren von C_{12} an, die im Wasser als unlöslich gelten, wird die Sache leichter verständlich, wenn man die äußerst geringen Dimensionen der in Lösung gehenden Krystalle in Betracht zieht. Die größte Ausdehnung der sich glatt d. h. ohne Berührung mit den Pilzhyphe lösenden Laurinsäurekrystalle, die ich in meinen Platten beobachtete, betrug 0,0117 mm, ihre Dicke war nur $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ davon. Zieht man nun weiter in Betracht, daß die Lösung selbst dieser kleinen Krystalle auf den Platten

nur langsam erfolgt und, nach dem kümmerlicheren Wachstum zu schließen, dem Pilze anscheinend große Mühe macht, so wird es verständlich, daß es sich hier um Lösungsvorgänge handelt, die makrochemisch kaum oder nur sehr schwer nachzuweisen sein werden.

Einige Beobachtungen an A-Platten, denen noch ammoniakabspaltende Stoffe (Pepton, Glykokoll) zugesetzt waren, gestatten vielleicht den Schluß, daß unter diesen Umständen die Aufnahme der Fettsäuren trotz schwach saurer Reaktion des Nährbodens in Form der Seifen erfolgt. Man kann nämlich das Verhältnis von Ammoniumsulfat und Ammoniakabspalter so herstellen, daß auf Laurinsäureplatten in den ersten Stadien des Versuches auch in einer schwach sauren Zone am Rande der Pilzkolonie Krystalle von Seifen entstehen und wieder gelöst werden. Später überwiegt dann die alkalische Reaktion. Für die Platten mit reiner A-Lösung, die eine stark saure Reaktion zeigen, ist aber eine etwaige intermediäre Seifenbildung nicht möglich.

Das Endergebnis meiner Untersuchungen über den Durchtritt der Fettsäuren von C_9 an durch die Pilzmembran ist also, daß er stets in Form von Lösungen und zwar entweder als solche von Säuren oder von Seifen erfolgt. Auch für die im Wasser leichtlöslichen Fettsäuren gilt dieser Satz vermutlich, denn die in Abschnitt 1 schon erwähnten Versuche haben ergeben, daß auch hier bei Verwendung der Lösung S die Alkalität, bei Verwendung der Lösung A die Acidität steigt, so daß die Acidität der Nährlösung zum Schluß des Versuches erheblich geringer bzw. höher ist als die der unveränderten Lösungen S und A.

Ich wende mich nun zum Durchtritt der Glyceride durch die Pilzmembran. Der Schmidt'schen Anschauung, daß dieser Durchtritt in Form von Emulsionen der Glyceride mit geringen Seifenmengen stattfindet, steht außer den Einwendungen, die Czapek (s. o.) erhoben hat, auch die Tatsache entgegen, daß der größere Teil des Fettes in Pilzkulturen schon in den Anfangsstadien der Ernährungsversuche in Säure und Glycerin gespalten wird. Ich gebe darüber hier einige Zahlen, die sich leicht vermehren ließen.

	Baumwolle- saatöl				Rüböl I		Rüböl II				Erdnußöl			
	Kon- trolle	Verschimmelter Öl			Kon- trolle	Ver- schim- melt	Kon- trolle	Verschimmelter Öl			Kon- trolle	Verschimmelter Öl		
		I	II	III				I	II	III		I	II	III
Verlust durch das Verschimmeln(%)	—	2,9	37,5	65,5	—	48,0	—	18,9	29,8	38,0	—	9,4	38,8	51,7
Neutralisations- zahl	6,3	59,5	119,7	102,0	2,0	155,7	19,0	126,6	126,6	135,3	14,9	108,1	144,5	135,8
Verseifungszahl	199,8	191,0	195,3	188,9	170,0	168,4	172,4	172,6	168,3	163,5	183,4	176,1	181,4	180,9

Auch ist wiederum schwer zu verstehen, wie feste, schwerlösliche Fette wie Talg und Stearin emulgiert werden sollen.

In einer kurzen Mitteilung ist auch Eykman¹⁾ der Frage der Aufnahme der Fette näher getreten. Eykman hat ein Verfahren des Lipasennachweises an-

¹⁾ Zentralbl. Bakteriöl., I. Abt. 1901, 29, 847.

gegeben, bei dem auf dem Boden einer Petri-Schale eine dünne Schicht Rindertalg ausgegossen und auf diese nach dem Erstarren Agar gegossen wird. Unter Pilzkolonien, die Lipase ausscheiden, nimmt das Fett nach einigen Tagen eine feuchte, brüchige Konsistenz an und wird undurchsichtig und weiß. Die Veränderung soll, wie Eykmann kurz angibt, auf einer Verseifung beruhen, bei der zuerst Calcium-, dann Natrium- und schließlich Ammoniumseife entsteht. Eine Verseifung durch von den Pilzen erzeugtes Alkali allein glaubt Eykmann ausschließen zu dürfen, da er Kolonien beobachtete, unter denen trotz Erzeugung von Alkali keine Verseifung eintrat, andererseits solche, die den Nährboden sauer machten und trotzdem das Fett in Calcium- und Ammoniumseife verwandelten. Er schließt daraus auf die Ausscheidung einer Lipase. Woraus Eykmann folgert, daß die Veränderung der Fette auf Verseifung zurückzuführen sei, ist aus der nur anderthalb Seiten langen Mitteilung nicht zu ersehen.

Ich habe die Veränderung der Fette und ihre Aufnahme in die Pilzzelle wie die der Fettsäuren auf Agarplatten verfolgt und gebe zunächst einen Auszug aus den Protokollen der Versuche mit Lösung A, da bei diesen die Erscheinungen am klarsten und leichtesten zu deuten sind.

Tributyrin. Um die üppig entwickelte Pilzkolonie herum entstand eine helle Zone, in der die Butyrintropfen verschwunden waren (Tafel II, Fig. 11). Am Rande dieser Zone sah man, wie die größeren Tropfen allmählich abschmolzen, während die kleineren ohne weiteres verschwanden. Eine Berührung der Butyrintropfen durch die Pilzfäden vor dem Verschwinden fand nicht statt, auch Mycelknäuel fehlten ganz. Die Reaktion der Platte um die Kolonie herum war stark sauer.

Erdnuß- und Rüböl. Die Öltropfen in der nächsten Umgebung der Kolonie wurden undurchsichtig, verloren oft die kreisrunde Gestalt, bekamen ein strahliges Gefüge; am Rande sah man zuweilen sehr feine spitze Nadeln (Tafel III, Fig. 13). Bei starker Vergrößerung (etwa 150-fach) konnte man in den größeren Tropfen erkennen, daß die Trübung durch Ausscheidung feinsten Krystallnadeln entstand (Tafel III, Fig. 14). Öfter fand man Tropfen, die die ersten Anfänge der Krystallausscheidung vom Rande her sehr schön zeigten (Tafel III, Fig. 15). Die Tropfen wurden dann vom Mycel völlig umwuchert und verschwanden allmählich unter Hinterlassung der Mycelknäuel, wie dies bei den Fettsäuren schon geschildert wurde. Zuweilen trat bei größeren Tropfen die Krystallausscheidung auch erst bei der Berührung durch die Pilzfäden ein. Ähnliche Bilder, nur nicht immer gleich klar, erhielt man beim Baumwollsaatöl. Wenig geeignet für das Studium erwiesen sich die festen Fette (Butter, Cocosfett, Talg). Hier sah man nur eine Umklammerung der Krystalldrusen, während die feineren Vorgänge verborgen blieben. Bei den Glyceriden der flüssigen Fettsäuren (Triolein, Mandelöl) war außer der Durchwucherung der Fettropfen ebenfalls nichts weiter zu sehen. Die Reaktion in der Nähe der Pilzkolonie war wie immer auf den A-Platten stark sauer. Es fand also in der Nähe der Hyphenenden, aber ohne daß — abgesehen von sehr großen Fettropfen — eine Berührung durch diese stattfände, in einem sauren Medium in den Tropfen der flüssigen Fette, die Glyceride fester Fettsäuren enthalten, zweifellos ein Auskrystallisieren fester Stoffe statt, die den Tropfen schließlich in eine Krystalldruse verwandelten; beim Tributyrin, dessen Komponenten in Wasser löslich sind, verschwanden die Tropfen ganz. Diese Erscheinungen können in saurer Lösung nur durch die Wirksamkeit eines fettspaltenden Sekretes der Pilzzellen ge-

deutet werden, und in den oben beschriebenen Erscheinungen tritt also die Wirkung einer Lipase zutage, die aus der Zelle heraustritt und außerhalb eine Spaltung der Glyceride bewirkt. Mit dieser Deutung des mikroskopischen Bildes harmoniert die starke Fettspaltung, die man in Massenkulturen schon im Beginn des Pilzwachstums beobachtet.

Weniger klar ist das Bild auf S-Agarplatten. Ich gebe wieder einen Protokollauszug.

Tributyrin. Um die Pilzkolonie herum entstand wie auf den A-Platten eine aufgehellte tropfenfreie Zone, nur war sie erheblich breiter als auf letzteren und ihre Reaktion alkalisch.

Erdnußöl. Um die Pilzkolonie herum entstand ein in besonders günstigen Fällen etwa $\frac{1}{2}$ cm breiter, makroskopisch sichtbarer, meist aber erst im Mikroskop bemerkbarer Hof von weißlichen Pünktchen, die bei schwacher Vergrößerung als Konglomerate von kleinen Krystalltafeln sich erwiesen. Am äußeren Rande dieser Zone sah man Öltropfen, die ihre Kugelgestalt zu verlieren begannen, indem am Rande eine Ausscheidung von Krystallen eintrat, sehr oft in Gestalt rundlicher Drusen, die dem noch kugelrunden Tropfen anklebten (Taf. III, Fig. 16, 17, 18). Im weiteren Stadium waren die Tropfen stark gekörnt, undurchsichtig und gingen langsam in die weißlichen Krystalldrusen über. Diese Erscheinungen spielten sich mehr oder minder von den äußersten Spitzen der Pilzfäden entfernt, jedenfalls ohne deren Berührung ab. Innerhalb der Kolonie waren die Drusen von Mycelfäden umspunnen. Die Reaktion des Agars war bis über die weiße Zone hinaus stark alkalisch gegen Lackmus.

Genau dieselben Erscheinungen boten Platten mit Baumwollsaatöl und Rüßöl. Etwas anders waren sie bei Verwendung von reinem Triolein. Auch hier entstand eine mit freiem Auge sichtbare weißpunktige, aber etwas schmalere Zone um die Pilzkolonie herum. Bei etwa 150-facher Vergrößerung sah man, daß an ihrem äußeren Rande in den Tropfen, ohne daß zunächst ihre Gestalt sich änderte, eine feine Granulation auftrat, und daß auch eine aus solchen Granulis bestehende schmale Aureole den Tropfen umgab, sodaß er bei gewisser Einstellung ein radiärstrahliges Gefüge vortäuschte. Im späteren Stadium verwandelte sich der Öltropfen in eine undurchsichtige Krystalldruse von unregelmäßiger Gestalt, die dann von Pilzhypen umspunnen wurde. Tropfen von Butterfett zeigten am Rande große Krystalltafeln und lösten sich zum Teil ganz in solche auf, die dann wiederum häufig ganz in der Nährlösung sich lösten oder — seltener — von Hypen umschlossen wurden (Taf. II, Fig. 12). Eine bei den Glyceriden der höheren Fettsäuren stets zu beobachtende Erscheinung waren die von den Krystalldrusen radiär auslaufenden strahligen Brechungserscheinungen im Agar, wohl durch Spannungsänderungen infolge der Veränderung der Tropfenform hervorgebracht.

Ähnliche Erscheinungen wie bei Natriumnitrat erhält man bei Verwendung von Kaliumnitrat, Asparagin und Fleischwasser auf Erdnußölplatten. Bei Kaliumnitrat und Asparagin wurden in späteren Stadien am Rande der Drusen auch größere Krystalltafeln wie auf Platten mit freien Säuren beobachtet. Auf Fleischwasserplatten trat besonders schön der Unterschied zwischen zunächst in den Öltropfen entstehenden langen spitzen Krystallnadeln und den später am Rande und auch frei im Agar erscheinenden kürzeren breiteren Tafeln hervor.

Die Erscheinungen lassen sich am einfachsten wohl so deuten, daß die Krystalldrusen solche von Alkaliseifen sind, da sie innerhalb einer alkalischen Flüssigkeit entstehen und von den aus teilweise gespaltenen Glyceriden der verwendeten Öle sich ausscheidenden Fettsäurekrystallen der Form nach verschieden sind. Die Frage bleibt nun, ob bei dieser Verseifung lediglich das Alkali wirkt oder eine Spaltung durch eine Lipase vorangeht. An dem mikroskopischen Bild läßt sich dies nicht mit Sicherheit entscheiden, da die Seifenkrystalle die der Säuren verdecken werden. Dagegen spricht das Verhalten der Fette in Kieselgurkulturen mit alkaliliefernden Nährlösungen deutlich für die Wirkung der Lipase. Die von *Penicillium* zersetzten Fette bestehen, wie ich dies vorhin zeigte, schon in den Anfangsstadien des Versuches zum größten Teil aus freien Fettsäuren, während Seifen in nachweisbarer Form fehlen. Diese Erscheinung zeigt auch, daß die Lipase schneller und reichlicher ausgeschieden werden muß als das Alkali.

Welche Schlüsse lassen sich nun für die Art des Durchtrittes der Glyceride durch die Pilzmembran ziehen? Nachdem eine extracelluläre Spaltung der Glyceride in Glycerin und Fettsäuren mikroskopisch und in den Massenkulturen nachgewiesen ist, liegt es nahe, anzunehmen, daß auch der Eintritt der Glyceride je nach dem Medium entweder in Form der freien Säuren oder ihrer Seifen geschehen wird. Für das Tributyrin, ferner für die Glyceride der Butter läßt das mikroskopische Bild diesen Schluß ohne weiteres zu. Bei den anderen Fetten gibt es dagegen keinen sicheren Aufschluß darüber, ob die Spaltung bezw. Verseifung der Glyceride eine vollständige ist oder ob nicht geringe Mengen ungespalten bleiben und etwa noch in Form von Emulsionen mit Säuren oder Seifen durch die Zellhaut wandern. Auch die Massenkulturen geben in diesem Punkt kein ganz eindeutiges Bild, denn Reste von Glyceriden finden sich auch noch in stark zersetzten Fetten, wobei allerdings vielleicht rein mechanische Hindernisse, besonders zu wenig feine Verteilung und dadurch Absperrung der Lipasen von dem inneren Teil der Fetttropfen, zumal wenn sie festerer Konsistenz sind, mitwirken mögen. Immerhin aber umfaßt die Spaltung, wie die oben angeführten Zahlen zeigen, schon zum Beginn des Schimmelns den bei weitem größeren Teil des Fettes und das spricht in Verbindung mit den Erscheinungen bei den Glyceriden der Säuren mit geringerem Molekulargewicht dafür, daß die Aufnahme der Fette in die Pilzzelle nur in Form der Fettsäuren oder deren Seifen stattfindet.

Es bleibt nun noch übrig, die Frage zu erörtern, in welcher Form die durch die Pilzmembran diffundierten Seifen und Säuren in das Plasma und damit in den Stoffwechsel eintreten. Mikroskopisch hat sich darüber nichts weiter feststellen lassen, als daß in Laurin- und Ölsäurekulturen besonders in den Randteilen der Kolonien in den Pilzfäden größere Fetttropfen erscheinen, während die Fäden im Innern der Kolonie leer sind. Daraus darf man vielleicht schließen, daß die in Form von Seifen in die Zelle tretenden Säuren wieder als solche in den Stoffumsatz gesogen werden.

Figurenerklärung.

Die Bilder sind unretuschierte Aufnahmen mit Zeiß-Achromat A, B und D, -Okul. 2. — No. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 sind etwa 50-fach, No. 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16 etwa 50-fach, No. 15, 17, 18 etwa 150-fach vergrößert. Die feineren Strukturen sind durch den Raster leider zum Teil verwischt.

Tafel I.

Fig. 1. Laurinsäure-Platte.

Fig. 2. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Laurinsäure-S-Platte. Am unteren Rande die feinen Säurekrystalle und dickeren Krystalldrusen unverändert. Darüber die aufgehellte Zone mit Seifenkrystallen.

Fig. 3. Inneres einer *Penicillium*-Kolonie auf Laurinsäure-S-Platte. Laurinsäure völlig verschwunden; keine Mycelknäuel.

Fig. 4. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Laurinsäure-A-Platte. Die feinen Säurekrystalle sind in einer schmalen Zone gelöst.

Fig. 5. Inneres einer *Penicillium*-Kolonie auf Laurinsäure-A-Platte. Die feinen Säurekrystalle sind gelöst, die dickeren Drusen von Mycel dicht umspinnen.

Fig. 6. Wie Fig. 5, aber späteres Stadium. Die dickeren Säureklumpen sind zum Teil gelöst und an ihrer Stelle sind die Mycelknäuel zurückgeblieben.

Tafel II.

Fig. 7. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Ölsäure-S-Platte. Verschiedene Stadien der Umwandlung der Sauretropfen in Oleatdrusen, die dann umspinnen werden.

Fig. 8. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Ölsäure-A-Platte. Die unveränderten Tropfen sind von Mycel völlig durchwuchert.

Fig. 9. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Ölsäure-Asparagin-Platte. Die Säuretropfen sind vollständig in Oleatdrusen umgewandelt.

Fig. 10. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Caprinsäure-A-Platte. Aufgehellte Zone durch Lösung der Säurekrystalldrusen.

Fig. 11. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Tributyrin-A-Platte. Aufgehellte Zone durch Lösung der Glyceridtropfen.

Fig. 12. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Butterfett-S-Platte. Die Kolonie liegt links oben außerhalb des Bildes. Völlige Auflösung der Fettklumpen unter teilweiser Salzausscheidung.

Tafel III.

Fig. 13. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Rübol-A-Platte. In den dunkel gefärbten, zum Teil deformierten Tröpfchen ist die Ausscheidung der festen Säuren eingetreten.

Fig. 14. Wie Fig. 13, aber stark vergrößert. Die Tropfen sind ganz in Säurekrystalldrusen verwandelt. In dem noch kreisrunden Tropfen rechts oben beginnt soeben die Krystallisation der Fettsäuren. Am oberen Rand ein Pilzfaden.

Fig. 15. Wie Fig. 14, sehr stark vergrößert. Ein Öltropfen, in dem die festen Fettsäuren auszukrystallisieren beginnen.

Fig. 16. Randzone einer *Penicillium*-Kolonie auf Erdnußöl-S-Platte. An der Oberfläche der Öltropfen entstehen Krystalldrusen, vermutlich von Seifen.

Fig. 17 u. 18. Dasselbe wie Fig. 16, nur stark vergrößert. Die Pilzkolonie liegt auf beiden Bildern am unteren Rande.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18