	β G.C.	T	p	$w(p)$	s	$w(s)$	n	θ	U		β G.C.	T	p	$w(p)$	s	$w(s)$	n	θ	U
		1910+		0°01		0°001			1911.			1910+		0°01		0°001			1911.
$\Sigma 200$	1056	0.969	124°6	74	8°10	38	2	0h1	041	$\Sigma 1223$	4601	1.093	214°4	49	4°94	42	4	9h2	115
$\Sigma 214$	1105	1.085	187.4	—	5.29	—	1	5.0	093	$\Sigma 1281$	4782	1.074	318.4	18	36.70	79	4	7.3	101
$\Sigma 215$	1108	1.085	58.9	—	19.50	—	1	5.3	093	$\Sigma 1283$	4800	1.074	124.2	20	16.40	39	4	7.4	101
$\Sigma 218$	1115	0.969	251.2	70	4.77	59	3	0.6	041	$\Sigma 1285$	4818	1.074	339.2	8	26.27	12	3	8.2	099
$\Sigma 232$	1159	0.991	245.7	19	6.64	39	5	4.7	041	$\Sigma 1311$	4929	1.077	200.6	25	7.36	82	5	7.0	107
$\Sigma 239$	1183	0.991	209.7	27	14.01	56	5	4.9	041	$\Sigma 1317$	4945	1.093	61.6	13	7.63	79	3	10.0	116
$\Sigma 240$	1184	0.991	49.6	14	4.92	88	4	5.1	052	$\Sigma 1747$	6495	1.079	345.1	5	14.94	44	2	8.2	110
$\Sigma 244$	1189	0.991	289.0	10	4.52	93	2	5.4	052	$\Sigma 1758$	6527	1.079	305.1	41	4.02	40	3	8.6	110
$\Sigma 394$	1716	0.991	161.0	31	6.82	47	4	5.6	052	$\Sigma 1829$	6797	1.079	150.1	20	5.32	56	4	8.9	110
$\Sigma 394$	1716	0.991	162.2	43	6.71	19	4	5.8	052	$\Sigma 1839$	6841	1.079	80.6	35	14.41	65	3	9.0	110
$\Sigma 401$	1733	0.991	269.4	50	11.30	58	3	5.9	052	A.G. 74	1896	1.077	196.4	37	11.81	77	2	3.3	118
$\Sigma 458$	1895	1.077	199.2	0	5.06	117	2	2.8	118	A.G. 75	1958	0.969	13.7	17	6.28	17	2	3.8	047
$\Sigma 479$	1985	1.077	127.7	17	7.44	28	4	4.1	118	A.G. 78	2055	1.033	198.6	22	17.81	61	3	4.0	049
$\Sigma 494$	2051	1.033	187.2	44	5.18	39	3	3.7	049	A.G. 91	2555	1.104	216.5	3	11.18	154	3	3.6	123
$\Sigma 494$	2051	1.033	186.6	33	5.16	73	4	3.9	049	A.G. 114	3398	1.033	360.1	54	5.21	146	3	5.0	033
$\Sigma 515$	2082	1.096	44.1	40	3.42	40	2	5.5	110	A.G. 117	3517	1.041	117.7	71	8.86	48	4	5.0	074
$\Sigma 523$	2126	1.033	163.2	19	9.95	58	3	4.5	049	A.G. 147	4428	1.041	140.1	—	10.75	—	1	6.5	071
$\Sigma 533$	2160	1.093	61.5	16	19.61	63	4	9.0	112	A.G. 156	4802	1.074	251.2	21	10.63	48	4	7.8	099
$\Sigma 851$	3174	1.104	29.3	113	2.79	68	2	4.9	123	h 122	4980	1.093	270.4	10	9.48	100	3	11.0	115
$\Sigma 853$	3183	1.093	355.2	3	29.40	37	4	8.6	112	h 378	3153	1.104	77.3	55	12.75	49	2	4.3	123
$\Sigma 855$	3185	1.104	113.8	0	29.28	25	2	5.0	104	h 380	3168	1.104	202.3	32	19.22	116	3	4.7	123
$\Sigma 871$	3214	1.025	306.5	24	7.37	55	6	6.5	047	h 381	3221	1.104	291.6	—	13.36	—	1	6.7	123
$\Sigma 877$	3242	1.104	262.1	23	5.55	63	2	6.9	123	h 2301	3219	1.104	351.5	—	9.95	—	1	6.2	104
$\Sigma 929$	3457	1.041	24.7	47	6.16	41	4	4.5	074	h 3253	1912	0.969	72.6	16	31.90	128	3	2.4	047
$\Sigma 940$	3480	1.041	293.8	53	10.13	59	3	4.6	074	h 5459	1988	1.077	259.5	—	13.03	—	1	4.3	118
$\Sigma 943$	3495	1.041	143.5	14	21.90	70	3	4.8	074	$\beta 85$	1943	0.969	216.7	111	4.29	97	3	3.5	047
$\Sigma 959$	3586	1.041	175.4	—	11.79	—	1	6.0	077	$\beta 86$	2100	1.033	50.7	31	4.35	21	3	4.3	049
$\Sigma 1103$	4100	1.074	247.3	30	4.35	45	3	10.4	101	Glas. 1	1588	1.033	88.7	107	3.82	73	2	3.5	049
$\Sigma 1106$	4104	1.074	34.8	16	10.46	24	2	10.2	101	Weiß 12	3417	1.033	64.8	21	8.71	157	4	5.4	047
$\Sigma 1108$	4109	1.074	178.5	47	11.35	6	3	10.6	101	Kü 27	3556	1.041	185.3	35	6.77	56	3	5.8	077
$\Sigma 1124$	4196	1.077	326.0	20	19.25	17	4	5.6	077	Ho 523	4204	1.077	325.6	—	8.87	—	4	6.1	104
$\Sigma 1140$	4261	1.077	274.9	15	6.22	28	3	6.6	107	Schj 12	4937	1.077	262.0	—	6.65	—	1	7.1	104
$\Sigma 1188$	4451	1.041	201.2	11	16.09	43	4	6.7	071	Schj 12	4937	1.093	262.3	56	6.64	87	2	9.6	115

Trepow bei Berlin, 1911 September.

H. E. Lau.

Antwort auf Herrn J. Bachs Bemerkungen zu meiner Osterformel. Von J. Hartmann.

In A. N. 4517 sucht Herr J. Bach gegen meine Osterformel (A. N. 4473) einige Einwände zu erheben, auf die ich hier, trotzdem ihre Haltlosigkeit leicht einleuchtet, mit wenigen Worten eingehen möchte, nur um dem Vorwurfe *qui tacet consentire videtur* zu entgehen.

In meinem Aufsätze habe ich darauf hingewiesen, eine wie große Anzahl von Osterformeln existiert, jedoch lag es mir durchaus fern, diese alle einzeln aufzuführen und zu besprechen. Auch die zwölf sonst zum Teil recht brauchbaren Bachschen Formeln werden, glaube ich, von der meinigen an Einfachheit übertroffen. Wenn Herr Bach in der Fußnote S. 77 sagt, daß er im Jahre 1907 eine der meinigen ähnliche Formel aufgestellt aber nicht veröffentlicht habe, so kommt das hier natürlich nicht in Betracht; überdies war es eben nicht genau meine Formel. Übrigens ist Bachs Abhandlung¹⁾ sowohl wegen der umfassenden historischen Notizen als auch

wegen der leicht verständlichen Ableitung zahlreicher Formeln recht lesenswert.

Um die Überlegenheit meiner Formel in Frage zu stellen behauptet Bach zunächst, es sei ein Irrtum von mir, daß meine Formeln eine Division weniger hätten als die Gaußschen, ja, ich hätte »noch eine Operation mehr als Gauß«. Jeder praktische Kopfrechner soll nämlich die Division $(\mathcal{F} + q + c - D) : 7$ so ausführen, daß er die Divisionen $\mathcal{F} : 7$, $q : 7$ u.s.w. einzeln erledigt, und daher »scheine ihm, wenigstens für das schriftliche Rechnen, die Gaußsche Formel bequemer als die Hartmanns«.

Hier muß man wohl zunächst annehmen, daß Bach einen Schreibfehler begangen hat; er wollte wohl sagen, daß er für das Kopfrechnen die Gaußsche Formel für bequemer halte; anders geben seine Worte überhaupt keinen Sinn. Aber selbst dies zugegeben ist die Behauptung, daß meine

¹⁾ Dr. J. Bach: Die Osterfest-Berechnung in alter und neuer Zeit. Freiburg 1907.

Formeln eine Operation mehr erforderten als die *Gaußschen* unzutreffend. Um das einzusehen braucht man nur alle Rechenoperationen abzuzählen, die ein Kopfrechner, wenn er in der von *Bach* gewünschten Art arbeitet, nach den beiden Formelsystemen auszuführen hat. Man erhält folgende Liste:

Nach *Gauß'* Formeln:

1) Division $\mathcal{F} : 19$	4) Multiplikation $2 \times b$
2) » $\mathcal{F} : 4$	5) » $4 \times c$
3) » $\mathcal{F} : 7$	6) » $6 \times d$

Die Division $2b : 7$ ist nicht zu zählen, da $2b < 7$ ist.

7) Division $4c : 7$	10) Addition der vier letztgenannten Divisionswerte
8) » $6d : 7$	11) Division dieser Summe durch 7; der Rest ist e .
9) » $N : 7$	

Nach meinen Formeln:

1) Division $\mathcal{F} : 19$	6) Division $D : 7$
2) » $\mathcal{F} : 4$	7) Addition der vier letztgenannten Divisionswerte
3) » $\mathcal{F} : 7$	8) Division dieser Summe durch 7; der Rest bleibt d .
4) » $q : 7$	
5) » $c : 7$	

Also nicht eine Operation mehr, wie *Bach* meint, sondern drei Operationen weniger erfordert dieser Teil meiner Formeln. Dazu kommt dann noch die Erleichterung durch Einführung von 11a statt des *Gaußschen* 19a. Die Multiplikation einer Zahl mit 11 ist, wenn man sie in der Weise ausführt, daß man zwischen die erste und letzte Ziffer des Multiplikandus der Reihe nach die Summen je zweier benachbarter Ziffern setzt, also z. B. um 11×136 zu erhalten schreibt:

$$1 \quad (1 + 3) \quad (3 + 6) \quad 6 = 1496$$

gewiß eine leichtere Operation als die Multiplikation mit 19, selbst wenn man $20 - 1$ für 19 setzt. Endlich ist doch auch der erheblich einfachere Bau meiner Formeln zu beachten, der es erleichtert sie im Gedächtnis zu behalten.

Das einzige, was man gegen meine Formeln einwenden könnte, was aber *Bach* nicht hervorhebt, ist, daß es für den Kopfrechner etwas unbequemer sein mag, sich den meistens dreistelligen Quotienten $q = (\mathcal{F} : 4)_q$ zu merken, als den einstelligen Rest $b = (\mathcal{F} : 4)_r$, und daß die Division der dreistelligen q durch 7, wenn man nach *Bachs* Art rechnet, etwas schwerer ist als die Division der zweistelligen Zahlen $4c$ und $6d$. Aber das ist ja kaum erwähnenswert und wird durch das Wegfallen von drei Rechenoperationen und die anderen Vereinfachungen reichlich kompensiert.

Rechnet man, wie es meistens der Fall sein wird, schriftlich, so verlieren *Bachs* Bemerkungen überhaupt ihre

Geltung und jedes durchgerechnete Beispiel wird die Überlegenheit meiner Formel zeigen.

Weiterhin gibt dann *Bach* einen ausführlichen Beweis für die Richtigkeit meiner Formeln, wogegen ich nichts einzuwenden habe, wohl aber gegen die Begründung durch angebliche Lücken in meinem Beweise. Der Begriff der Lücke ist hier ganz subjektiv. Ein Beweis ist um so besser, je kürzer er ist, und für die Leser der A. N. war das von mir Gesagte ausreichend, wie mir verschiedene Zuschriften gezeigt haben, die gerade die Eleganz meines Beweises betonten. Eine etwas ausführlichere Darstellung, namentlich der astronomischen Grundlagen der Osterzyklen habe ich in der Festschrift zur 350jährigen Jubelfeier des Erfurter Gymnasiums *Humanistisches Gymnasium und modernes Kulturleben (Erfurt 1911)* gegeben.

Zum Schlusse behauptet Herr *Bach* in bezug auf die beiden »Ausnahmefälle« der Osterrechnung, die ich in meinen Formeln derartig berücksichtigt habe, daß man sie kaum als Ausnahmen empfinden und nicht übersehen kann: »Jedenfalls ist das von uns angenommene *Gaußsche* Verfahren viel einfacher und weniger irreführend, da wir das aus der Theorie sich ergebende Ostervollmonddatum 19. oder 18. April nur in den seltenen Fällen, wo es unbedingt nötig ist, ändern, während nach *Hartmann* die Änderung auch dort erfolgt, wo sie überflüssig ist«. Dazu muß ich bemerken, daß es von hundert Benutzern der Osterformel kaum einen interessieren wird, was aus irgend einer »Theorie« folgt, sondern es kommt ihnen nur darauf an, den Ostertermin unzweifelhaft richtig zu erhalten. Die von *Gauß* und auch von *Bach* aufgestellten Formeln geben nun aber in manchen Fällen ein fehlerhaftes Osterdatum. Ergeben sie als Ostersonntag den 26. April, so findet Ostern in Wirklichkeit am 19. April statt, das berechnete Datum ist also um 7 zu verkleinern; ergeben diese Formeln den 25. April, so ist in einigen Fällen Ostern wirklich am 25. April, in anderen Fällen aber am 18. April. In jedem einzelnen Falle, wo sich der 25. April ergibt, muß man in der vorhergegangenen Rechnung nachsehen, ob $d = 28$ und $a > 10$ ist; war dies der Fall, so muß statt des 25. der 18. April gesetzt werden, während in allen anderen Fällen der 25. April der richtige Ostertermin ist. Rechnet man im Kopfe, so wird man am Schlusse der Rechnung die Werte von a und d häufig schon vergessen haben, so daß man sie dann nochmals berechnen muß. Gerade bei den *Gauß-Bachschen* Formeln muß man daher in vielen Fällen — wenn dann der 25. unverändert bleibt — ganz unnütze Operationen vornehmen, während bei meiner Methode die gleichsam als Warnungstafel an *M* angebrachten ** darauf aufmerksam machen, daß ohne Ausnahme statt $c = 29$ und 28 die Werte 28 und 27 zu setzen sind, worauf man dann immer sofort den richtigen Ostertag erhält.

J. Hartmann.

Beobachtungen des Zodiakallichtes am 23. Januar 1911. Von C. Hoffmeister.

Durch die »Mitteilungen d. V. A. P.« Heft 6 erhalte ich Kenntnis von den merkwürdigen Beobachtungen des Zodiakallichtes durch Herrn J. Sedláček (A. N. 4520) vom 20. und 23. Januar d. J. Ich habe nun an letzterem Tage

auch beobachtet, ohne jedoch irgendwelche Schwankungen feststellen zu können. Die Beobachtung fand statt bei Sonneberg S. M. ($\lambda = 11^\circ 11'$ östl. Greenw., $\varphi = +50^\circ 22'$) und zwar auf einem Berge in der Nähe der Stadt. In meinen