13.08.2021

ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; DOI: 10.36962/ALISJMSC

© SOUTHERN CAUCASUS SCIENTIFIC JOURNALS

AMBIANCE IN LIFE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN MEDICINE

JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE
REFEREED & REVIEWED JOURNAL

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS
PKP
PUBLIC
KNOWLEDGE
PROJECT

<https://scia.website/index.php/AILISJMSC>

The beautiful thing about learning is nobody can take it away from you—B. B. King

13.08.2021 ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; DOI: 10.36962/ALISJMSC

© SOUTHERN CAUCASUS SCIENTIFIC JOURNALS

AMBIANCE

IN LIFE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN MEDICINE

JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE

REFEREED & REVIEWED JOURNAL

GEORGIA, TBILISI 2021

Editors-in-chief:

Managing Director and Editor-in-chief: Tamar Didbaridze.(Georgia)

Editor-in-chief: Melis Gönülal (Turkey)

Editor: Eter Buknikashvili (Georgia)

OFFICIAL REPRESENTATIVE-COORDINATOR

Namig Isazade (EU, Azerbaijan)

+ 994 552 41 70 12

ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; DOI PREFIX: 10.36962 / ALISJMSC

© **Publisher:** Society of Azerbaijanis living in Georgia. NGO. (Georgia, Tbilisi)

Deputy of director of organization: Seyfulla Isayev.

©**Editorial office:** Tbilisi, Georgia, 0163.

©**Typography:** NGO Representation of Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia. SC Journals.

Registered address: Marneuli municipality, v. Takalo, Georgia, 0165.

Telephones: +994 55 241 70 12; +994 51 864 88 94

Website: <https://scia.website/>

E-mail: sc.mediagroup2017@gmail.com

© **Publisher:** LTD The Southern Caucasus International Academy of Modern Sciences. (UK, London).

Director and shareholder: Namig Isazade. Professor. PhD in Business Administration.

© **Editorial office:** 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

©**Typography:** LTD International Research, Education & Training Center. (UK, London).

Registered address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

Telephones: +994 55 241 70 12; +994 51 864 88 94

Website: <https://scia.website/>

E-mail: sc.mediagroup2017@gmail.com

Accepted for publication in this edition 02.12.2021

© **The Southern Caucasus Media. NGO SALG, LTD SCIAMS**, All rights reserved. Reproduction, store in a retrieval system, or transmitted in any form, electronic, mechanic photocopying of any publishing of Southern Caucasus Scientific Journals permitted only with the agreement of the publisher. The editorial board does not bear any responsibility for the contents of advertisements and papers. The editorial board's views can differ from the author's opinion. The journal published and issued by The Southern Caucasus Media.

TABLE OF CONTENTS

Ainur Tokshilykova, Zhanslu Sarkulova, Zhusupbek Satenov, Marat Sarkulov, Arzyhiya Tleuova, Botagoz Kalieva, Kamila Daniyarova, Adina Darbaeva, Gulnara Kiliptari PROGNOSTIC MEANING OF SERUM NSE AS THE FACTOR OF BAD OUTCOME IN SECONDARY BRAIN DAMAGE	04
Ahliman Amiraslanov, Sevinj Abdiyeva, Azer Amiraslanov, Elnur Ibrahimov, Habil Muradov IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES IN SOFT TISSUE SARCOMAS	17
B. M. Esedov, N.N.Eldarova, N.E.Vahabov SPOR VE DEVIANT DAVRANIŞ	19
Vafa Veliyeva THE MAIN FEATURES OF BREAST CANCER IN YOUNG WOMEN AND MODERN APPROACH IN SURGICAL TREATMENT	27
Мерей Алиева, Динмухамед. Аяганов, Самат Сапарбаев ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ОБОНЯТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ COVID-19	28
Суймур Гаджиев КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ	33
Асадова Ш.Ш., Вахабова Ш.Б. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ Г. БАКУ	41
Токшилыкова А.Б., Саркулова Ж.Н., Сатенов М.Н., Саркулов М.Н., Тлеуова А.С., Калиева Б.М., Даниярова К.Р. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ NSE В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КАК ФАКТОР ПЛОХОГО ИСХОДА ПРИ ВТОРИЧНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА	49

PROGNOSTIC MEANING OF SERUM NSE AS THE FACTOR OF BAD OUTCOME IN SECONDARY BRAIN DAMAGE

¹Ainur Tokshilykova, ²Zhanslu Sarkulova, ³Zhusupbek Satenov, ⁴Marat Sarkulov, ⁵Arzyhiya Tleuova, ⁶Botagoz Kalieva, ⁷Kamila Daniyarova, ⁸Adina Darbaeva, ⁹Gulnara Kiliptari

¹Assistant at the Department of Anesthesiology and Reanimatology,

²Doctor of Medical Sciences, Professor,

³Assistant at the Department of Anesthesiology and Reanimatology,

⁴Candidate of Medical Sciences, the chairman of Urology Department,

⁵Assistant at the Department of Anesthesiology and Reanimatology,

⁶Assistant at the Department of Anesthesiology and Reanimatology,

⁷Assistant at the Department of Anesthesiology and Reanimatology,

⁸Resident at the Department of Anesthesiology and Reanimatology.

⁹Head of ICU department. Associate professor

Tbilisi State Medical University. Head of ICU department. Associate professor

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Department of Anesthesiology and Reanimatology, West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University.

⁹Tbilisi State Medical University.

Email: Ainur.t_83@mail.ru

This research is dedicated to the study of brain neuronspecific markers and indicators of brain damage outcome.

Purpose of the study: To examine the prognostic role of serum NSE as the predictor of unfavorable outcome in traumatic and vascular brain damages.

Methods: Prospective cohort study with 219 patients. Blood serum neuronspecific markers (NSE,S100B),acid-base state, blood gas were derived during the period of observation: upon enrolment, on the 3-rd, 5-th and 7-th days spent in the hospital in the intensive care unit.

Results: The most significant risk factor of unfavorable outcome is the marker NSE with the cut point 12,5 ng/ml. The results of the analysis indicate the presence of a statistically significant direct relationship between NSE> 12.5 ng / ml and LDH, compared to other variables, 3.7 times more often; with an increase in blood lactate more than 4,1 mmol/l almost 3,8 times; with GCS 13 points below by 1,7 times; S100≥0,2 by 2,8 times; with an increase of PCO2 <38,5 it was documented more than 3 times often. The measure of certainty the resulting model by the pseudo R2 Nagelkerke criterion-250.6; logLikelihood - 154.04 which corresponds to the excellent predictive ability of the mathematical model. The best predictive value of the model is a cut-off point of 88.89%, AuROC-0.809; Se-51.59%; Sp-95.06%; NPV-55.80%; PPV-94.20%.

This model can be used to predict the outcome in patients with acute cerebral pathology.

Keywords: strokes, brain traumatic damages, neuronspecific markers, diagnostic and prognostic criterias, stroke outcomes.

Traumatic and vascular lesions of the brain cause abnormal brain functioning due to disturbances in the vascular system. Millions of people are admitted to emergency departments every year for brain damage, of which 1.5 million die [1, 2]. Many deaths occur before the patient arrives at the hospital or during treatment [3]. However, ongoing inflammatory processes in secondary brain damage cause damage to molecular cells, changes in metabolism and cerebral blood flow, axonal disruption and apoptosis, which can influence the development of long-term mortality in the

separated period of cerebral damage [4,5]. According to the authors, these patients have a reduced points with GCS in assessing the severity, dynamics and prediction of outcomes of neurological status [6,7]. Also, in computed tomography of the brain, the diagnostic value is low, due to low sensitivity and insufficient specificity [8,9]. Magnetic resonance imaging allows us to assess the severity of neuroaxonal injuries, but its inaccessibility to some hospitals, long study time, often severe patients requiring continued mechanical ventilation significantly limit its use [8, 10]. In daily clinical practice, due to invasiveness and the presence of certain indications, the control of intracranial pressure is also limited [10]. Therefore, more and more clinical and experimental studies are aimed at studying the role of neurospecific blood proteins in the diagnosis and prognosis of outcomes of acute cerebral neuropathology [7,11]. In diseases associated with the direct involvement of nervous tissue in the pathological process, qualitative and quantitative determinations of the NSE protein in cerebrospinal fluid or blood serum provide valuable information on the severity of neuronal damage and violations of the overall integrity of the blood-brain barrier [12].

NSE also characterizes the degree of post-ischemic brain damage. NSE has a long half-life compared to S100B. Unlike S100B, which is present in high concentrations in glial cells and Schwann cells, NSE originates predominantly from neurons and neuroendocrine cells [13, 14]. It is possible that S100B simply reflects the inflammatory response of glial cells, while NSE may serve as a marker of neuronal damage [15,16].

The assessment of the significance of markers in the prediction of the dominance of injuries was carried out by us using the Wald method. The ability of NSE as a predictor of mortality has been shown in several studies [17]. However, a number of studies refute these results [18]. Different results may be associated with methodological differences, sample size, out-of-the-box tests, and different demographics. To further deepen the usefulness of NSE as a predictor of poor outcome, this article will present its predictive value in vascular and traumatic brain injury.

Methods: The study was carried out in accordance with the standards of good clinical practice (Good Clinical Practice), the principles of the Declaration of Helsinki and in accordance with the principles of the ethical commission of the West Kazakhstan Medical University named after Marat Ospanov No. 12 dated January 30, 2018 [11]. The content of NSE protein in blood serum upon admission and in dynamics was determined in 219 patients with vascular and traumatic brain diseases who were treated in the intensive care units and intensive care units of stroke centers in Aktobe (Republic of Kazakhstan) for the period from 2018 to 2020. The study included patients with hemorrhagic strokes (HI) - 146 patients (66.6%), ischemic stroke 43 (19.6%) and with acute closed craniocerebral injuries of mild and moderate severity - 30 (13.60%). Criteria for inclusion in the study of patients with hemorrhagic stroke were cases of intracerebral hemorrhage with a hematoma volume of more than 30 cm³ (mainly hemispheric hemorrhages); patients with ischemic stroke - with the presence of cerebral infarction, confirmed by clinical and CT data; patients with severe craniocerebral trauma - moderate and severe cerebral contusions. Patients with: intracerebral hemorrhages with a hematoma volume of more than 80 cm³, with severe decompensated somatic diseases, with benign and malignant tumors of the brain, lungs and skin were excluded from the main group. According to the outcome of the disease, regardless of the diagnosis, the patients were divided into groups: survivors - 59.3% (n = 130) and deaths - 40.6% (n = 89). Laboratory studies of the NSE were carried out upon admission and in dynamics. The

supernatant was removed and stored at -80°C until analysis. For NSE determination, all samples were analyzed in duplicate using immunoluminometric assay using a human ELISA kit. To measure blood gases, lactate and glucose, samples were analyzed using an ABL 735 analyzer (Radiometer; Denmark). The neurological grading scales GCS (Glasgow Coma Scale) were used to assess the severity of brain damage and to predict the outcome of the clinical course of the disease in patients. The study was approved by the hospital ethics committee and informed consent.

The distribution of patients in groups by sex ($\chi^2 = 0.0184$, $p = 0.8922$) and age ($\chi^2 = 0.0183$, $p = 0.4288$), where all predictors were examined were comparable. To determine the possibility of using the NSE protein in predicting the outcome of secondary brain injuries in vascular and traumatic brain injury, an analysis of variance was carried out. Maximum, minimum, and mean protein levels were assessed for each outcome group.

Statistics: The study of the statistical relationship between a qualitative trait and clinical outcome was carried out using the analysis of contingency tables, with the calculation of the Pearson χ^2 criterion. If the condition of applicability of the χ^2 criterion is not met (more than 25% of cells in the contingency table have an expected frequency of less than 5), the analysis was carried out in pairs according to the two-sided Fisher's exact test (2p (F)). In the case of insufficient statistical significance of the relationship between two nominal features in a multi-field contingency table, several similar gradations of a feature were combined into one, followed by calculation of the Pearson χ^2 criterion with the achieved level of statistical significance (p) and the odds ratio (OR) with a 95% confidence interval (95% CI). The study of the relationship between the quantitative and qualitative trait was carried out using one-way logistic regression analysis with the calculation of Wald's χ^2 statistics with the achieved level of statistical significance and OR with 95% CI. Multiple linear regression analysis was performed to identify variables independently associated with serum NSE levels. NSE was used as a dependent variable. A step-by-step forward technique was used. Data are presented as mean $\pm$ SD or median and percentile, p -values less than 0.05 were considered significant.

The construction of mathematical models for predicting the risk of an unfavorable outcome was carried out using the method of multivariate binary logistic regression analysis with step-by-step inclusion of independent variables. The effect of the independent variable on the probability of outcome was determined using OR and 95% CI. To assess the quality of the mathematical model, we calculated the Nagelkerke coefficient of determination (R^2), which shows the share of the influence of all variables included in the model on the variance of the dependent variable, as well as the Hosmer-Lemeshow goodness test, which makes it possible to establish how the model agrees with the initial data. The discriminatory ability of the mathematical model was assessed based on the analysis of the classification table. Evaluation of the predictive efficiency of the model was carried out using the analysis of ROC curves, with the calculation of the area under the ROC curve, called AUC (Area Under Curve). In the statistical analysis procedures, the achieved level of statistical significance (p) and the number of degrees of freedom (df) were calculated. The critical value of the level of statistical significance in the study was $p < 0.05$.

The results of the study were subjected to statistical analysis and mathematical data processing using the Statistics (SPSS25) software package.

Results: Neurospecific enolase (NSE) performs an enzymatic function by participating in glycolysis processes and is one of the specific markers of nerve tissue damage. A very rapid increase in blood concentration was noted during hypoxia, brain injury and other pathological conditions accompanied by massive destruction of neurons. When comparing the groups of survivors and deceased, it was found that the concentration of the NSE protein on the first day after injury increased by 2 and 3 times, respectively. In the surviving patients, on the third day after the incident, the NSE level returned to the control figures, and in the deceased - it remains high relative to the control indicators. Figure 1 shows the distribution of the mean NSE protein for each outcome group.

Figure 1. Diagram of NSE range in disease outcome groups.

As shown by the studies, when comparing the dynamics of the content of neuron-specific proteins in the groups of surviving and deceased patients, statistically significant differences were determined. So, if in both groups of patients there was a 1.4-fold increase in NSE on day 1 14.76 95% CI (12.98; 16.54) versus 20.75 95% CI (16.10-25.39) ng / ml, respectively for the groups), then a significant increase in its concentration was observed in the group of patients who died on the 3rd day by 1.39 times 19.75 95% CI (14.52-24.97) $p = 0.0260$) by the background of the treatment, which suggested an early occurrence of an unfavorable course of the disease.

In all other fatalities, the NSE concentration increased over time, reaching a maximum at the time of death. Analysis of variance was performed to determine the statistically significant difference. Maximum, minimum, and mean NSE protein levels were assessed for each outcome group.

The revealed differences in the nature of the body's response to brain damage gave us the basis for the subsequent development of a differential diagnostic algorithm. Variables showing a statistically significant relationship with (predictors of) an increase in target $\text{NSE} > 12.5 \text{ ng / ml}$ by factors of secondary brain injury in univariate analysis were introduced into multiple LRA step by step. In the first step, clinical and laboratory parameters were included (simple model) The results of the analysis are presented in Table 1.

Table 1. Predicting the risk of increasing NSE> 12.5 ng / ml.

Factor	AuRO C	Stand errors	OR	95%CI OR		Coeff.regr ession	χ^2	Level P
				lower	upper			
Const		-1,9577				-1,9576	19,4029	<0,0001
LDH ¹ ≥218	0,728	0,3376	3,74	1,93	7,25	1,3195	15,279	<0,0001
GCS ² <13	0,766	0,3447	1,68	0,85	3,29	0,5168	2,2485	0,1337
Age<53	0,783	0,3901	2,95	1,37	6,34	1,0829	7,7076	0,0055
S100B≥0,2	0,790	0,3868	2,79	1,31	5,95	1,0256	7,0288	0,0080
PCO2 ³ ≥38,5	0,804	0,3741	3,08	1,48	6,41	1,1242	9,0311	0,0027
Lactate	0,809	0,6625	3,29	0,90	12,07	1,1922	3,2392	0,0719

Notes:

1 LDH- lactate dehydrogenase

2 GCS- The Glasgow Com Scale

3 S100B – calcium binding protein

4 PCO2- partial pressure of carbon dioxide

The measure of certainty of the resulting model according to the pseudo R2 criterion is 250.6%. Independent factors associated with NSE were: LDH ≥218, GCS <13, Age<53, S100B≥0.2, PCO2≥38.5, Lactate≥4. The results of the analysis indicate the presence of a statistically significant direct relationship between NSE>12.5 ng / ml and LDH, compared to other variables, 3.7 times more often; with an increase in blood lactate above 4.1 mmol / l, almost 3.8 times; with a Glasgow scale below 13 points by 1.7 times; S100B 0.2 by 2.8 times; with an increase in PCO2 <38.5 were documented more than 3 times more often. The measure of certainty of the resulting model by the criterion of pseudo R2 Nagelkerke-250.6; logLikelihood 154.04.

The logistic regression equation of the model is as follows:

Risk = 1/(1 + Exp(-(-1,958 + 1,319*LDH ≥218 + 0,517*GCS <13 + 1,083*Age <53 + 1,026*S100B ≥0 + 1,124*PCO2 ≥38 + 1,192*Lactate ≥4)))

Where P is the probability of risk of increasing NSE> 12.5 ng / m, e-base of natural logarithm (e = 2.72), -1.9577 is a constant;

The best predictive value of the model had a cut-off point of 88.89%, AuROC-0.809; Se-51.59%; Sp-95.06%; NPV-55.80%; PPV-94.20%.

When forming multivariate analysis of variance, when predicting the risk NSE> 12.5 ng / ml, we obtained regressions from several factors, which are indicated in Table 11.

Table 11. Regressions

Factor	Cut off	Relative (95% CI) risk	Se	Sp	χ^2	AuROC	P-level (df=1)
4 factor ≥ 1,0	1,0	4,54 (2,01; 10,24)	96,24%	32,56%	33,8465	0,80	<0,0001
3 factor ≥ 1,0	1,0	3,66 (1,86; 7,18)	94,74%	34,88%	32,6368	0,79	<0,0001
5 factor ≥ 2,0	2,0	2,45 (1,56; 3,86)	89,47%	40,70%	27,3740	0,82	<0,0001

Regression consisting of 4 factors relative risk of poor outcome 4.54 (95% CI 2.01; 10.24); Se-96.24%, Sp-32.56%, χ^2 -33.8465, AuROC-0.80.

We calculate: if LDH > 218 then score = 35; GCS < 13 then score = 15; Age < 53 then score = 24; S100 ≥ 0.2 then score = 26. Total = 100bb. If on admission the patient gains 100 bb in the patient during the study, the risk of NSE is > 12.5 ng / ml and the mortality rate exceeds 4.54 times. To predict the NSE score, we used multiple regression analysis with the NSE dependent variable and the independent variables LDH, Lactate, S100, Glucose. All variables listed in the table predicted the quantitative value of this marker. Below are the extended results of the regression analysis in Table 2.

Table 2. Advanced regression results

factor	R-square(correcte d)	R-square changes	Correl. With target	B-coef	Stand. erroe	p
constant					3,1990	0,2439
LDH ¹	18,2%	41,87%	0,43	0,008	0,0085	<0,0001
lactate	22,4%	23,62%	0,28	17,748	0,6259	0,0105
S100B ²	41,4%	19,43%	0,55	52,207	0,5757	<0,0001
glucose	42,1%	0,50%	0,05	-3,529	0,3241	0,0598

Notes:

1.LDH-lactatdehydrogenaze

2. S100- calcium binding protein

Model quality

R-square	42,9%
R-square corrected.	42,1%
Standard error Y	12,46
F-statistic	40,22
number of degrees of freedom	214
Level P	<0,0001

Figure 14. The graph of the dependence of the observed values on the predicted values and the quality of the model $NSE = 3,17 + 0,05 \cdot LDH + 1,7 \cdot lactate + 4,9 \cdot S100B - 0,63 \cdot glucose$
Where:

3,166 - constant

0,052 - regression coefficient of LDH;

1,699 - regression coefficient of lactate;

4,900 - regression coefficient of S100B;

-0,632 - regression coefficient of glucose

The results of the regression analysis showed that the variables independently statistically associated with NSE were LDH, lactate, S100B, and blood glucose. In this part of the study, we have focused on those variables that are strongly associated with the dependent variable. Differences in the mean value of NSE protein in serum with different outcomes. The group with a favorable outcome (GOS 4,5,3) and the group with a poor outcome (GOS 1,2) with a lethal outcome significantly differ in the mean and maximum values of the level of NSE protein in blood serum ($p = 0.05$). Next, we plotted Kaplan-Meier survival curves for $\text{NSE} < 12.5 \text{ ng/ml}$

Figure 15. Kaplan-Meier survival curves for $\text{NSE} < 12.5 \text{ ng/ml}$ and $\text{NSE} > 12.5 \text{ ng/ml}$

As can be seen from the figure, the cumulative indicator of cases of poor outcome in the group with a level and $\text{NSE} > 12.5 \text{ ng/ml}$ began to diverge already in the first days of observation. The achieved level of significance according to the log Rank criterion (Mantel Cox) = 0.0062, the differences in the study groups are significant. Thus, the NSE protein level $> 12.5 \text{ ng/ml}$ can serve as a predictor of death in the early stages of the disease.

It was found that the levels of neuron-specific proteins, blood gases and predictors of impaired brain metabolism differentiated among themselves depending on the outcome of the disease. The revealed differences were explained by the biochemical characteristics of cerebral injuries, which, in turn, were determined by their morpho-functional characteristics. The essence of the dominant brain damage is the development of a pathological process in the direction of an increase in cytotoxic edema (edema-swelling) of the brain, an increase in intracranial pressure with possible dislocation and wedging of the brain. In general, the results of the comparison of blood serum

indices gave a positive result. They showed that the magnitude of individual neuromarkers can serve as a criterion for the dominance of secondary brain injury.

Discussion: Death rates from traumatic and vascular injury differ in several studies. Some studies also use different temporal methods and parameters to analyze this mortality. Mortality ranges from 13 to 22% [20]. It has been established that after the primary injury, from the first minutes, secondary brain damage develops, which can continue in subsequent periods for several years due to excessive metabolic, cellular and molecular activity of inflammation [20]. The research results indicate that the immunoenzyme screening of neuron-specific proteins (NSE) makes it possible to assess the degree of damage to the blood-brain barrier and the depth of pathological changes occurring in the nervous system [21]. During the infectious process, immunopathological reactions are triggered in the central nervous system, leading to the activation of T-lymphocytes and an increase in the BBB permeability [22,23]. The penetration of the virus into the central nervous system is largely determined by the state of the BBB. Violation of the BBB permeability is accompanied by the release of NSE into the blood.

Determination of NSE and S100 protein in serum and cerebrospinal fluid in the acute period of traumatic and vascular brain damage can serve as an additional criterion for early diagnosis of impaired blood-brain barrier permeability in the acute period of the disease and as a criterion for the restoration of its permeability in the long-term period [24, 25].

The researchers also found that this biomarker reflects the severity of injury based on GCS [26]. Based on this study, it was shown that high NSE levels were significantly different in surviving or deceased subjects with head injuries. The brain damage that causes high levels of NSE can be strongly associated with impaired BBB and ischemia. So, for example, according to [27], postischemic vasospasm usually develops within 3 days after traumatic and vascular lesions. The strength of short-term predictors of mortality is also better than predictors of long-term mortality risks, both in significance of mean differences and in diagnostic power. Another study argued against the results that NSE level could not be a predictor of mortality. The differences were associated with variations in the time of NSE collection in each study, from the time of injury to 84 hours after injury. These studies were carried out heterogeneously in terms of time and methodology, so the results of the study also differ [28]. In this article, we describe the development of a predictive model of increasing complexity based on predictors to predict poor patient outcomes. The model adequately differentiated between patients with poor and good outcomes. The largest amount of prognostic information was contained in the main set of predictors: S100B, GCS, pCO₂, glucose and LDH at admission. These characteristics have already been taken into account in many predictive models [29,30]. Further validation of this estimate is needed, but the required data were insufficiently available in most of the IMPACT studies. Glucose and hemoglobin have been shown to contribute to predicting outcome, although their influence is less than that of other predictors such as age [31]. In intensive care units, intensive treatment of hyperglycemia has been shown to reduce mortality [32]. Early prediction of outcome allows a baseline risk profile to be established for individual patients, thereby providing a reference for assessing the quality of care. Predictive models are especially important for better planning and analysis of RCTs. For example, we can exclude patients with a very good or very poor prognosis [33], perform a covariate adjustment for treatment effect [34,35], and consider other analyzes that lead to increased statistical power [36].

The proposed scales can also assist physicians in their initial assessment of the severity and prognosis of patients with brain damage. However, we note that models can only complement and not replace clinical judgment, although it is unlikely that any clinician has equivalent systematic experience with the thousands of patients that underlie our models. The prognosis should be treated with caution and not used directly to make decisions about limiting treatment [37].

These models can be useful for providing relatives with realistic information about expected outcomes, for quantifying and categorizing the severity of brain injury, for stratifying and correcting covariance in clinical trials, and as a reference for assessing the quality of care.

Thus, early detection and control of the S100B level, as well as simultaneous studies of S100 and NSE, make it possible to identify and confirm the presence of brain damage at an early stage, it is possible to successfully predict secondary brain damage.

Limitations and further study: This study had limitations. The study with a small number of patients was single-center, which limits its validity. Secondly, there were certain difficulties in the process of work associated with the refusal of patients or their relatives from further participation in this study; there was no dynamic long-term follow-up of the studied patients.

This study provides the basis on which further multicenter studies should be built in order to establish generalizability and improve the validity of the results obtained.

Conclusion: 1. The levels of the dependent variable (NSE) and independent variables (S100B, blood glucose, GCS and HB) can be used as multimodal predictors of predicting neurological outcome in patients with acute cerebral pathology. In this study, we were able to predict the quantitative indicator of the NSE $y = 0.4292x + 9.58$. $R^2 = 0.4292$

2. The proposed mathematical model, which includes the dependent variable (NSE) and independent variables (S100B, blood glucose, GCS and HB) as predictors of poor outcomes, had a cut-off point The best predictive value of the model had a cut-off point of 88.89%, AuROC-0.809; Se-51.59%; Sp-95.06%; NPV-55.80%; PPV-94.20%, which corresponds to the excellent quality of the predictive ability of the mathematical model. The model can be used in everyday practice to identify and reduce the likelihood of a high risk of adverse clinical outcome in patients with acute cerebral pathology.

REFERENCES

1. Brazinova A, Rehorcikova V, Taylor MS, Buckova V, Majdan M, Psota M, Peeters W, Feigin V, Theadom A, Holkovic L, Synnot A. Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe: A Living Systematic Review. *J Neurotrauma*. 2021 May 15;38(10):1411-1440. doi: 10.1089/neu.2015.4126. Epub 2018 Dec 19. PMID: 26537996; PMCID: PMC8082737.
2. Boursin P, Paternotte S, Dercy B, Sabben C, Maïer B. Sémantique, épidémiologie et sémiologie des accidents vasculaires cérébraux [Semantics, epidemiology and semiology of stroke]. *Soins*. 2018 Sep;63(828):24-27. French. doi: 10.1016/j.soins.2018.06.008. PMID: 30213310.
3. Faiz KW, Rønning OM. Hjerneslag [Stroke]. *Tidsskr Nor Lægeforen*. 2018 Feb 5;138(3). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.17.0677. PMID: 29411589.

4. David A, Mari C, Vignaud F, Masson D, Planche L, Bord E, et al. Evaluation of S100B blood level as a biomarker to avoid computed tomography in patients with mild head trauma under antithrombotic medication. 2017; 98: 551–556.
5. Wijanarko F, Alifianto U, Setyono H, Arsika Ramadhana G, Sungkar AA, Saadhi I, Setiawati DA. S100 β protein levels as a parameter to assess the clinical development of adult patients with mild traumatic brain injury in Dr. Moewardi Public Hospital, Surakarta. Surg Neurol Int. 2021 Jul 12;12:342. doi: 10.25259/SNI_294_2021. PMID: 34345483; PMCID: PMC8326141.
6. Adrian H., Martin K., Salla N., Lasse V. Biomarkers of traumatic brain injury: temporary changes in body fluids. eNeuro. 2016; 3 (6): 294-9. <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0294-16.2016> PMid: 28032118 PMCID: PMC5175263.
7. Mercier E., Butin A., Lauzier F., Fergusson D.A., Simard J. F., Zarychansky R. et al. Prognostic value of S-100beta protein for prognosis in patients with moderate and severe traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013; 346: 1757-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.f1757> PMid: 23558282.
8. Pfortmueller CA, Drexel C, Krahenmann-Muller S, Leichtle AB, Fiedler GM, Lindner G, et al. Concentrations of S-100 B are a prognostic factor of reduced survival in patients with serious trauma, regardless of traumatic brain injury. PloS One. 2016; 11 (3): 1–5. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152822> PMid: 27031106 PMCID: PMC4816449.
9. Murillo-Cabezas F., Mu-oz-sAnchez M.A., Rincon-Ferrari M.D., etc. Prognostic value of the time course of the S100B eta protein in severe post-acute brain injury: a prospective and observational study. Brain Inj. 2010; 24 : 609–19. <https://doi.org/10.3109/02699051003652823> PMid: 20235763.
10. Tokshilykova, A.B., Sarkulova, Z.N., Kabdrakhmanova, G.B. et al. Neuron-Specific Markers and their Correlation with Neurological Scales in Patients with Acute Neuropathologies. Journal of molecular Neuroscience (2020). <https://doi.org/10.1007/s12031-020-01536-5>.
11. Rainey T., Lesko M., Sachko R., Lecky F., Childs S. Predicting the outcome after severe traumatic brain injury using the S100B serum biomarker: results using a single time point (24 hours). Resuscitation. 2009; 80 : 341–5. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.11.021> PMid: 19150161.
12. Chi Y. L. et al. Evaluation of the postoperative cognitive dysfunction in elderly patients with general anesthesia //Eur Rev Med Pharmacol Sci. – 2017. – T. 21. – №. 6. – C. 1346-54.
13. Hong SK, Kim JH, Starenki D, Park JI. Autophagy sensitivity of neuroendocrine lung tumor cells. Int J Oncol. 2013 Dec;43(6):2031-8. doi: 10.3892/ijo.2013.2136. Epub 2013 Oct 11. PMID: 24126619; PMCID: PMC3834067.
14. Xu CM, Luo YL, Li S, Li ZX, Jiang L, Zhang GX, Owusu L, Chen HL. Multifunctional neuron-specific enolase: its role in lung diseases. Biosci Rep. 2019 Nov 29;39(11):BSR20192732. doi: 10.1042/BSR20192732. PMID: 31642468; PMCID: PMC6859115.
15. Hagemeyer S, Romão MA, Cristóvão JS, Vilella A, Zoli M, Gomes CM, Grabrucker AM. Distribution and Relative Abundance of S100 Proteins in the Brain of the APP23

- Alzheimer's Disease Model Mice. *Front Neurosci.* 2019 Jun 20;13:640. doi: 10.3389/fnins.2019.00640. PMID: 31281238; PMCID: PMC6596341.
16. Lasek-Bal A, Jedrzejowska-Szypulka H, Student S, Warsz-Wianecka A, Zareba K, Puz P, Bal W, Pawletko K, Lewin-Kowalik J. The importance of selected markers of inflammation and blood-brain barrier damage for short-term ischemic stroke prognosis. *J Physiol Pharmacol.* 2019 Apr;70(2). doi: 10.26402/jpp.2019.2.04. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31356182.
 17. Goyal A., Falla M.D., Niyonkuru S., Amin K., Fabio A., Birger R.P., Wagner A.K. S100b as a prognostic biomarker in predicting outcomes for patients with severe brain injury. *J Neurotrauma.* 2013; 30 (11): 946–57. <https://doi.org/10.1089/neu.2012.2579> PMid: 23190274 PMCID: PMC3684103
 18. Kellermann I, Kleindienst A, Horan, Buchfelder M, Bronner S. Concentrations of early CSF and S100B serum for predicting outcomes in traumatic brain injury and subarachnoid hemorrhage. *Clin Neurol Neurosurg.* 2016; 145:79–83. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2016.04.005> PMid: 27101088.
 19. Olivecrona M, Rodling-Wahlström M, Naredi S, Koskinen LO. S-100B и нейронспецифическая эналаза являются плохими предикторами исхода при тяжелой черепно-мозговой травме, леченной таргетной терапией внутричерепным давлением. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2009; 80 (11): 1241–7. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2008.158196> PMid: 19602473.
 20. Ballesteros MA, Rubio-Lopez MI, San Martín M, Padilla A, López-Hoyos M., Llorca J, Mi-ambres E. S100B levels from the jugular vein bulb as a biomarker of poor prognosis in patients with severe acute brain injury . *J Neurol Sci.* 2018; 385 : 109–14. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2017.12.017> PMid: 29406887.
 21. Anderson BJ, Reilly JP, Shashaty MGS, Palakshappa JA, Wysoczanski A, Dunn TG, Kazi A, Tommasini A, Mikkelsen ME, Schweickert WD, Kolson DL, Christie JD, Meyer NJ. Admission plasma levels of the neuronal injury marker neuron-specific enolase are associated with mortality and delirium in sepsis. *J Crit Care.* 2016 Dec;36:18-23. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.06.012. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27546742; PMCID: PMC5096992.
 22. Cheng F, Yuan Q, Yang J, Wang W, Liu H. The prognostic value of serum neuron-specific enolase in traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2014 Sep 4;9(9):e106680. doi: 10.1371/journal.pone.0106680. PMID: 25188406; PMCID: PMC4154726.
 23. Mattos JD, Campos MO, Rocha MP, Mansur DE, Rocha HNM, Garcia VP, Batista G, Alvares TS, Oliveira GV, Souza MV, Videira RLR, Rocha NG, Secher NH, Nóbrega ACL, Fernandes IA. Human brain blood flow and metabolism during isocapnic hyperoxia: the role of reactive oxygen species. *J Physiol.* 2019 Feb;597(3):741-755. doi: 10.1113/JP277122. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30506968; PMCID: PMC6355640.
 24. Czupryna P, Grygorczuk S, Pancewicz S, Świerzbńska R, Zajkowska J, Krawczuk K, Dunaj J, Filipiuk J, Kruszewska E, Borawski K, Moniuszko-Malinowska A. Evaluation of NSE and S100B in patients with tick-borne encephalitis. *Brain Behav.* 2018 Dec;8(12):e01160. doi: 10.1002/brb3.1160. Epub 2018 Nov 22. PMID: 30468006; PMCID: PMC6305942.

25. Lindblad C, Nelson DW, Zeiler FA, Ercole A, Ghatan PH, von Horn H, Risling M, Svensson M, Agoston DV, Bellander BM, Thelin EP. Influence of Blood-Brain Barrier Integrity on Brain Protein Biomarker Clearance in Severe Traumatic Brain Injury: A Longitudinal Prospective Study. *J Neurotrauma*. 2020 Jun 15;37(12):1381-1391. doi: 10.1089/neu.2019.6741. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32013731; PMCID: PMC7249468.
26. Gradisek P, Osredkar J, Korsika M, Kremzar B. A model with multiple indicators of long-term mortality in traumatic brain injury. *Brain Ini*. 2012; 26 (12): 1472–81. <https://doi.org/10.3109/02699052.2012.694567> PMid: 22721420
27. Tum I., Kshih L., Yendzheyevskaya-Shpulka H., Levin-Kovalik Y.L. Serum levels of S100B protein and neuron-specific enolase are associated with mortality in critically ill patients. *Biochimica Polonica*. 2017; 64 : 16–9. https://doi.org/10.18388/abp.2017_1619.
28. Shakeri M, Mahdkhah A, Panahi F. S100B Protein as a Post-traumatic Biomarker for Prediction of Brain Death in Association With Patient Outcomes. *Arch Trauma Res*. 2013 Aug;2(2):76-80. doi: 10.5812/at.8549. Epub 2013 Aug 1. PMID:24396798; PMCID: PMC3876553
29. Kang C, Jeong W, Park JS, You Y, Min JH, Cho YC, Ahn HJ. Comparison of Prognostic Performance between Neuron-Specific Enolase and S100 Calcium-Binding Protein B Obtained from the Cerebrospinal Fluid of Out-of-Hospital Cardiac Arrest Survivors Who Underwent Targeted Temperature Management. *J Clin Med*. 2021 Apr 6;10(7):1531. doi: 10.3390/jcm10071531. PMID: 33917473; PMCID: PMC8038742.
30. Perel P, Edwards P, Wentz R, Roberts I. Systematic review of prognostic models in traumatic brain injury. *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2006 Nov;6:38. DOI: 10.1186/1472-6947-6-38. PMID: 17105661; PMCID: PMC1657003.
31. Nino A. Mushkudiani, Chantal W.P.M. Hukkelhoven, Adrián V. Hernández, Gordon D. Murray, Sung C. Choi, Andrew I.R. Maas, Ewout W. Steyerberg, A systematic review finds methodological improvements necessary for prognostic models in determining traumatic brain injury outcomes, *Journal of Clinical Epidemiology*, Volume 61, Issue 4, 2008, Pages 331-343, ISSN 0895-4356, <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.06.011>.
32. Rodriguez-rOdriguez A., Higuera-gUerrero J. J., Gordillo-Escobar E., Enamorado-Enamorado J., Hernandez-Garcia S., Ruiz de Azua-Lopez Z., Vilchez-Arenas A., Guerrero J. M., Murillo-100-Cabezas and Ne urllo 100-Cabezas and -specific enolase as predictors of mortality in patients with severe traumatic brain injury. *Neurol Res*. 2016; 38 (2): 130–7. <https://doi.org/10.1080/01616412.2016.1144410> PMid: 27078699.
33. Dulf D, Coman MA, Tadevosyan A, Chikhladze N, Cebanu S, Peek-Asa C. A 3-Country Assessment of Traumatic Brain Injury Practices and Capacity. *World Neurosurg*. 2021 Feb;146:e517-e526. doi: 10.1016/j.wneu.2020.10.115. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33127569; PMCID: PMC7897235.
34. Chalos V, A van de Graaf R, Roozenbeek B, C G M van Es A, M den Hertog H, Staals J, van Dijk L, F M Jenniskens S, J van Oostenbrugge R, H van Zwam W, B W E M Roos Y, B L M Majoie C, F Lingsma H, van der Lugt A, W J Dippel D; MR CLEAN-MED investigators. Multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke. The effect of periprocedural medication: acetylsalicylic acid, unfractionated heparin, both, or neither (MR CLEAN-MED). Rationale and study design.

- Trials. 2020 Jul 14;21(1):644. doi: 10.1186/s13063-020-04514-9. PMID: 32665035; PMCID: PMC7362523.
35. Alcock S, Batoo D, Ande SR, Grierson R, Essig M, Martin D, Trivedi A, Sinha N, Leeies M, Zeiler FA, Shankar JJS. Early diagnosis of mortality using admission CT perfusion in severe traumatic brain injury patients (ACT-TBI): protocol for a prospective cohort study. *BMJ Open*. 2021 Jun 9;11(6):e047305. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047305. PMID: 34108167; PMCID: PMC8191612.
 36. Nelson LD, Brett BL, Magnus BE, Balsis S, McCrea MA, Manley GT, Temkin N, Dikmen S. Functional Status Examination Yields Higher Measurement Precision of Functional Limitations after Traumatic Injury than the Glasgow Outcome Scale-Extended: A Preliminary Study. *J Neurotrauma*. 2020 Feb 15;37(4):675-679. doi: 10.1089/neu.2019.6719. Epub 2019 Nov 13. PMID: 31663425; PMCID: PMC7045351.
 37. Zampieri FG, Granholm A, Møller MH, Scotti AV, Alves A, Cabral MM, Sousa MF, Balieiro HM, Hortala CC Jr, Filho EMR, Perecmanis E, de Magalhães Menezes MA, Moreira CEN, Moralez GM, Bafi AT, de Carvalho CB, Salluh JIF, Bozza FA, Perner A, Soares M. Customization and external validation of the Simplified Mortality Score for the Intensive Care Unit (SMS-ICU) in Brazilian critically ill patients. *J Crit Care*. 2020 Oct;59:94-100. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.05.016. Epub 2020 May 29. PMID: 32585439.

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES IN SOFT TISSUE SARCOMAS

Ahliman Amiraslanov, Sevinj Abdiyeva, Azer Amiraslanov, Elnur Ibrahimov, Habil Muradov

Azerbaijan Medical University, Department of Oncology, Azerbaijan.

ABSTRACT

Sarcomas are relatively rare, accounting for only 1% of all adult malignancies and 15% of childhood malignancies [2]. According to the World Health Organization (WHO), the group of soft tissue sarcomas includes more than 100 different histological subtypes [3]. According to the recommendations of the WHO to improve the accuracy of diagnosis in soft tissue sarcoma, the traditional histopathological examination should be supplemented with immunohistochemical and molecular methods [1]. It was carried out immunohistochemical research of CD31 receptor of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in 129 patients with STS.

The age range of patients is on average 14-77 years with a peak in the age of 50-59 years. The most common reason for initial visit to a medical institution was palpable tumor (100%). It was studied the following correlative interdependences:

It was determined that histodifferentiation of tumour is in inverse correlation with expression CD31 receptor. Distinctions of expression level of CD31 are shown, depending on the degree of tumor differentiation, presence or absence of its spontaneous necrotization, lymphoid infiltration of pathological nidus and amount of vessels in tumor tissue. That is as high the degree of histological differentiation of tumour as low the level of expression CD31 receptor ($\chi^2=35,4$; $p<0,001$; $p=-0,322$). In FHTof ST is exposed inverse dependence between expression CD31 endothelial cells with spontaneous necrosis and lymphoid infiltration. As more the size and foci of spontaneous necrosis ($\chi^2=67,1$; $p<0,001$; $p=-0,473$) and lymphoid infiltration ($\chi^2=46,1$; $p<0,001$; $p=-0,346$), as low the level of expression CD31 receptor. It was found that the high level of expression CD31 receptor is in direct correlation with metastasis ($\chi^2=18,6$; $p=0,42$; $p<0,001$) and recurrence ($\chi^2=9,43$; $p=0,30$; $p<0,01$) of the process. Studied modern approaches to the diagnostics and treatment of malignancies. One such approach is "Oncology Control", which means minimizing the risk of recurrence at the local and systemic level. Following treatment, follow-up should include history and physical examination accompanied by imaging (Ultrasound or MRI) every 3 to 6 month for 2 to 3 years, and then every 6 to 12 months thereafter to asses for recurrence. So in high positivity of CD31 receptor is exposed unfavourable prognosis in patients with STS.

Summarizing before said we have come to the conclusion that immune-histo-chemical investigation of CD31 receptor of VEGF has important prognostical meaning in patients STS.

This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan. Grant № ЕНФ-2011-1(3)-82/45/3.

REFERENCES

- 1) Benberin V.V., Bayzakov B.T., Shanazarov N.A., Zinchenko S.V. [Soft tissue sarcoma; a modern view to the problem][Avicenna Bulletin].2019;21(2):291-7. Available from/<http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-2-291-297>.
- 2) Farid M.N., Geow J. Sarcomas associated with genetic cancer predisposition syndromes : a review.Oncologist 2016;21:1002-1013.
- 3) Fletcher C.M., Bridge J.A., Hogendoorn P.W., Lyon M.F. World Health Organization classification of tumours of soft tissue and bone. 4th ed. Lyon, France: IARC Press: 2013. p.25-67.

SPOR VE DEVİANT DAVRANIŞ

B. M. Esedov, N.N.Eldarova, N.E.Vahabov

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı.

Sapma (aykırı) davranış – her şeyden önce toplumdan uzaklaşma teşebbüsü, günlük hayati sorunlardan ve dertlerden kaçış, güvensizlik ve belirli dengeleyici formlardan geçerek gerilim halini aşmaktır. Fakat sapma davranış her zaman olumsuz özellik taşımaz. O şahsı yenilgiyi özendirmeyle, ileriye hareket etmeğe engel olacak tutuculuğu aşmak teşebbüsü ile ilişkili ola bilir. Sapma davranışı bilimsel, spor ve teknik sanatın çeşitli şekillerinden sayabiliriz.

Deviant davranışın ne olduğunu tesbit etmek için önce mutlaka “toplumsal normlar” kavramını tanımlamak gerekir.

Toplumsal normlar: yazılı emr, talep, dilek ve beklenen uygun davranış (toplumca kabul gören) şeklidir. Belirli ideal örnek (model) normlar, insanların kesin durumlarda konuşmalı, düşünmeli, duymalı ve yapmalı olduğunu belirtiyor. Onlar boyutlarına göre farklılık taşıyor.

Birinci tür: bu normlar yalnız küçük gruplarda (genc grupları, dost grupları, aile, işçi grupları, spor takımlarında) oluşur ve mevcut olur. Onlar “grup alışkanlıkları” olarak adlanır.

Örnek olarak 1927-1932 yıllarında ünlü Hotornskiy denemelerini gerçekleştiren Amerikan toplum bilimcisi E. Mayo normlar keşfetmiştir. Bu normlar yenilerle ilişkide üretim-askeri ekipler ve üstler için kabul edilmiştir:

“Yakınlarıyla” resmi davranmamak,

Müdürlüğe, grub üyelerine zarar dokunduracak her hangi bir şey söylememek,

Müdürlükle “yakınlarıyla” olduğu gibi sık-sık görüşmemek,

Kendi arkadaşlarından daha fazla ürün hazırlamamak.

İkinci tür: bu normlar büyük gruplarda veya bütün toplumda oluşur ve mevcut olur. Onlar “genel kurallar” adlanır. Bunlar adet, gelenek, töreler, kanunlar, teşrifatlar ve davranış tarzıdır. Her hangi toplumsal grubun kendine özgü davranış tarzı, gelenekleri ve teşrifatları bulunur. Sosyetik etik davranışlar ve gençlere özgü davranış biçimleri bulunur. Ulusal çapta gelenek ve töreler bulunur.

Bütün sosyal normları, onları sert uygulamaya konma bakımından çeşitleye biliriz.

Bu normlardan birinin ihlali yumşak cezayı (kınama, dışlama, kötü niyetli eleştiri) gerektirir.

Diger normların ihlali sert yaptırımlar (hapis cezası, hatta ölüm cezası) gerektirir.

Belirli normlara uymama derecesi tüm toplumlarda ve tüm gruplarda mevcuttur. Saray etiketleri, diplomatik konuşma ve nikah törenlerinin ihlali sıkıntılı durum oluşturur ve insanı zor durumda bırakır. Ancak bunlar sert yaptırımlar gerektirmez.

Sosyal normlar toplumda çok önemli fonksiyonlara sahiptirler. Onlar:

Topluma kazandırmanın genel akışını ayarlar,

Fertleri gruba, grubuysa topluma entegre eder,

Sapma (aykırı) davranışları kontrol eder,

Davranış örnekleri ve ayarlarıyla hizmet eder.

Normlar yardımıyla hangi örnek buna ulaşmada başarılı olur? İlk olarak normlar – bir şahsın diğer şahısla və şahıslarla ilişkide tahhütleridir. Yenilere kendi arkadaşlarına oranda müdürlükle sık-sık ilişkide bulunmasına izin verilmiyor. Küçük gruplar kendi üyelerine belirli yetkiler verir ve onlar ile müdürlük ve arkadaşları arasında belirli ilişkileri saptıyor. Normlar grub ve toplumda toplumsal davranış ağı şekillendirir.

İkinci olarak – normlar aynı zamanda gözlemlerdir: bu normlara uyan kişiden çevresinde bulunanlar tam olarak tek anlamlı davranış bekliyorlar. Örneğin: ne zaman sokağın sağ tarafından yalnız piyadeler, sol taraftansa karşıdan gelenlerde yürüyorlarsa bu zaman düzen, organize edilmiş karşılıklı etkileşim oluşur. Kuralların ihlali zamanı birbirine çarpma ve karmaşıklık oluşur. Normların daha açık işlemi iş dünyasında oluşur. Eğer taraflar yazılı ve yazılı olmayan kurallara, kaidelere ve kanunlara uymuyorlarsa bu zaman iş birliği yapılamaz. Normlar toplumsal karşılıklı etkileşim sistemini şekillendirir. Bu sistemde nedenler, maksatlar, faaliyet öznelere yönelme veya faaliyetin özüne yönelme, gözlemler, takdir ve vasıtalar bulunur.

Normlar kendi fonksiyonlarını hangi nedenle oluşturmalarına bağımlı olarak yerine getiriyorlar:

Davranış kalıbı gibi (yükümlülük, kaide) veya,

Davranış gözlemi gibi (diğer kişilerin tepkisi).

Tüm bunlardan yola çıkarak, eğer şahıs toplum tarafından kabul görmüş tüm normlara uyarsa, bu zaman onun davranışı sapma davranış olarak sayılmaz. Eğer o her hangi kurala uymazsa, o zaman aynı kişinin davranışı deviant sayılacak.

“Sosyal sapma” kavramı: genel kabul görmüş normlara uygun olmayan davranış gösteren grub veya şahsın davranışdır. Şahıs veya grupların böyle davranışları sonucunda normlar ihlal edilir. Sosyal sapma çeşitli şekillerde ola bilir. Sanıklar, katiller, suçlular, münzeviler, çileciler, dahiler, ünlü sporcular, ressamalar, yenilikiçiler ve tüm bu insanlar genel kabul görmüş normlardan sapıyorlar ve onlar deviant olarak adlanır.

Deviant sapma: tüm sosyal toplumların en önemli sorunlarından biri sayılır. O her zaman insan toplumunda mevcut olmuş ve olacak. Bizler ne kadar fazla bundan kaçınmak istersek bile deviant adlanacak insanlar mevcut olacak. Bulundukları toplum tarafından kabul görmüş kural ve normlara uygun hayat sürmeyi beceremeyen veya bu kural ve normları sevmeyen insanlar mevcut olacak.

Böyleki çeşitli sosyal toplumlar sosyal sapma yönünden bir-birlerinden farklılık taşıyorlar. Çeşitli sosyal toplumlarda çeşitli sayıda “deviant” sayılacak kişiler mevcut olabilir. Bunun dışında çeşitli toplumlarda çeşitli derecelerde deviantlık mevcut ola bilir. Sosyal normlardan orta derecede sapma mevcuttur ve bununla toplum diğerlerinden farklılık göstere bilir.

Bazı eylemler belirli toplumlarda hukukdışı davranış olarak kabul edilir. Bazı eylemler ise tüm toplumlarda hukukdışı sayılır. Kendi vatandaşlarının ölümünü kabyl eden veya insanları onların rızası dışında kendi mal varlıklarından yoksun bırakan eylemleri af eden toplum mevcut değil. Böyleki alkollü içecek bir çok islam ülkelerinde kanuna aykırı davranış sayılır, uyuşturucu maddelerin yaygınlaştırılması ise ölüm cezasına çarptırılır. Rusya ve Fransada belirli durumlarda alkollü içecek içmeme genel kabul görmüş davranış normlarını bozma sayılır. Hollandada ise uyuşturucu açık tüketilir.

Eğer bilimsel açıklama yaparsak deviant davranış, deviantlık (latince: deviatio – sapma):

1. Belirli toplumlarda resmi olarak düzenlenen veya fiilen konulan norm ve gözlemlere uygun olmayan davranış gösteren insan hareketidir.
2. Toplumda resmi olarak düzenlenen veya fiilen toplanmış norm ve beklentilere uygun olmayan, genel olarak kitlesel ve oturaklı insan faaliyetinde belirginleşen sosyal olgulardır.

Genel olarak toplumda deviant davranış kontrolü simetrik değil: kötü yöne eğilim kınanır, iyi yöne ise taktir edilir. Sapmanın pozitif veya negatif yönde eğilimine göre tüm deviasyonları bir kaç kutupa yerleştirebiliriz. Onun bir kutupuna maksimum derecede olumsuz karşılanan davranış gösteren insan grubu yerleştirilir: devrimciler, terörcüler, gayriyurtseverler, siyasi mürteciler,

vatan hainleri, ateistler, sanıklar, vandallar, ahlaksızlar, dilenciler. Diğer kutupundaysa maksimum olumlu karşılanan davranış gösteren grub yerleştirilir: milli kahramanlar, seçkin sanatçılar, sporcular, bilim adamları, yazarlar, ressamalar, politik liderler, misyonerler, emekçiler. Eğer bizler istatistik hesap yaparsak, o zaman normal gelişmiş toplumlarda, adi şartlarda, bu grublardan her birine ahalinin toplam sayısının % 10-15 ait olacağını göre biliriz.

Deviant davranışın oluşum sebebini açıklamaya çalışan çeşitli teoriler mevcuttur.

Deviant davranış fiziksel türleri ile ilgili teori takipçileri arasında Ç. Lombroz, E. Kretşmer, V. Şeldon gibilerini göstere biliriz. Bu yazarların çalışmalarında bir temel düşünce mevcut değil: belirli fiziksel vücut yapısına sahip insanlar toplum tarafından kınanılan sosyal sapmalar (aykırı davranışlar) yapıyorlar. Amerikan doktoru Uilyam Şeldon insan davranışıyla ilgili tahminlerde bulunmak için onun vücut yapısını öğrenme önemliliğinin altını çizmiştir. O belirli vücut yapısının belirli kişilik özünü yansıttığını düşünüyor. Endomorf – yuvarlak vücut yapılı, ılımlı ölçüde dolgun insanlardır. Bu türlü insanlara munislik ve insanlarla iyi geçinme becerisi özgürdür. Mezomorf – kuvvetli ve düzgün vücut yapılı insanlardır. Bu türlü insanlar rahatsızlığa doğru eğilim gösteriyor, aktiftir ve ağrıya çok duyarlıdır. Ektomorf – ince ve zayıf vücut yapılı insanlardır. Kendini tahlil yönümlüdürler, yüksek duyarlılık ve asabiliğiyle seçilirler. U. Şeldon en fazla deviant yönümlü davranış gösteren ve kanunları ihlal eden insanların mezomorf yapılı insanlar olduğu sonucuna varmıştır. Uygulama fiziksel yapıyla ilgili teorilerin yetersiz olduğunu göstermiştir. Şişman yüz yapısına sahip fertlerin ağır suç işledikleri ve aynı zamanda kaba vücut yapılı fertlerin ise hatta karıncaları bile incitmez olduğu durumlar her kese bellidir.

Sapma davranışla ilgili psikolojik-çözümsele teorilerin temelinde, kişilik algılamada oluşan yetersizliklerin öğrenilmesi durur. Z. Freyd teorisine göre aktif algılamaya sahip her kişide insiyaki oluş alanı bulunur – bu bizlere ait psikolojik enerjidir, burada tüm doğallık ve ilkelik toplanmıştır. İnsan kendi doğal “kanunsuz” halinden, kendi benliğini şekillendirme ve aynı zamanda toplum kültürüyle belirlenen benliğindeki yüce duyguları şekillendirme yoluyla koruna bilir. Ben ve insiyaki oluş arasında ve aynı zamanda benlik üstü ve insiyaki oluş arasında çatışma korunma duygusunu dağıtır ve bizim kültür dışı iç dünyamız dışarıya yansıdığı zaman böyle durumlar oluşa bilir. Bu durumlarda kişini çevreleyen toplum tarafından işlenip hazırlanmış kültür normlarından sapma oluşabilir.

Robert K. Merton deviasyonun sebebini, toplumun kültürel maksatları ve onlara ulaşmanın toplumsal açıdan taktir edilen vasıtaları (yasal veya enstitüsyonel) arasında kopma olduğunu düşünür. Örneğin: eğer insan beceri ve istidatının (yasal vasıtalar) yardımıyla refaha ulaşamıyorsa bu zaman o yalana, sahtekarlığa veya hırsızlığa, rüşvete yönelebilir. Şimdi sporun bir kaç dalında toplumca kabul görmeyen vasıtaların kullanıldığı görülür (İtalyan ligindeki skandalı hatırlaya biliriz). R. Merton tarafından, kişinin maksat ve vasıtalarla karşılıklı etkileşiminde davranış tipolojisi konusu işlenmiştir.

Konformist: toplum tarafından kabul görmüş kültürel maksatları ve aynı zamanda enstitüsyonel vasıtaları kabul eder ve toplumun loyal üyesidir;

Yenilikçi: kültürel maksatlara (onun tarafından kabul edilen) enstitüsyonel vasıtalar olmadan (kanuna aykırı ve kriminal içerikli olanlar dahil) ulaşmaya çalışır;

Ritualis: mutlaklaştıran enstitüsyonel vasıtaları kabul eder, ancak bu vasıtaların yardımıyla ulaşması mutlak olan maksatları aldırılmaz veya unuttur. Tören ve kaideler ritüeller için temel davranış ve aynı zamanda orijinal sayılır, kendine özgü vasıtalarla ise onlar yüz çevirir.

Münferit tip: ulaşılması mutlak olan kültürel, geleneksel maksatlar ve aynı zamanda enstitüsyönel vasıtalardan uzaklaşır (örneğin: sefiller, uyuşturucu ve alkol bağımlıları).

İsyancılar: vasıtalar ve aynı zamanda kültürel maksatlar konusunda kararsız kalır; yeni normlar ve değerler sistemi ile onlara ulaşmanın yeni vasıtalarını yaratmak isteğiyle mevcut olan maksat ve vasıtalardan vazgeçiyor.

Stigmasyon veya yafta (etiket) yapıştırma teorisi: toplumun nüfuslu kesimi tarafından bazı sosyal veya milli kesime ait deviantlara damga yapıştırılmasıdır (çingene, zenci, kaffas milleti). Stigmasyon teorisi (yafta yapıştırma), seçkin grubun sayca azlık oluşturan “deviant” grub üyelerine yafta yapıştırması gibi aykırı davranışından bahs ediyor. Amerikada “zenci” kelimesi konuşma diline böyle getirilmiştir. Onlar takipe maruz kalmışlar ve bazen de beyaz tenli kadınlara tecavüz suçundan dolayı yanlış olarak linç edilmişlerdi.

Böylece sapmaları, kültürel açıdan takdir edilenler ve kınanılanlar olarak ayırt edebiliriz.

Kültürel açıdan takdir edilen sapmalar: Takdire şayan davranışlar, toplumca kabul gören kültür açısından değerlendirilir. Buraya herhangi olumlu özel davranışlarıyla genelden ayrılan insanları saya biliriz. Örneğin: ünlü aktörler, sporcular ve s. Böyle kişiler toplumun büyük kesimi için idealdirler.

Toplumsal açıdan taktir edilen sapma davranışın gereken tarz ve niteliğini ayırt etmemiz gerekir:

Üstün entelektüellik: Yüksek entelektüelliğe, sınırlı sayıda sosyal statüye ulaşmayla beraber, taktire şayan toplumsal sapma davranış tarzı gibi bakıla bili. Entelektüel bilgidin yoksun olma büyük bilim adamı veya kültür sanatçısı rolünü yapanlar için mümkün değil. Ve aynı zamanda yüksek entelektüellik daha az aktöre, sporcuya ve politikacıya gerekir;

Özel istidat: Çok dar ve özgül faaliyet dallarında benzersiz nitelikleri ortaya çıkarmaya izin verir;

Yüksek motivasyon: Bir çok sosyoloji uzmanları yoğun motivasyonun, çocuklukta veya genç yaşlarda geçirilen heyecanın veya yoksun kalmanın tanzim edilmesi gibi düşünülür. Örneğin: Napoleonun çocuklukta yaşadığı yalnızlık sonucunda başarıya ve iktidara ulaşmak için yüksek motivasyona sahip olduğuyla ilgili düşünceler mevcuttur. Diğer bir örnek, ünlü futbolcu Garrinç her zaman futbolde ilk olmak peşindeydi. Bu ise, onun çocuklukta geçirdiği sakatlıktan dolayı yaşlıları tarafından alay edilmesinden doğduğu söylenir;

Kişisel nitelikler: üstün kişiliğe ulaşmaya yardım eden kişisel çizgiler ve karakter özlüğü;

Mutlu vakalar: Büyük başarılar – bunlar yalnız belirgin ifade edilmiş yetenek ve istek değil ve aynı zamanda belirli yerde ve belirli zamanda onların tezahürüdür.

Gençleri aykırı davranışlardan saptırmada ve onları topluma kazandırmada esaslı rolü spor yapıyor.

Spor: benzersiz toplumsal gelişim enstitüsüdür. İnsan ve insanlık aleminin hareket faaliyeti kültürünün yaygınlaştırılması ve özümlemesidir. Sporun, insanlar arasında, insanlarla doğal olgular arasında ve insanın kendisiyle mücadelede rakiplik kavramıyla bağdaştırılması genel kabul görmüştür.

“Spor” kavramı eski fransız ve ingiliz kelimesi olan “de sporte” kelimesinden alınmıştır. Bu kelime eğlenme, eğlendirme, eğlence anlamını taşıyor.

Spor kavramının şimdiki içeriği yukarıdaki tanıma kısmen uygundur. Şimdiki zamanda sonuç egemendir, yani sonuçların karşılaştırılmasıyla elde edilen sonuç. Ancak izleyiciler için başlangıç anlam muhafaza edilir ve spor temaşa olarak kalıyor.

Araştırmacıların dikkati dışında bırakılmayan sıradaki konu spordaki değerlerdir. Spor faaliyeti alanında kıymetli olan nedir, sporcular hangi değerleri seçiyorlar: dürüslük veya nasıl olursa olsun

zafer. Sporda güzellik ve şiddetin hangi tarzda uygunlaştırıldığı sorusu ilgi çekiyor. Bununla bile bu uygunlaşma uyumluluğuyla seçilir və gözlemcilerin kafasında soru işareti oluşur. Elbetde şiddet çeşitli spor dallarında mevcuttur. Genel olarak şiddet, mevcut spor dalında yarış kurallarının nasıl kabul edilmesiyle bağlantılıdır. Örneğin: golfde yarış kuralları daha fazla geniştir ve şiddet derecesi gözlemlenmiyor. Temas sporlarında şiddet daha fazla belirginleşir. Örneğin: futbol, ragbi, hokey gibi. Savaş sporlarında şiddet derecesine göre rekorcudur. Örneğin: boks, güreş, doğu sporları gibi.

Diğer konu – dürüst oyun konsudur. Dürüst oyun, toplumsal norm ve değerler gibi spor türüdür. Ancak zamanla daha geniş yayılmıştır. Eğer sporda sonuç temel maksatdırsa, o zaman başarı elde etmede dürüst olmayan usullerin özendirilmesi sık-sık görülür. Bunlar “dürüst oyun düşüncesinin tam olarak yok olmasına” getirip çıkaracağı araştırmacıları ilgilendirir. Kendi türünden karşı anlamlar oluşur: ilk olarak, mutlak sonuca ulaşmak için sert rekabet; ikinci olarak, dürüst oyun yapma. Xans Lenk dürüst oyunu iki şekle ayırmayı teklif ediyor: resmi ve gayriresmi. Gayriresmi dürüst oyun, önceki olimpiyat oyunlarında olduğu gibi centilmence davranış ve şovalyelik gibi karşılanır. Per Kuberton olimpiyat oyunlarının şovalye ruhuyla fark taşıdığını kayd ediyor. Temel konu – dürüst ve eşit yarışmadır. Bu gayriresmi dürüst oyuna örnektir.

Olimpiyat oyunları tarihinde gayriresmi dürüst oyuna çok fazla örnek göre biliriz. 1928 yılında yapılan oyunlarda Fransız eskrimcisi Lyusen Goden rakibinin flöresine dokunmuştur. Ne zaman oyun hakemi “isabet etmediğini” ilan etdi. Golden öne çıkmış ve isabet etdiğini söylemişti. Oyunun sonuçları onun yararına olmadan yeniden gözden geçirildi. Diğer olay 1956 yılında Melburnda kayd edilmiştir. Bu oyunlarda 3000 metr uzaklığa manilerle koşuda olimpiyat birincisinin sonuçları diskalife edilmiştir. Böyle ki, onun arkasınca koşan rakipleri onun kendilerini geciktirmediğini belirtmişler.

Bu gün spor yarışmaları biraz başka türdür ve yukarıda belirtilenlerin mevcut olduğunu düşünmek zordur. Sık-sık dürüst oyun görüntüsü oluşturulur ve esas olarak aykırı davranışların ortaya çıkmaması ve farkedilmemesine çalışılır. Böyleki dünya şampiyonasının önemli maçlarından birinde Maradona eliyle gol attığı zaman hakem bunu fark etmemiş ve golü kabul etmiştir. Maradona şimdiye kadar bunu itiraf etmiş değil. Dopinge ilgili durumlar resmi olarak kınanılır, ancak gizli olarak kullanılır ve yeni ilaçların hazırlanması genişlendiriliyor. Doping niteliğinde tanınmayan ve ortaya çıkarılması zor olan ilaçlar da mevcuttur.

Spor psikolojisi aynı zamanda takımda kaçınılmaz olarak yaşanan çatışmaları öğrenir. Bu çatışmalar onların gelişim sürecini aşıyor. Ancak sürekli kişilik arası çatışmalar istenmezdir. Çünkü bunlar karşılıklı etkileşimi bozar ve sporcunu sonuca değil, çatışmanın subjektif çözümüne yönlendirir. Sporcular kişisel özelliklerine bağımlı olarak çatışma çözümünün çeşitli usullerini kullana bilirler (örneğin: rakiplik, işbirliği, uzlaşma, kaçınma, uyma).

Sporcuların “motivasyon yapıları” (“maksatsal yönelme”, “değerler”, “kendi kuvvetine güvenme”), aynı zamanda maksatlı temel yönelimler olan “benlik” veya “soruna doğru” kavramları öğrenildiği zaman bunların çoğunlukla sporcunun antreman ve takımdaki patnerleri ile olan ilişkisini ortaya çıkardığı görülür. “Yönlendirilmiş” sporcular, takım sporlarında yüksek özel toplumsal statüsüyle fazla kaygılıdır. Sporcunun hareketi – onun sonuca varması için, örneğin zafere ulaşması için mutlak yapmalı olduğu hareketdir. Nedene (şampiyon olamak için, kalibiyet için) uygun olarak sporcu hareket yapar.

Spora ilave ile ilgili çatışma teorisi yaratıcıları spora, çatışmaların yardımıyla gelişen ve onun tarafından özendirilen toplumsal öğreti gibi baka bilirler. Örneğin, spor takımı içinde oluşan

çatışma onun beraberlik oluşturmaya ve iç birliğin oluşumuna yardım eder. Çatışma teorisi yaratıcıları, kabul edilen grubu temel ilişkileri ihlal etmeyen, yalnız maksata, değerlere ve çıkarlara yönelik iç çatışmaların fonksiyonel pozitif özellik taşıdığını onaylıyorlar. Eğer çatışma gelişim sürecinde, takım içinde mücadele eden taraflar kendi temel değerleri ve normlarını değiştirirlerse o zaman bu çatışma olumsuz anlam taşıyacak ve sonuç olarak spor takımı dağılabilir.

Sporda grubu arası çatışmaların benzeri yarışmalar veya spor oyunları olabilir. Bu çatışmanın daha hafif şekilde ilk örneğidir. Takımlar arasında sporcuların kavga yapmaları şeklinde çatışmalı durumlar oluşabilir. Örneğin: sonuncu dünya şampiyonasında Zidan ve Maserratinin çatışması gibi veya Mayk Tayson ve Evander Hollifild arasında oluşan olay gibi. Bunun dışında sporcular ve hakemler arasında da çatışma çıkabilir. Bu da spor alanında oluşan çatışmalara örnektir (Pekin olimpiyat oyunlarında Kubadan olan doğu sporları spocusu yenilgeden sonra hakeme vurmuştur). Sporda çatışma bütün ülkeler arasında oluşabilir. Örneğin, ABD ve Sovyetler Birliği arasında çatışma oluşmuştur. Ancak böyle çapda çatışmaları karşı konum adlandırabiliriz. Bu türden çatışmalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Onlar daha komple içeriktedir ve hayatın bir kaç alanına dokunur.

Spor – milli grubun timsali, birlik kaynağı ve aynı zamanda politikacılar tarafından kendi ülke vatandaşlarına ve aynı zamanda diğer ülke vatandaşlarına belirli politik düşünceleri telkin etme için kullanılan mekanizmadır.

Örneğin, nazi Almanyasında spor, nazi rejimini haklı çıkarma ve onaylama için mekanizma olarak kullanılıyordu. Alman sporcularının kalibiyeti sanki politik sistemin doğruluğunu onaylıyordu.

Spor devlet milliyetçiliği için kullanılır. Bu bir kaç Afrika ülkesinde oluşmuştur. 1956 yılında Güney Afrika Cumhuriyetinde Milliyetçi parti beyaz ve siyah tenlilerin kendi spor faaliyetlerini ayrı olarak düzenlemeli olduklarını ilan etmiştir; Bunun dışında Güney Afrikada ırklararası yarışmalar olmamalı, ırkların karışımı olmamalı, diğer ülkelerden olan sporcular ise Güney Afrika geleneklerine kendi geleneklerine olduğu gibi saygı duymalıdır. Güney Afrika spor politikası aleyhine çoğunlu protestler yapılmıştır. Sonuç olarak Güney Afrika hükümeti spordaki kendi ırkçı politikalarını değiştirmek ve spor alanında batıyla olan ilişkilerini iyileştirme için belirli önlemler almak micburiyetinde kalmışlar.

Politika ve spor alanındaki karşılıklı etkileşimde özel durumlar spor ve milli özerklik sorunudur. Milli özerklikte sporun politik rolünü, bir taraftan politik vasıtaların diğer milletlerden (her şeyden önce aynı devletin komşularında) kendi farklılıklarının altını çizmeleri ve diğer taraftan münferitliğin mutlak olması egemen devletlerde olduğundan daha sert duyulması hesabına daha belirginleştiğini tahmin edebiliriz. Öyle durumlarda bulunur ki, spor devlet içindeki milli “egemenliğin” tek faktik sıfatı olur. Örneğin: böyle durum kendi özel futbol ve diğer takımları bulunan İskoçyada oluşmuştur. İskoçyada uluslararası spor yarışmalarında belirli kültürel bölgeni ayrı özne gibi temsil eden spor takımları, bunun dışında de facto İskoçyalıları diğer milletlerle spor alanında eşitleştiren takımlar da bulunur. Genel olarak spor avrupa milli bölgelerinde örneğin İskoçya, Uels, Büyük Britanya, Fransa ülkelerinde veya İspanyadaki Bask ülkesinde ve Katalonyada açık politik rol yapar. Bu ise araştırmacıların çalışmalarına yansımıştır.

2004 yılında Atinada yapılan Olimpiyat oyunlarında, İspanyanı temsil eden jimnastikçi Almudena Sid tüm konferanslarda Bask ülkesinin yanında olduğunu ve kendi ana dilinin bask dili olduğunu altını defalarla çizmiştir.

Кendi devletlerinin bulunmaması ve yalnız kendi takımlarının ve futbol klüblerinin olması ulusu özdeşleştiremez. 1992 yılında Katalonyanın başkenti Barselonada yapılan Olimpiyat oyunlarını örnek olarak göstere biliriz. Madridin onayı alındıktan sonra onlar bu olimpiyat oyunlarını kendi kültür farklılıklarını gösterme ve onaylama niteliğinde kullanılmışlar.

Böyle bir sonuca varabiliriz ki, belirli toplumda vatandaş enstitüleri ne kadar fazla gelişmişse, etniklerarası çatışma ve suverenlik sorunlarında spor daha fazla kullanılacak. Bunun dışında Rusya hükümetinin Çeçen sporunu dünyaca desteklemesi olgusunu göstere biliriz. Şimdi çatışma enerjisinin bir kısmının spor alanındaki yarışmalara yansıtıldığını göre biliriz (“Terek” futbol klübünün Moskova şehrinde yakın zamanda yaptığı maçı örnek gösterebiliriz).

EDEBİYYAT

1. Cashmore E. Making Sense of Sports: E. Cashmore. - 3rd ed.-London; New York: Routled, 2001.
2. Collins dictionary of sociology / Jary, David, Jary, Julia. - L.; NY: HarperCollins, 1991.
3. Frey J.H., Eitzen D.S. Sport and Society // Annual Review of Sociology, Vol. 17. (1991), P. 503-522.
4. Gunther L. Sociology of Sport: Development, Present State, and Prospects // Annual Review of Sociology, Vol. 6. (1980), P. 315-347.
5. Horrel M. South Africa and the Olympic Games. Johannesburg: South Africa Institute of Race Relations. 1986.
6. Snyder E.E. Social aspects of sport / 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1989.
7. Sociology of sport: theory and practice / Armour, K.M., Jones R.L. - L.: Longman, 2000.
8. Sport in contemporary society : an anthology / Eitzen, D. Stanley; compiled by D. Stanley Eitzen. - 4th ed. - NY: St. Martin's Press, c1993.
9. Апциаури Л.Ш. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности // Теория и практика физ. культуры. 2003. №1. С. 12-14.
10. Бальсевич В.К. Олимпийский спорт и физическое воспитание: взаимодействие и диссоциации // Теория и практика физической культуры. –1996. – № 10.
11. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность // Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 4.
12. Гумберт Ханс Ульрих Форма насилия. Похвальное слово красоте спорта // Неприкосновенный запас 2004 №3 С. 82-87
13. Гуськов С.И. Любители или профессионалы? – М.: Знание. Серия «Физическая культура и спорт». – 1988.
14. Жолдак В.И., Коротаева Н.В. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. – Малаховка, МОГИФК. 1994. – 295 с.
15. Кон И.С. Социология личности. – М. – 1967.
16. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. - М.: Академический проект, 2000.
17. Кузин В.В. Современное состояние и перспективы развития физической культуры и спорта в России // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 9.
18. Ленк Ханс Этика спорта как культура честной игры Неприкосновенный запас 2004 №3 С. 88-94.

19. Лубышева Л. И. Женщина и спорт: социальный аспект // Теория и практика физ. культуры. 2000. №6. С. 13-15.
20. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. 2001.
21. Матвеев Л.П. Общая теория спорта - М.: 4-й филиал Воениздата, 1997.
22. Стамбулова Н.Б. Кризисы спортивной карьеры // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 10.
23. Столяров В.И. Спорт и современная культура. //Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 7.
24. Столяров В.И. От гуманистической теории спорта - к теории гуманизации соперничества // Теория и практика физ. культуры. 2003. №5. С. 13-15.
25. Теория и методика спорта. Учеб. пос. для УОР // Под ред. Ф.П. Суслова, Ж.К. Холодова, В.П. Филина. - М.: 4-й филиал Воениздата, 1997.
26. Философия и социология спорта в XXI веке ("Круглый стол" журнала "Теория и практика физической культуры" совместно с кафедрой философии и социологии РГАФК (29 марта 2000 г.)) // Теория и практика физической культуры. 2000. №6. С. 46-55.
27. Шахлина Л.Г. Проблемы полового диморфизма в спорте высших достижений// Теория и практика физ. культуры. 1999. №6. С. 51-55.

THE MAIN FEATURES OF BREAST CANCER IN YOUNG WOMEN AND MODERN APPROACH IN SURGICAL TREATMENT

Vafa Veliyeva

Azerbaijan Medical University, Department of Oncology Baku, Azerbaijan

ABSTRACT

Breast cancer is the most common type of cancer in women. In our country about 20% of breast cancer patients are women under 40 years. So, 675 breast cancers have been registered in the Oncology Clinic of the Azerbaijan Medical University where I work, and 65 of them are women under 40 years old. The main feature of breast cancer in young women is the occurrence of a more aggressive form of the disease and the late stage. 80% of young women with breast cancer go to the doctor after finding a tumor in the breast. Because, unlike older women, young women prophylactic mammography is not performed. Therefore, because glandular tissue predominates over adipose tissue in young women, changes in the mammary gland are more pronounced on ultrasound than on mammography. Older women have more adipose tissue, so the tumors formed on this background are more pronounced on mammography. Pathohistological and immunohistochemical examination play an important role in the diagnosis, treatment and prognosis of the disease. Young women are more likely to have triple negative and her+ forms and a high grade of tumor differentiation. Genetic factors and family history also play an important role in the development of the disease in young women. So, women with mutations in the BRCA 1 and BRCA 2 genes in the family are at high risk. In addition, early contraceptive use, radiation therapy to the chest, early menarche, unhealthy diet, stress and other factors play an important role in the development of the disease. In young women with breast cancer, the probability of developing cancer in other breast is 13% in 10 years. If there are genetic factors, it rises to 60%-80%. The method of treatment is selected depending on the molecular biological characteristics and stage of the tumor. Surgery, chemotherapy, radiotherapy, targettherapy are used in the treatment. In the surgical treatment of breast cancer, more breast conserving surgery are performed, taking into account the psychological condition and aesthetic appearance of young women. For this purpose, various oncoplastic operations, nipplesparing mastektomi with implant reconstruction and other reconstructive operations are performed As for the prognosis, young women are more unsatisfactory than older ones. The risk of recurrence and metastasis is higher in young women than in the elderly. However, despite all this, young women respond better to treatment than older people.

REFERENCES

1. Rosenberg SM, et al. Breast 2015 [Management of breast cancer in very young women]
2. Ribnikar D, et al. Curr Treat Options Oncol 2015 [Breast cancer under age 40: a different approach]
3. Henry NL, Shah PD, Heider I, Freer PE, Jaqsi R. Chapter 88. [Cancer of the breast.] Elsevier 2020
4. National Cancer Institute. Physician Data Query (PDQ). [Breast Cancer Treatment] 2019

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ОБОНЯТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ COVID-19

¹Мерей Алиева, ²Динмухамед. Аяганов, ³Самат Сапарбаев

¹PhD 3-года обучения по специальности «Медицина», ²PhD, руководитель кафедры неврологии с курсом психиатрии и наркологии, ³к.м.н., проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству, член Правления.

^{1,2,3}НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», Казахстан.

Email: ¹aliyevamerey7@gmail.com; ²dimash.83@mail.ru; ³samat-saparbayev@mail.ru

РЕЗЮМЕ

Внезапная anosmia и/или ageusia является одним из первых и значимых симптомов COVID-19, которые проявляются при хорошем самочувствии и благополучном течении заболевания. Цель исследования: провести анализ неврологических нарушений при COVID-19 и представить результаты по периферической нейропатии обонятельного нерва. Нами представлены результаты 39 (32%) пациентов с обонятельной дисфункцией полученных среди 121 пациентов с положительным тестом ОТ-ПЦР на COVID-19. Данные были собраны с помощью опроса и анкетирования, основанного на инструменте отчетности об anosmia ААО-HNS. Большинство лиц (32 пациентов) не имели тесного контакта с положительным случаем в недавнем прошлом. В основном пациенты восстанавливали обоняние в течение 1-2 недель со дня возникновения anosmia. На сегодняшний день механизмы anosmia при SARS-CoV-2 пока не ясны. Остается спорным, являются ли anosmia результатом повреждения нервов или воспаления обонятельных нервов, что требует дальнейших исследований.

Ключевые слова: anosmia, потеря обоняния, дисгевзия, нейровоспаление, обонятельная дисфункция, SARS-COV-2, COVID-19.

Введение: С начала пандемии COVID-19 большое количество пациентов обращались за медицинской помощью с жалобами на снижение (гипосмия) или отсутствие обоняния (аносмия). Аносмия может быть единственным отличительным проявлением COVID-19 и встречаться чаще, чем при обычной инфекции верхних дыхательных путей [8]. Распространенность anosmia у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, представлена в диапазоне от 5,1 до 85,6% [7]. Центр по контролю заболеваний США в настоящее время признает anosmiu и ageusiu в качестве основного признака COVID-19 [1]. Британская ассоциация оториноларингологии [3] и Американская академия отоларингологии [2] – хирургии головы и шеи предложили добавить симптомы обонятельной и вкусовой дисфункции в список инструментов для выявления возможной инфекции COVID-19. Доказано, что SARS-CoV-2 проникает через мембрану клетки в местах, где находятся трансмембранные рецепторы АПФ2 (англ. ACE2) и получает доступ к клетке-хозяина. Рецепторы ACE2 высоко экспрессируется в клетках альвеолярного эпителия, слизистой оболочки полости носа и рта, эндотелий, сердца, почек, лимфоидных органов, семенников, кишечника и мочевыводящих путей. Обонятельная дисфункция у госпитализированных пациентов с заболеванием легкой и средней степени тяжести, а также долгосрочное восстановление обонятельной функции после COVID-19 мало изучены. Опубликованные

данные зарубежных исследователей основаны на методах анкетирования, онлайн-опросников, телефонных консультаций т.е. без объективного тестирования [10]. В данной статье приведены данные о распространенности anosmia в одном из провизорных центров за один месяц у пациентов с верифицированным диагнозом COVID-19 в г. Актобе. В качестве второстепенных задач мы стремились проанализировать частоту восстановления обонятельной функции в течение периода исследования и конкретные характеристики гипо/аносмии (связь с другими назальными симптомами, продолжительностью и временем восстановления).

Цель исследования: анализ неврологических манифестных симптомов при COVID-19.

Материалы и методы: Настоящее исследование было начато после одобрения этического комитета ЗКМУ имени Марата Оспанова (номер разрешения: 6 (782)) и получения информированного согласия пациентов. Было проведено проспективное исследование с 1 марта по 31 марта 2021 года. В нашем исследовании участвовали 121 пациент с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, госпитализированные в перепрофилированные провизорные центры г. Актобе. Критерии включения: взрослые (> 18 лет) и пациенты, клинически способные пройти тестирование. Критериями исключения были: ранее существовавшие обонятельные или вкусовые нарушения; продолжающийся острый или хронический риносинусит; перенесенная тяжелая травма головы, пациенты без подтвержденного диагноза инфекции COVID-19 (ОТ-ПЦР, КТ или рентген органов грудной клетки), пациенты с нейродегенеративными заболеваниями, недееспособные и пациенты, получающие лечение ингаляционными глюкокортикостероидами. Данные, которые были оценены, включали возраст пациента, пол, эпиданамнез, начало anosmia, другие респираторные симптомы, сопутствующие заболевания, статус курения, любые вкусовые жалобы и время восстановления обоняния. Все данные были получены методом устного опроса на основе осмотра и неврологической оценки, разработанной ААО-HNS (Американская академия отоларингологии - хирургии головы и шеи). Статистический анализ. Связь между эпидемиологическими, клиническими, обонятельными и вкусовыми данными оценивалась путем создания перекрестных таблиц между двумя переменными (бинарными или категориальными) и критерий хи-квадрат. Уровень $p \leq 0,05$ использовался для определения статистической значимости.

Результаты и их обсуждение: Мы провели анализ неврологических манифестных симптомов при COVID-19. Ранее нами были опубликованы результаты о характере и особенностях головной боли, инсомнии. В настоящей статье мы хотим представить результаты периферической невропатии обонятельного нерва. Наше исследование имеет несколько ограничений, во-первых, участники не проходили специальных объективных тестов на обонятельную / вкусовую функцию. Во-вторых, для подтверждения долгосрочного обонятельного дефицита необходим более длительный период наблюдения. Всего пациентов в исследовании 121 с подтвержденным COVID-19 методом ОТ-ПЦР, из них 72 мужчины (59,5%) и 49 женщин (40,5%). В ходе исследования выяснилось, что 39 (32%) пациентов предъявляли жалобы на нарушения обоняния и/или вкуса, из них мужчин – 25 (64%), женщин- 14 (36%), однако связь между обонятельной

дисфункцией и полон не была статистически значимой. На ассоциированные факторы риска, т.е. близкий контакт с положительными случаями COVID-19 или на историю поездок в эндемичные места указали 7 (18%) пациентов. Головная боль была наиболее частым симптомом - 67% за которым следовали кашель - 54%, боль и першение в горле (46%) и только у 2 пациентов (5%) не было других сопутствующих симптомов. Ринорея была наименьшим симптомом у 15% пациентов. Аносмия присутствовала у 74% из всех 29 некурящих и 10 курильщиков (> 30 сигарет в день). Аносмия в сочетании с агевзией встречалась у 56,4%, в том числе у 8% пациентов с искаженным восприятием вкуса и эта связь оказалась статистически значимой ($p < 0,05$). Чаще всего у пациентов обоняние восстановилось в течение 8 дней. Гипотезу о временном симптоме обонятельной дисфункции и раннем восстановлении подтверждают другие авторы [6]. Такие жалобы как одышка, боль в груди или затрудненное дыхание встречались только у 7 (18%) из 39 пациентов, что может указывать на то, что наша выборка состоит в основном из легких случаев. Некоторые авторы предположили, что в случаях легкой и средней степени тяжести химиосенсорная дисфункция более распространена, чем в тяжелых случаях, когда требуется госпитализация [5,9]. Большинство пациентов сообщили, что аносмия развивалась вместе с другими симптомами, поэтому не было обнаружено значительной корреляции между обонятельной дисфункцией и ее началом. Анализ обонятельной дисфункции с сопутствующими заболеваниями и статусом курения оказался также статистически не значимым. В нашем исследовании у большинства пациентов (33%) обоняние восстановилось до 8 дней, у 26% пациентов до 14 дней (со дня потери обоняния). Однако у 8 пациентов обоняние не вернулось к норме в течение периода исследования, поэтому эти пациенты были помещены в отдельную категорию (с продолжительностью > 15 дней). Улучшение хемоцептивной функции с течением времени явно свидетельствует о конкурентном действии вируса на рецепторы обонятельных и вкусовых клеток или местных воспалительных явлениях, а не о необратимом повреждении клеток [4]. Наши результаты показывают, что аносмия и агевзия не зависят от возраста. У большого процента пациентов с расстройствами обоняния, вторичными по отношению к инфекции SARS-CoV-2, не наблюдается заложенности носа или ринореи. Наши результаты подтверждают этот вывод, т.к. более половины участников не имели этих симптомов. Кроме того, у небольшого процента пациентов (5,5%) возникла внезапная изолированная аносмия. Эти данные могут указывать на первичное неврологическое вовлечение, опосредованное независимыми или перекрывающимися патофизиологическими механизмами.

Выводы: Расстройства обоняния и вкуса можно использовать в качестве важных критериев скрининга. Наши результаты подтверждают высокую распространенность нарушений обоняния и вкуса среди пациентов с легкой формой COVID-19 и расширяют текущие знания. Более половины людей сообщили о нарушениях обоняния и вкуса без сопутствующих симптомов простуды (заложенность носа или ринорея); это может указывать на первичное поражение обонятельного нерва и ретроградную инвазию лобной доли, вызывающую нейросенсорную гипо/аносмию. Кроме того, большая часть нашей выборки показала быстрое и полное выздоровление, но обонятельные изменения сохранялись у небольшого процента участников. Необходимы дальнейшие

крупномасштабные исследования для более точного понимания патогенеза SARS-CoV-2 и долгосрочных неврологических нарушений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Al-Ani RM, Acharya D. Prevalence of anosmia and ageusia in patients with COVID-19 at a Primary Health Center, Doha, Qatar. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2020;19:1–7
2. American Academy of Otolaryngology–Head And Neck Surgery AAO-HNS: Anosmia, hyposmia, and dysgeusia symptoms of coronavirus disease. 2020. <https://www.entnet.org/content/aao-hns-anosmia-hyposmia-and-dysgeusia-symptoms-coronavirus-disease>
3. ENTUK Loss of sense of smell as a marker of COVID-19 infection. 2020. <https://www.entuk.org/sites/default/files/files/Loss%20of%20sense%20of%20smell%20as%20marker%20of%20COVID.pdf>
4. Giacomelli A, Pezzati L, Conti F, Bernacchia D, Siano M, Oreni L, Rusconi S, Gervasoni C, Ridolfo AL, Rizzardini G, Antinori S (2020) Self-reported olfactory and taste disorders in patients with severe acute respiratory coronavirus 2 infection: a cross-sectional study. *Clin Infect Dis*
5. Kaye R, Chang CWD, Kazahaya K, Brereton J, Denny JC (2020) COVID-19 anosmia reporting tool: initial findings. *Otolaryngol Head Neck Surg* 163:132–134
6. Krassowski, M. (2020). ComplexUpset: Create Complex UpSet Plots Using ggplot2 Components. R Package Version 0.5.18. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.3700590
7. Lechien, J. R., Chiesa-Estomba, C. M., De Siati, D. R., Horoi, M., Le Bon, S. B., Rodriguez, A., et al. (2020). Olfactory and gustatory dysfunction as a clinical presentation of mild to moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): a multicenter European study. *Eur. Arch. Otorhinolaryngol.* 277, 2251–2261. doi: 10.1007/s00405-020-05965-1
8. Lechner M, Chandrasekharan D, Juman K, Liu J, Gane S, Lund VJ, Philpott C, Jayaraj S (2020) Anosmia as a presenting symptom of SARS-CoV-2 infection in healthcare workers – a systematic review of the literature, case series, and recommendations for clinical assessment and management. *Rhinology* 58(4):394–399
9. Neto, D. B., Fornazieri, M. A., Dib, C., Di Francesco, R. C., Doty, R. L., Voegels, R. L., et al. (2020). Chemosensory dysfunction in COVID-19: prevalences, recovery rates, and clinical associations on a large Brazilian Sample. *Otolaryngol. Head Neck Surg.* doi: 10.1177/0194599820954825
10. Pasquini J, Maremmi C, Salvadori S, Silani V, Ticozzi N. Testing olfactory dysfunction in acute and recovered COVID-19 patients: a single center study in Italy. *Neurol Sci.* 2021 Jun;42(6):2183-2189. doi: 10.1007/s10072-021-05200-7. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33768438; PMCID: PMC7994059.

FEATURES OF PERIPHERAL NEUROPATHY OF THE OLFACTORY NERVE IN COVID-19

M.B.Aliyeva, D. N. Ayaganov, S. S. Saparbayev

¹PhD student of 2-nd course in the specialty "Medicine»,

²PhD, Head of the Department of Neurology with the course of psychiatry and narcology, e-mail dimash.83@mail.ru

³Candidate of Medical Sciences, Vice-Rector for Strategic Development, Science and International Cooperation,

Member of the Management Board, e-mail samat-saparbayev@mail.ru

NAO "West Kazakhstan Medical University named after Marat Ospanov", Kazakhstan, Aktobe

aliyevamerey7@gmail.com

ABSTRACT

Sudden anosmia and/or ageusia is one of the first and significant symptoms With COVID-19, which are manifested in good health and a successful course of the disease. Purpose: to analyze neurological disorders in COVID-19 and present the results of peripheral neuropathy of the olfactory nerve. We present the results of 39 (32%) patients with olfactory dysfunction obtained among 121 patients with a positive RT-PCR test for COVID-19. The data was collected through a survey and questionnaire based on the AAO-HNS anosmia reporting tool. The majority of individuals (32 patients) did not have close contact with a positive case in the recent past. Most patients regained their sense of smell within 1-2 weeks of the onset of anosmia. To date, the mechanisms of anosmia in SARS-CoV-2 are not yet clear. It remains debatable whether anosmias are the result of nerve damage or inflammation of the olfactory nerves, which requires further research.

Keywords: anosmia, loss of smell, dysgeusia, neuroinflammation, olfactory dysfunction, SARS-CoV-2, COVID-19.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Сеймур Гаджиев

Кафедра психиатрии АМУ.

Актуальность исследования: Социальная значимость и актуальность проблемы психического здоровья подросткового контингента определяет интерес к ней широкого круга исследователей (Иванова И.Н., 2005; Алтынбекова Г.И., 2005; Мальцев В.С., 2005; Крукович Е.В., 2007; Черняк Н.Б., 2008). Последние годы характеризуются ухудшением психического здоровья подростков, ростом девиантного поведения (Дроздовский Ю.В., 2003; Семке В.Я. с соавт., 2004; Юсан Е.В., 2005).

В детско-подростковой среде отмечен рост распространенности деструктивных форм социального поведения (Аболонин А.Ф. с соавт., 2006; Бохан Н.А. с соавт., 2006; Агарков А.П., Варанкова, Л.В., Титаренко Л.И., 2006).

В настоящее время нет однозначных данных о распространенности умственной отсталости, что объясняется рядом причин. Умственная отсталость различается по своей глубине, и ее диагностика, особенно это касается легкой степени, может быть затруднена.

По мнению Мазаевой Н.А. (2005), в подростковом возрасте наряду с низкими формальными способностями интеллекта при умственной отсталости основными факторами, предрасполагающими к дезадаптации, выступали психическая незрелость, повышенная внушаемость, неспособность самостоятельно принять решение в сложных житейских ситуациях, выраженная зависимость поведения от внешней ситуации, а также собственных неконтролируемых аффектов и влечений, импульсивность поступков, что нередко приводило к девиантным формам поведения.

Материал и методы исследования: Связи с этим нами были изучены особенности основных клинико-динамических и клинико-биологических характеристик, социальных проявлений умственной отсталости у 360 юношей в призывном возрасте, прошедших военно-врачебную экспертизу в условиях Клинической психиатрической больницы №2 г.Баку в 2008 и 2018 гг. Подобный выбор обследуемых связан с тем, что призывники, обследованные в 2008 году были рождены в 90-годы, т.е. в годы становления государственности, армяно-азербайджанского конфликта, когда страна находилась в состоянии кризиса и нехватки основных продуктов пропитания и т.п. Призывники, обследованные в 2018 году, родились в 2000 году, в период когда страна начала интенсивно развиваться, в период стабилизации экономики и жизни населения страны. Методами исследования были клинико-психопатологический, анкетирования, клинико-статистический.

Результаты исследования: Результаты проведенного исследования показали, что из общего числа обследованных у 10,2% юношей (37 человек) была диагностирована умственная отсталость различной степени тяжести (табл. 1).

Таблица 1. Диагноз, выставленный юношам допризывного и призывного возраста с признаками умственной отсталости (по МКБ -10)

Диагноз	2008		2018		P
	абс.	%	абс.	%	
F 70.0 Легкая с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения	16	8,9	7	3,9	>0,05
F 70.1 Легкая со значительным нарушением поведения, требующее ухода и лечения	5	2,8	6	3,3	>0,05
F 71.1 Средняя с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения	0	0,0	1	0,6	>0,05
F 72.1 Тяжелая со значительным нарушением поведения, требующее ухода и лечения	1	0,6	1	0,6	>0,05
Всего	22	12,2	15	8,3	-

В 2008 году по сравнению с 2018 годом показатели олигофрении среди подросткового населения оказались в полтора раза выше.

Среди призывников с умственной отсталостью, обследованных в 2008 году лишь 6,2% юношей состояли на диспансерном учете и 0,9% получали лечебно-консультативную помощь, 92,9% юношей не наблюдались по поводу психического расстройства. Среди призывников с умственной отсталостью обследованных в 2018 году 31,3% юношей состояли на диспансерном учете, 36,6% юношей получали лечебно-консультативную помощь, не наблюдались по поводу психического расстройства 32,1% юношей. Статистически достоверно ($p < 0,0001$) можно утверждать, что среди призывников с умственной отсталостью обследованных в 2018 году, наблюдающихся у психиатра и получающих лечебно-консультативную помощь (7,1%), значительно меньше, чем среди призывников с умственной отсталостью обследованных в 2008 году (67,9%). Возрастной диапазон обследуемых следующий: 2008 - $18,2 \pm 0,0$ (18-19), 2018 - $18,2 \pm 0,0$ (18-19).

Анализ семейного статуса показывает, что среди всех призывников преобладают лица, не состоящие в законном браке (97,6% в 2008 и 99,1% в 2018).

Среди многочисленных факторов, способных оказывать дезадаптирующее и стрессогенное воздействие на психическое здоровье лиц призывного возраста с признаками умственной отсталости, значительное место занимают факторы социального неблагополучия (Дмитриева Т.Б., 1999; Семке В.Я., 2001), к которым можно отнести дисгармонию в родительской семье, низкий образовательный уровень родителей, наличие у них психических или личностных расстройств и т. д. Большое значение имеет фактор «неполной семьи» (отсутствие одного из родителей, их раздельное проживание, развод, а также наличие отчима или мачехи, воспитание у родственников, в детских домах или интернатах) в развитии личностной патологии. В связи с этим нами был проанализирован состав родительской семьи у призывников с умственной отсталостью.

Исследование выявило, что в полной семье проживает больший процент призывников, обследованных в 2018 году (35,9%), чем обследованных в 2008 году (10,6%). Проживают только с одним из родителей больше призывников обследованных в 2008 году (38,4%), они чаще проживают с отчимом или мачехой (7,6%) либо не имеют не имеют родительской семьи (8,0%) по сравнению с призывниками, обследованных в 2018 году (10,4%, 4,5%, 5,7% соответственно).

Статистически достоверно можно утверждать ($p < 0,0001$), что родители призывников обследованных в 2008 году чаще являются безработными (27,5%), чем призывников обследованных в 2018 году (7,1%). Родители призывников обследованных в 2008 году опережают по показателю - работает только отец (19,4% и 17,9%), а родители призывников обследованных в 2018 году по показателю - работает только мать (35,7% и 20,9%) ($p < 0,01$). Профиль обучения юношей обследованных в 2008 и 2018 году отражен в таблице 2.

Таблица 2. Профиль обучения у лиц призывного возраста с признаками олигофрении

Профиль обучения	2008		2018		P
	абс.	%	абс.	%	
не учится:	12	6,7	3	1,7	$<0,05$
вспомогательная школа:	9	5,0	6	3,4	$>0,05$
общеобразовательная средняя школа:	0	0,0	5	2,6	$<0,05$
среднее-профессиональное:	1	0,6	1	0,6	$>0,05$
Всего	22	12,3	15	8,3	-

Как видно из таблицы большинство всех юношей – призывников хотя и не учатся (6,7% и 1,7), что указывает на низкую учебную мотивацию, в тоже время число не учившихся призывников, обследованных в 2018 году статистически достоверно ниже по сравнению с призывниками, обследованными в 2008 году. В тоже время, среди призывников с умственной отсталостью обследованных в 2018 году статистически достоверно превалирует число лиц, обучавшихся в общеобразовательной школе, что связано с расширением инклюзивного образования в республике.

Роль наследственной отягощенности для психически больных признается большинством исследователей. Именно в подростковом возрасте происходит развитие конституционально-обусловленных или приобретенных в раннем онтогенезе аномалий (Личко А.Е., 1985). Одним из главенствующих причинных биологических факторов безусловно является генетический (Гуткевич Е.В. и др., 2000, 2004; 2006; 2008). Согласно исследованиям, проведенным В.П.Эфроимсон, М.Г. Блюминой (1978), а также, по мнению В.В. Ковалёва (1995), этиологическая роль генетического фактора с возрастом меняется. В раннем детстве наследственные факторы зачастую являются непосредственной причиной некоторых заболеваний (олигофрении, ранние шизофрении). Тогда как в подростковом возрасте генетический фактор приобретает значение предрасполагающего критерия. Для проявления наследственной предрасположенности необходимо влияние пусковых факторов. Такими факторами в подростковом возрасте во многом становятся социально-психологические. Они же могут оказывать патопластическое влияние, то есть воздействовать на характер и течение тех или иных психопатологических проявлений (С.Б.

Аксентьев, И.Г. Битенская с соавт., 1987; Ю.В. Дроздовский, 2000; С.Ю. Палатов, 1999, 2000; Lorwoord P., Leboyer V., 1996).

Мы также предполагали, что у больных с умственной отсталостью, проходивших ВВК, имелась наследственная отягощенность. В анамнезе обследованных нами больных выявлялись шизофрения, другие психотические заболевания, аффективные расстройства, алкоголизм, умственная отсталость, другие не психические заболевания.

Таблица 3. Наследственная отягощенность у лиц призывного возраста с признаками умственной отсталости

Наследственная отягощенность	2008		2018		P
	абс.	%	абс.	%	
Алкоголизм (злоупотребление)	5	2,8	1	0,5	<0,05
Психические расстройства	13	7,3	6	3,3	<0,05
Не отягощена	4	2,2	0,0	0,0	<0,05
Не известно	0	0,0	8	4,5	<0,001
Всего	22	12,3	15	8,3	-

Из таблицы 3 видно, что наследственная отягощенность психическими расстройствами у юношей с умственной отсталостью, обследованных в 2008 году выявилась в 10,1% случаев, а у юношей, обследованных в 2018 году в 3,8% случаев ($p < 0,05$).

В настоящее время известно, что те или иные отклонения подростков от нормального поведения определяются особенностями беременности, родов матери и постнатального онтогенеза, когда формируется тип деятельности нейроэндокринной системы (Барашнев Ю.И. и др., 2006). Установлено, что отрицательное влияние оказывают на психическое здоровье ребенка асфиксия при рождении, родовые травмы, рождение с помощью кесарева сечения, недоношенность, сочетание этих факторов (Пиянзин А.И. и др., 2008).

Таблица 4. Патология беременности у матерей юношей-призывников с признаками умственной отсталости

Патология беременности	2008		2018		P
	абс.	%	абс.	%	
Не отмечалась	0	0,0	5	2,8	<0,05
токсикоз беременности	10	5,6	3	1,6	<0,05
угроза выкидыша	4	2,2	3	1,7	>0,05
психотравма у матери	8	4,5	4	2,2	< 0,05
Всего	22	12,3	15	8,3	-

По данным нашего исследования (таблица 4) у матерей призывников, обследованных в 2008 году патология беременности выявлялась чаще (12,3%), чем у матерей призывников, обследованных в 2018 году (8,3%) ($p < 0,05$), причем у них в основном наблюдались токсикоз беременных (5,6%) и психические травмы во время беременности (4,4%). Первое, по видимому связано с тем, что женщины в 90-е годы меньше внимания уделяли

внимания своему здоровью, не всегда вставали на учет по беременности и родам, а также в те годы многие виды квалифицированной медицинской помощи не были доступны женщинам. Второе связано с общей психотравмирующей ситуацией, в которой в тот период находилось большая часть населения страны. Патология новорожденного у юношей с умственной отсталостью, обследованных в 2008 году, выявилась в 17,9% случаев, а у юношей, обследованных в 2018 году, в 4,3% случаев ($p < 0,001$).

К социально-психологическим факторам, влияющим на психическое здоровье подростков, относятся: атмосфера, в которой растет и развивается ребенок, условия воспитания, особенности личности родителей и т.д. Многие авторы (Вострокнутов Н.В., 2001; Семке В.Я., 2003, 2004) в своих работах подчеркивали значение гармоничного воспитания и семьи для оптимального психосоциального развития детей и подростков. В связи с чем, нами были проанализированы взаимоотношения между родителями у подростков с умственной отсталостью (таблица 5).

Таблица 5. Особенности отношения в семье призывников с умственной отсталостью

Отношение в семье	2008		2018		P
	абс.	%	абс.	%	
Плохие	15	68,2	7	46,7	$<0,05$
Хорошие	5	22,7	6	40,0	$>0,005$
Средние	2	9,1	2	13,3	$>0,05$
Всего	22	100	15	100	

Менее половины призывников, как обследованных в 2008 году (43,6%), так и обследованных в 2018 году (45,6%), характеризуют взаимоотношения между родителями как доброжелательные, ровные. В тоже время, призывники, обследованные в 2008 году, по сравнению с призывниками, обследованными в 2018 году статистически достоверно характеризуют взаимоотношения между родителями как плохие (68,2 и 46,7 соответственно).

Подавляющее число призывников, обследованных в 2018 году (69,2%), по сравнению с обследованными в 2008 году (37,3%), воспитывались в условиях наказаний, запретов. В тоже время, 17,5% призывников, обследованных в 2008 году и 8,9% призывников, обследованных в 2018 году воспитывались в условиях безразличия, формализма ($p < 0,05$). Оценивают взаимоотношения как партнерские лишь 6,2% юношей, обследованных в 2008 году и 15,2% призывников, обследованных в 2018 году ($p < 0,01$).

Юношей с отсутствием нарушения социальной адаптации призывников, обследованных в 2018 году значительно больше (11,4%), чем среди призывников, обследованных в 2008 году (0,9%). Призывников с умеренно выраженными нарушениями приблизительно одинаково как у обследованных в 2008 году (74,4%), так у обследованных в 2018 году (72,3%). Резко выраженные проявления социальной дезадаптации обнаруживаются у 14,2% призывников, обследованных в 2018 году и у 26,8% призывников, обследованных в 2008 году. Исследуемые группы статистически достоверно различаются по показателю - резко выражены ($p < 0,0005$).

В процессе изучения приоритетных ценностей среди подростков у подавляющего числа юношей, как у обследованных в 2008 году (60,2%), так и обследованных в 2018 году (66,9%), преобладающее значение имело материальное благополучие, в меньшей степени создание семьи (23,2% и 3,6% соответственно) и получение профессии (1,9% и 5,4% соответственно) ($p < 0,001$).

Наибольшее количество призывников, как обследованных в 2008 году (64,9%), так обследованных в 2018 году (51,8%), находилось на иждивении родителей или других родственников. Самостоятельно зарабатывали деньги в основном физическим трудом 19,5% обследованных в 2018 году и 8% обследованных в 2008 году призывников ($p < 0,001$). На иждивении государства находились 3,3% юношей обследованных в 2018 году и 8,9% юношей обследованных в 2008 году, среди которых значительно преобладали юноши получающие пенсию по инвалидности (25% и 1,9% соответственно) ($p < 0,001$).

У подавляющего большинства юношей, обследованных в 2018 году (56,9%), свободное время было занято домашней работой, а у 50% юношей, обследованных в 2008 году, досуг не был организован и в большинстве своем они свободное время предпочитали проводить в асоциальном окружении.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что превалирование лиц с умственной отсталостью среди призывников, обследованных в 2008 году по сравнению с призывниками, обследованными в 2018 году, наличие у них признаков социальной дезадаптации, воспитания в условиях безнадзорности, недостаточного интереса родителей к ребенку и, как следствие, склонности к асоциальному поведению свидетельствует о том, что они были рождены в период наибольшего стрессового влияния негативных факторов, описанных выше на фоне различных форм патологии беременности матери.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аболонин А.Ф. Социально-психологические и клинические особенности аддиктивных расстройств у несовершеннолетних правонарушителей / А.Ф. Аболонин, Н.А. Бохан, А.И. Мандель, С.И. Гусев // Клинические и реабилитационные аспекты экзогенно-органической патологии головного мозга: Материалы научно-практической конференции Сибирского Федерального округа с международным участием (Кемерово, март 2006 г.) / Под ред. В. Я. Семке. - Томск, Кемерово, 2006. -С. 19—22.
2. Агарков А.А. Клинические и социально-демографические аспекты расстройства адаптации у подростков Томской области / А.А. Агарков, Е.С. Лесовая, А.В. Семке // Психосоматические и пограничные нервно-психические расстройства в детском и подростковом возрасте (Новосибирск, 4-6 марта 2008 г.): Материалы 1 Межрегиональной научно-практической конференции - Новосибирск, 2008. - С. 86-87.
3. Алтынбекова Г.И. Расстройства личности у больных опийной наркоманией и возможности реабилитации в условиях терапевтического сообщества: Автореф. дис. ... канд. мед. наук - Томск, 2005. - 25 с.
4. Бохан Н.А. Агрессивные тенденции у подростков с противоправным поведением / Н.А. Бохан, А.И. Мандель, И.А. Назарова, А.Ф. Аболонин // Агрессия и психическое

- здоровье населения Сибири: Материалы межрегиональной научно- практической конференции (Новосибирск, 7—9 декабря 2006 г.) / Под ред. В.Я. Семке. - Томск, 2006. - С. 34-38.
5. Дроздовский Ю.В. Клиническая динамика, принципы ранней диагностики, реабилитации и психопрофилактики патохарактерологических отклонений у подростков с девиантным и делинквентным поведением: Автореф. дис. ... д- ра мед наук / Ю. В. Дроздовский. - Томск, 2003. - 40 с.
 6. Иванова И.Н. Социально-тревожное расстройство у детей и под-ростков (этиологический, клинко-динамический и реабилитационный ас-пекты): Автореф. дис. ... канд. мед. наук/ И.Н. Иванова. - Томск, 2005. - 24 с.
 7. Крукович Е.В. Анализ некоторых показателей нервно- психического здоровья подростков / Е.В. Крукович, Н.А. Кравцова // Психическое здоровье населения Дальнего Востока. Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 15-летию юбилею Дальневосточного филиала ГУ НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН (Владивосток, 17-18 сентября 2007 г.) / Под ред. В. Я. Семке. - Томск, Владивосток, 2007. - С. 117-19.
 8. Мазаева Н.А. Типология, диагностика и коррекция нарушений школьной адаптации у детей и подростков с психическими расстройствами: Пособие для врачей / Н. А. Мазаева, О. П. Шмакова. - М., - 2005. - 38 с.
 9. Мальцев В.С. Клиническая динамика личностных расстройств, вызванных семейной дезадаптацией: Автореф. дис.... канд. мед. наук / В. С. Мальцев. - Томск, 2005. - 25 с.
 10. Семке В.Я. Охрана психического здоровья подрастающего поколе-ния (региональный аспект) / В.Я. Семке, А.П. Агарков, О.Н. Логунцова. - Томск: РАСКО, 2004. - 168 с.
 11. Черняк Н.Б. Типы течения расстройств личности с первичной диагностикой в призывном возрасте (данные 10- летнего катамнеза) / Н.Б.Черняк // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2008. - N 3. - С. 66-68.
 12. Юсан Е.В. Психотравмирующие факторы в динамике расстройств личности (клинический, социально-психологический и психофизиологи-ческий аспекты): Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Е.В. Юсан. - Томск, 2005. -25 с.

CONSTITUTIONAL, BIOLOGICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS OF RECRUITMENT AGE WITH MENTAL REDUCTION

Hadjiev S.R.

Department of Psychiatry of AMU

Abstract

This article presents the results of studying the features of the main clinical-dynamic and clinical-biological characteristics, social manifestations of mental retardation among 360 young men of draft age who underwent a military medical examination in the conditions of the Clinical Psychiatric Hospital No. 2 in Baku in 2008 and 2018. Such a choice of the surveyed is due to the

fact that the conscripts surveyed in 2008 were born in the 90s, i.e. during the formation of statehood, the Armenian-Azerbaijani conflict, when the country was in a state of crisis and lack of basic food products, etc. The conscripts surveyed in 2018 were born in 2000, during a period when the country began to develop intensively, during a period of stabilization of the economy and the life of the country's population. The results of the study revealed that among the numerous factors that can have a maladaptive and stressful effect on the mental health of people of military age with signs of mental retardation, a significant place is occupied by factors of social disadvantage, which include disharmony in the parental family, low educational levels of parents, and the presence of mental health problems. or personality disorders, etc. The factor of "incomplete family" (the absence of one of the parents, their separation, divorce, as well as the presence of a stepfather or stepmother, education with relatives, in orphanages or boarding schools) in the development of personal pathology is of great importance.

Thus, summing up the study, we can conclude that the prevalence of persons with mental retardation among the conscripts surveyed in 2008 compared with the conscripts surveyed in 2018, the presence of signs of social maladjustment, education in conditions of neglect, lack of interest parents to a child and, as a consequence, a tendency to asocial behavior indicates that they were born in the period of the greatest stressful influence of the negative factors described above against the background of various forms of mother's pregnancy pathology.

Keywords: young men of draft age who underwent a military, persons with mental retardation, medical examination.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ Г. БАКУ

Шафаг Асадова, Шарифа Вахабова

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра акушерства и гинекологии I

Введение: Изучение состояния здоровья женщин в климактерическом периоде представляет общемедицинскую проблему, т.к. находится на стыке нескольких клинических дисциплин (гинекологии, эндокринологии, невропатологии, травматологии и др.). (Акендрот К. с соавт., 1989; Алтухова А.И., 1965; Лазебник Л.Б., Маличенко Н.Ф., 1999).

Самым серьезным последствием постменопаузы является остеопороз. Остеопороз – патологическое разрежение костной ткани без изменения соотношения ее органических и минеральных компонентов, обусловленное физиологическим угасанием функции яичников. Постменопаузальный остеопороз развивается в основном в течение 15-20 лет после менопаузы, приводя к резкому возрастанию переломов в трабекулярных отделах костей (позвонки, лучевая кость, шейка бедра). На профессиональном языке врачей остеопороз называют “скрытой эпидемией”, т.к. в большинстве случаев он протекает без ярко выраженных симптомов, которые могли бы насторожить человека. О наличии у себя постменопаузального остеопороза многие женщины узнают лишь после первого перелома. В связи с этим, остеопороз периода постменопаузы занимает особое место в центре внимания различных авторов, врачей многих специальностей в течение уже более 50 лет (Михайлов Е.Е. с соавт., 1999; Hewenway D. et al., 1988; Velton L.J. et al., 1988).

Материал и методы исследования: Нами была обследована 131 женщина в возрасте 40 - 65 лет. Выделение пациенток с постменопаузальным остеопорозом (основная группа-72 больных) и без остеопороза (контрольная группа- 59 женщин) проводилось на основе данных, полученных при предварительном обследовании с помощью клинического и параклинического методов обследования. Постановка диагноза “остеопороз” проводилась по данным рентгенологического исследования, а также при помощи аппарата для определения изменения костных структур по оптической плотности рентгенограмм. У пациенток с постменопаузальным остеопорозом (основная группа) и женщин в периоде постменопаузы без признаков остеопороза (контрольная группа) определялись в крови уровни гормонов, ферментов и электролитов, способных прямо или косвенно влиять на метаболизм костной ткани, т.е. иметь отношение к развитию постменопаузального остеопороза (эстрадиол; щелочную фосфатазу; кальций). Результаты оценивались при сравнении исследуемых показателей с показателями, характеризующими их нормальный уровень.

Результаты и обсуждения: Основным клиническим проявлением постменопаузального остеопороза является наличие болевого синдрома, проявляющегося болями в костях и суставах. Наиболее часто болевые расстройства локализуются в костях нижних конечностей и в позвоночнике, с меньшей частотой – в костях верхних конечностей.

Наряду с этим, у больных с постменопаузальным остеопорозом выявляются мышечные боли, артралгии и артропатии. Они нередко сочетаются с остеохондрозом и варикозным расширением вен, вызывают болевые ощущения в суставах и ограничение их движений. Самые первые проявления артралгии отмечаются в суставах пальцев, при этом возникают жалобы на боль, нарушение подвижности пальцев, уменьшение силы рук. Следующими по локализации артралгий являются коленные и плечевые суставы. При обследовании женщин следует обращать особое внимание и на такие жалобы, как ломкость и выпадение волос, хрупкость и крошение зубов, ногтей, избыточное оволосение (гирсутизм), пигментация и шелушение кожи, уменьшение роста. Эти нарушения отмечаются у значительного числа женщин, обнаруживающих явные признаки остеопороза, что позволило нам отнести их к сопутствующим симптомам остеопороза. Указанные расстройства, на наш взгляд, являются клиническим проявлением гипоестрогемии и связанных с ней других нарушений гомеостаза. Подтверждением этого является тот факт, что комплексная терапия, направленная на устранение эстрогенного дефицита, восстановление кальций-фосфорного гомеостаза способствовала значительному уменьшению вышеуказанной патологической симптоматики. При изучении анамнестических данных установлено, что у женщин с постменопаузальным остеопорозом достоверными фактами повышенного риска развития заболевания являются: наследственная отягощенность переломами у ближайших родственников (мать, сестра и т.п.) (30,6%); сидячий характер работы (79,2%); умеренно и малоподвижный образ жизни (40,3%). Это связано с тем, что наследственная патология, дефицит физической активности, опосредованно влияют на прочность костной ткани, вследствие чего кости истончаются и становятся хрупкими.

К другим достоверным признакам риска развития постменопаузального остеопороза, мы отнесли характер питания больных, отличавшийся редким употреблением богатых кальцием молочных продуктов (творог, сыр, катык, молоко и др.), избыточным приемом соленой, грубоволокнистой пищи (76,4%); значительную подверженность стрессовым нагрузкам (77,8%), основными причинами которых, были семейная неустроенность, вдовство, одиночество, материальные затруднения, конфликты в семье и т.п. Кроме того, к достоверным факторам, подтверждающим эстрогенную недостаточность при постменопаузальном остеопорозе также относятся: а) более ранний возраст менопаузы на момент обследования; б) высокая частота атрофических изменений слизистой влагалища и сенильных кольпитов; в) редкая встречаемость гиперпластических заболеваний половых органов; г) выраженность вегето-сосудистых нарушений, относящихся к симптомам патологического климактерия.

Для объективизации диагноза "остеопороз" больным рекомендуется проводить рентгенологическое исследование трубчатых костей нижних конечностей, а именно, верхней трети бедренной кости. Наши данные показали, что рентгенологический метод является достаточно надежным методом диагностики постменопаузального остеопороза. При изучении полученных рентгенограмм у 58 больных основной группы выявлялись рентгенологические признаки диффузного остеопороза.

Полученные данные свидетельствуют о важной роли эстрогенной недостаточности в патогенезе постменопаузального остеопороза, свидетельством чего является достоверная отрицательная корреляционная связь между проявлениями климактерического синдрома,

клиническими признаками остеопороза и концентрацией эстрадиола. Это подтверждается и данным литературы (Gallager J., Nordiu B., 1973), согласно которым преждевременное угасание функции яичников или их удаление в пременопаузе способствует раннему развитию остеопороза. Авторами показано, что женщины с удаленными яичниками, на фоне гипоестрогенемии имеют более низкую массу костной ткани по сравнению со здоровыми женщинами. Возрастная гипоестрогенемия приводит к снижению активности кальцитонина, вследствие чего активизируется остеокласты и процесс рассасывания костной ткани начинает преобладать над ее восполнением.

Проблемы лечения остеопороза за рубежом изучается давно, особенно активно в последнее десятилетие. Однако до настоящего времени не разработаны общепринятые терапевтические схемы и режимы лечения этого заболевания в городе Баку. Основная цель лечебных мероприятий добиться замедления и прекращения потери костной массы, уменьшить болевой синдром, улучшить функциональное состояние больного, восстановить трудоспособность и психоэмоциональное состояние.

Для повышения эффективности лечения нами был использован принцип этапности, т.к. последовательное применение различных терапевтических методов является наиболее целесообразным и хорошо переносится больными.

На первом этапе: лечения проводились терапевтические мероприятия, направленные на регуляцию массы тела, нормализацию психоэмоционального статуса, повышение общего тонуса организма женщин. Назначалась диета, исключая сахаросодержащие и кофеин содержащие газированные напитки (фанта, пепси-кола, кока-кола), варенья, сахар, употребление кофе, алкоголя. Рекомендовалось увеличение в пище содержания продуктов, богатых кальцием, витамином D (рыба, овощи, фрукты, молоко и молочнокислые продукты – сыр, творог, йогурт).

Для снятия психоэмоционального напряжения рекомендовался прием вегетотропных (беллетаминал, белласпон, беллоид по 0,5-1 таблетки 3 раза в день), успокаивающих средств растительного происхождения (настойки валерианы, пустырника, боярышника – по 10-15 капель 3 раза в день). Первый этап лечения проводился, в среднем, в течение 1-2 месяцев.

Основным методом **второго этапа** лечения была эстроген-заместительная терапия постменопаузального остеопороза. Применяемые нами эстрогены назначались в низких дозах, которые соответствовали уровню эндогенного эстрадиола в фазе пролиферации у молодых женщин. Для лечения остеопороза мы назначали двухфазный эстроген-заместительный препарат, содержащий эстрадиол-валерат и прогестаген.

Эстроген-заместительная терапия проводилась у 42 женщин основной группы в виде монотерапии препаратом климонорм. В 10 случаях в процессе терапии были выявлены противопоказания к пероральному приему таблеток Климонаорма (гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка, заболевания печени), вследствие чего больным назначался трансдермальный путь введения эстрогенов при помощи пластыря “Климара”, содержащего эстроген-гестагенные препараты. Эстрогенные препараты назначались циклами по 3 недели с недельным перерывом.

При сочетании постменопаузального остеопороза с явлениями сенильного кольпита, атрофией наружных половых органов, нарушением эпителия влагалища больным проводи-

лась сочетанная терапия “Климонормом” с местным назначением влагалищных свечей, содержащих препарат эстриол (“Гинофлор”). При наличии противопоказаний к пероральному применению “Климонорма”, преимущество отдавалось местному лечению “Гинофлором”.

В процессе лечения в динамике гормональной эстрогензаместительной терапии, наблюдалось значительное уменьшение остеопоротических проявлений, а также симптомов климактерического синдрома. Оценка состояния больных и эффекта проводимой терапии после годичного курса комплексного лечения позволила установить, что у 19 женщин (26,4%) полностью нормализовался общий и психоэмоциональный статус, улучшились гормональные и биохимические показатели. Заместительная гормональная терапия Гинофлором у 16 женщин восстанавливала защитный микроэкологический барьер влагалищной стенки, характеризующийся редукцией неприятных ощущений, сухости влагалища, исчезновением зуда, нормализацией сексуальных отношений. При гистологическом исследовании мазка из влагалища отмечено повышение зрелости вагинального эпителия, нормализация кольпоскопической картины до значений, свойственных здоровым женщинам репродуктивного возраста.

Последующие наблюдения за этими женщинами показало, что состояние их стабилизировалось, но в весеннее и зимнее время они продолжали прием эстрогенов и препаратов, корректирующих электролитный обмен. Непосредственно после отмены медикаментозной терапии эффект лечения оценивался как “значительное улучшение”. В том случае, если через год после завершения терапии не было рецидива заболевания, результат расценивался как “практическое выздоровление”.

Улучшение состояния наблюдалось у 40 (55,6%) женщин основной групп. При опросе больных и обследовании установлено наличие стойкой ремиссии экстрагенитальной патологии, уменьшение проявлений климактерического синдрома, восстановление трудоспособности, тенденция к восстановлению эстрогенного дефицита, нормализации кальций-фосфорного обмена. Эта группа женщин после завершения курсового лечения эстрогенными и негормональными препаратами, спустя 2 месяца вновь начала прием “Климонорма”, но доза препарата была снижена до 1 таблетки в день.

Особые трудности представило лечение 11 (15,7%) женщин основной группы, которые страдали выраженными проявлениями остеопороза и патологического климактерия. На второй неделе после начала лечения “Климонормом” у этих женщин развились побочные явления: чувство тошноты, усиление головной боли, повышение артериального давления, нарушение сна. В связи с этим пероральный прием гормональных препаратов был прекращен. Гормонотерапия проводилась путем трансдермального введения эстрогенов при помощи пластыря “Климара”, сочетающихся с назначением негормональных препаратов “Ван-альфа” и “Калтрейд”. В последующие 2 месяца больные отмечали улучшение самочувствия, повышение интереса к жизни, некоторое улучшение настроения, но их, по-прежнему, беспокоили чувство тяжести в голове, снижение работоспособности, болевые ощущения в спине, суставах и мышцах. В связи с этим были проведены еще два 3-месячных курса комбинированной терапии с подключением психотропных препаратов (анафранил, гинтон, беллетаминал) и курсов психотерапии. Улучшение состояния наступило у 8 больных к концу первого года лечения, у остальных 3-х женщин изменений в состоянии не наблюдалось.

Третий этап лечения начинался спустя год после начала активного лечения и включал в себя различные реабилитационные мероприятия, включавшие: физиотерапевтию (массаж, гальванический воротник по Щербакову с бромом и новокаином, ультрафиолетовое облучение), лечебную гимнастику, адекватный пищевой режим и избирательное применение гормональных препаратов.

Представленные результаты терапии и профилактики постменопаузального остеопороза у женщин, жительниц г.Баку, свидетельствует о необходимости организации специализированных гинекологических кабинетов в женских консультациях, общих поликлиниках, для диспансерного наблюдения за женщинами в климактерическом периоде, что будет способствовать снижению частоты развития постменопаузального остеопороза у женщин в переходном возрасте.

Можно согласиться с мнением Notelovitz M. (1987) о том, что в современных условиях патологическими состояниями, сопутствующими постменопаузе, являются “не приливы жара, а угрожающие каждой четвертой женщине к 65 годам состояния физической инвалидности”. Поэтому роль гинеколога в предупреждении постменопаузального остеопороза существенно возрастает.

Наиболее важными периодами жизни для профилактики остеопороза являются периоды роста кости (девичество), репродуктивный период и постменопауза.

Как показали наши исследования, риск возникновения постменопаузального остеопороза связан с различными неблагоприятными факторами именно в эти периоды жизни женщины, которые готовят почву для развития патологического процесса в костях. Поэтому первичную профилактику необходимо начинать в девическом возрасте, которая на наш взгляд должна включать в себя: мероприятия по правильному гигиеническому и половому воспитанию девочек, учащихся средних школ, которое поможет избежать развития воспалительных заболеваний мочеполовой системы растущего организма; своевременная диагностика и лечение любых нарушений менструального цикла; пропаганда активных занятий физкультурой, гимнастикой, являющихся не только важным фактором профилактики остеопороза, но и способствующих будущим женщинам в последующем безболезненно войти в репродуктивный возраст. Важное значение имеет рациональное питание девочек, жизнь в благоприятных санитарно-гигиенических условиях. Под этим мы понимаем правильное ознакомление с нормами поведения в семье, в коллективе, умение создать благоприятные отношения, которые помогут избежать риска возникновения стрессовых ситуаций в будущем.

Для врачей акушеров-гинекологов более реальная возможность проведения профилактических мероприятий появляется в репродуктивном возрасте женщин, с момента первого их обращения в женскую консультацию. Здесь особое внимание следует обратить на процессы, которые могут привести к раннему угасанию функции яичников, а следовательно к развитию эстрогенной недостаточности, являющейся одним из основных патогенетических механизмов развития постменопаузального остеопороза. В связи с этим женщинам необходимо проводить профилактику развития экстрагенитальной патологии, включающей:

- обсуждение вопросов планирования семьи;
- рекомендация оптимальных методов контрацепции с целью предупреждения нежелательной беременности;

- объяснения вредности частых аборт и их последствий для здоровья женщины;
- выявление и лечение любых нарушений менструальной функции, воспалительных процессов половых органов;
- пропаганду правил личной гигиены и ухода за мочеполовой системой.

Рекомендовались легкие физические упражнения (прогулки, особенно в солнечное время, легкий бег, плавание, гимнастика), сочетающиеся с адекватным потреблением пищевых продуктов, богатых кальцием, способствующих набору пика костной массы и ее сохранности. Кроме того, в процессе общения врача акушера-гинеколога со своими пациентами, перед ним стоит важная задача обучения женщин рациональному планированию труда и отдыха, методам психофизиологической разгрузки, позволяющим достаточно спокойно относиться к стрессовым ситуациям и удачно преодолевать их без негативных последствий. Особое значение имеет отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя, кофе, пищи с избыточным содержанием солей, жиров, белка), являющихся достоверными факторами риска развития постменопаузального остеопороза.

Мероприятия по профилактике осложненного течения климакса, в том числе развития постменопаузального остеопороза становятся особенно актуальными в позднем репродуктивном периоде (старше 35 лет), когда значительно возрастает число женщин, страдающих различными заболеваниями.

Наши наблюдения указали на значительную роль стрессовых ситуаций, нервного и эмоционального перенапряжений, пережитых именно в позднем репродуктивном возрасте, на здоровье женщины в климактерическом периоде. Поэтому гинекологам совместно с психологами, психотерапевтами, необходимо обучать женщин методам психофизиологической разгрузки, которая помогает нейтрализовать неблагоприятные последствия стрессов.

К началу менопаузы уже происходит накопление повреждений и можно подвести определенный итог всем пережитым жизненным ситуациям, поэтому в наших наблюдениях мы начинали вторичную профилактику постменопаузального остеопороза именно в этом периоде. При проведении профилактических мероприятий нами использовался принцип этапности, так как последовательное применение различных лечебных воздействий является наиболее бережным методом профилактики.

На первом этапе основной задачей являлось изучение анамнеза, выявление общей и гинекологической заболеваемости у женщин, тщательное инструментальное обследование, изучение эстрогенного фона, кальций-фосфорного гомеостаза. Женщинам проводились курсы терапии экстрагенитальной и гинекологической патологии, интенсивное лечение соматической патологии.

На втором этапе профилактики на фоне нормализации общего статуса женщин, проводилась коррекция гипоестрогемии, нарушений кальций-фосфорного гомеостаза. Женщинам рекомендовался прием эстрогенсодержащих препаратов (Климонорм – 1 табл. в день прерывистыми курсами по 3 месяца с последующим 3-месячным перерывом, пластыря Климара – 1 пластырь 1 раз в неделю таким же курсом), под строгим контролем ультразвукового обследования матки и яичников, маммографии. При наличии противопоказаний к проведению эстрогентерапии, рекомендовался профилактический прием негормональных средств (Калтрейд – 1 таблетка в день в течение 3-х месяцев или Ван-Альфа – 1 таблетка 2 раза в день в течение 1 месяца).

У лиц зрелого возраста и пожилых людей остеопороз почти никогда не является изолированным заболеванием. Сопутствующие остеохондроз, деформирующий артроз, бурсит усугубляет его течение. Поэтому на третьем этапе женщинам рекомендовался ортопедический режим, включающий комплекс мер, направленных на облегчение существования пациентки, страдающей остеопорозом. Это прежде всего сон на ровной жесткой постели, с маленькой подушкой под головой. Женщинам рекомендовалось: избегать длительного лежания, сидения (особенно сгорбившись) или стояния в одном положении; значительно ограничить подъем тяжестей (если же все-таки приходилось поднимать какой-то предмет, то рекомендовалось избегать наклонов вперед, а по необходимости приседать). Важную роль играет лечение, направленное на уменьшение болей, повышение подвижности, адаптацию к социальным условиям жизни, помогающее пациенту повысить качество жизни и работоспособность. Сюда относится лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, массаж. Следует подчеркнуть, что ответственный подход больного к лечебному процессу – необходимое условие успеха.

На всех этапах вторичной профилактики остеопороза следует обращать особое внимание женщин на то, что алкоголь, курение, частое потребление сладостей, злоупотребление содержащими кофеин напитками категорически запрещены в периоде менопаузы.

Избыток углеводов (сахаросодержащие газированные напитки) вызывает повышенную потерю костной массы. Поэтому обследованным женщинам в постменопаузальном периоде рекомендовалась сбалансированная диета, ограничивающая углеводы и животные жиры (сахар, хлебобулочные изделия, жирные продукты), содержащая достаточное количество нежирных кисломолочных и молочных продуктов, овощи и фрукты.

Умеренная инсоляция (пребывание на воздухе в раннее солнечное время суток, но не нахождение на пляже или садовом участке часами под лучами палящего солнца), активизируя витамин D в организме женщины, способствует нормализации кальций-фосфорного обмена и, как следствие, служит средством профилактики остеопороза.

При проведении комплекса профилактических мероприятий по предупреждению постменопаузального остеопороза, начатые у 39 женщин контрольной группы, удалось добиться того, что у 26 из них (66,7%) спустя год не отмечалось никаких ни клинических, ни параклинических признаков остеопороза и других симптомов патологического климакса, у 13 (34,3%) отмечалось легкое течение климактерического синдрома, при отсутствии признаков постменопаузального остеопороза.

Представленные результаты исследования, клиники, некоторых вопросов патогенеза терапии и профилактики постменопаузального остеопороза у женщин, жительниц г.Баку, свидетельствует о необходимости организации специализированных гинекологических кабинетов в женских консультациях, общих поликлиниках, для диспансерного наблюдения за женщинами в климактерическом периоде. Организация этих кабинетов в комплексе с предложенными нами мерами профилактики и лечения, будут способствовать снижению частоты развития постменопаузального остеопороза у женщин в переходном возрасте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акендрот К., Грассель М., Вессель Г. Диагностика остеопении с использованием рентгенологических и гистоморфометрических методов. Ревматология, 1989, №1, с.51-53.
2. Алтухова А.И. Неврологические синдромы при постклимактерической спондилопатии (вопросы клиники, диагностики и лечения). М., Медицина, 1977, 143 с.
3. Лазебник Л.Б., Маличенко С.Б. Первичный остеопороз: клиника, диагностика и лечение. Лечащий врач, 1999, №7, 13с.
4. Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И., Аникин и др. Частота переломов проксимального отдела бедренной кости и дистального отдела предплечья среди городского населения России. Остеопороз и остеопении, 1999, №3, 11 с.
5. Notelovitz M. The climacteric and osteoporosis Material of forthcoming symposia. Clin. Obstetr. Gynecol., 1987, v.30, №4, p.787-884.
6. Hewenway D., Coldits G.A., Pillet W.C. et al. Fractures and lifestyle effect of cigarette smoking, alcohol intake, and relative weight on the risk of hip and forearm fractures in middle-aged women. American Journal of Public Health, 1988, v.78, p.1554-1558.
7. Velton L.J., Kan S.M., Karner N.M., Riggs S.L. Lifetime fracture risk and approach to hip fracture risk assessment based on bone mineral density and age. Journal of Clinical Epidemiology, 1988, v.41. p.985-994.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ NSE В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КАК ФАКТОР ПЛОХОГО ИСХОДА ПРИ ВТОРИЧНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Токшилыкова А.Б., Саркулова Ж.Н., Сатенов М.Н., Саркулов М.Н., Тлеуова А.С., Калиева Б.М., Даниярова К.Р.

Западно-Казахстанский медицинский университет, имени Марата Оспанова, Казахстан.

Email: Ainur.t_83@mail.ru

Данное исследование посвящено изучению прогностической ценности нейронспецифических маркеров головного мозга и показателей исхода повреждений мозга.

Цель исследования: Изучить прогностическую роль сывороточного NSE в качестве предиктора плохого исхода при сосудистых и травматических повреждениях головного мозга.

Материалы и методы: Проспективное когортное исследование с участием 219 пациентов. В сыворотке крови нейронспецифические маркеры (NSE, S100), кислотно-основное состояние и газовый состав артериальной крови были получены в периоды наблюдения: при поступлении, на 3-и, 5-е и 7-е сутки пребывания больных в отделении реанимации.

Результаты: Наиболее значимым фактором риска неблагоприятного исхода служит маркер NSE с точкой отсечения 12,5 нг/мл. Результаты анализа указывают на наличие статистически значимой прямой связи между $NSE > 12,5$ нг/мл и ЛДГ по сравнению другими переменными на 3,7 раза чаще; при повышении лактата крови выше 4,1 ммоль/л почти 3,8 раза; при шкале Глазго ниже 13 баллов на 1,7 раза; $S100 \geq 0,2$ на 2,8 раза; при повышении $PCO_2 < 38,5$ документировали более чем 3 раза чаще. Мера определенности полученной модели по критерию псевдо R^2 Nagelkerke-250,6; logLikelihood- 154,04 что, соответствует отличному качеству прогностической способности математической модели. Наилучшую прогностическую ценность модели имела точка отсечения 88,89%, AuROC-0,809; Se-51,59%; Sp-95,06%; NPV-55,80%; PPV-94,20%.

Данная модель может быть использована для прогнозирования исхода у больных с острой церебральной патологией.

Ключевые слова: инсульты, травматические повреждения мозга, нейронспецифические маркеры, диагностические и прогностические критерии, исход инсультов.

Травматические и сосудистые поражения головного мозга вызывают ненормальное функционирование мозга вследствие нарушений в сосудистой системе. Ежегодно миллионы людей госпитализируются в отделения неотложной помощи по причине повреждений головного мозга, из которых 1,5 миллиона умирают [1, 2]. Многие смертельные случаи происходят до прибытия пациента в больницу или в период лечения [3]. Однако продолжающиеся воспалительные процессы при вторичных повреждениях мозга вызывают повреждение молекулярных клеток, изменения метаболизма и церебрального кровотока, нарушение аксонов и апоптоз, которые могут влиять на развитие долгосрочной смертности в отделенном периоде церебральных повреждений [4,5]. По данным некоторых авторов у этих больных снижается роль оценочной шкалы Глазго в оценке тяжести, динамики и прогнозировании исходов неврологического статуса [6,7].

Также и у компьютерной томографии головного мозга диагностическая ценность невелика, вследствие низкой чувствительности и недостаточной специфичности [8,9]. Магнитно-резонансное исследование позволяет оценить тяжесть нейроаксональных повреждений, но его недоступность некоторым лечебным стационарам, продолжительное время исследования, зачастую тяжелые пациенты, нуждающиеся в продолжении ИВЛ значительно ограничивают его применение [8,10]. В ежедневной клинической практике из-за инвазивности и наличия определенных показаний, также ограничен контроль внутричерепного давления [10]. Поэтому все больше клинических и экспериментальных исследований направлено на изучение роли нейроспецифических белков крови в диагностике и прогнозировании исходов острых церебральных нейропатологии [7,11]. При заболеваниях, сопряженных с непосредственным вовлечением нервной ткани в патологический процесс, качественные и количественные определения белка NSE в спинномозговой жидкости или сыворотке крови дают ценную информацию о степени выраженности повреждений нейронов и нарушениях общей целостности гематоэнцефалического барьера [12].

Также NSE характеризует степень постишемического повреждения мозга. NSE имеет длительный период полураспада в сравнении с S100. В отличие от S100, которая присутствует в высоких концентрациях в глиальных клетках и шванновских клетках, NSE происходит преимущественно из нейронов и нейроэндокринных клеток [13,14]. Вполне возможно, что S100 просто отражает воспалительную реакцию глиальных клеток, тогда как NSE может служить в качестве маркера повреждения нейронов [15,16].

Оценка в прогнозе доминирования повреждений значимости маркеров осуществлена нами по методике Вальда. Способность NSE как предиктора смертности была показана в некоторых исследованиях [17]. Однако ряд исследований опровергают эти результаты [18]. Различные результаты могут быть связаны с методологическими различиями, размером выборки, нестандартными тестами и разными демографическими данными. Чтобы еще больше углубить полезность NSE в качестве предиктора плохого исхода в этой статье будет представлен его прогностическая значимость при сосудистых и травматических поражениях мозга,

Методы: Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice), принципами Declaration of Helsinki и в соответствии с принципами этической комиссии Западно-Казахстанского Медицинского Университета имени Марата Оспанова № 12 от 30.01.2018г [11]. Содержание белка NSE в сыворотке крови при поступлении и в динамике определялось у 219 больных с сосудистыми и травматическими заболеваниями головного мозга, находившихся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии инсультных центров г. Актобе (Республика Казахстан), за период с 2018 по 2020 годы.

В исследование были включены больные с геморрагическими инсультами (ГИ) - 146 больных (66,6%), ишемическим инсультом 43 (19,6%) и с острыми закрытыми черепно-мозговыми травмами легкой и средней степени тяжести - 30 (13,60%). Критериями включения в исследование больных с геморрагическим инсультом явились случаи внутримозговых кровоизлияний с объемом гематомы более 30 см³ (преимущественно это были полушарные кровоизлияния); больных с ишемическим инсультом – с наличием

инфаркта головного мозга, подтвержденных клиническими и КТ – данными; больных с тяжелыми черепно-мозговыми травмами - ушибами головного мозга средней и тяжелой степени. Из основной группы были исключены пациенты с: внутримозговыми кровоизлияниями с объемом гематомы более 80 см³, с тяжелыми декомпенсированными соматическими заболеваниями, с доброкачественными и злокачественными опухолями головного мозга, легких и кожи. По исходу заболевания, независимо от диагноза, больные были разделены на группы: выжившие - 59,3 % (n=130) и умершие - 40,6% (n=89). Лабораторные исследования NSE проводились при поступлении и в динамике. Супернатант отделяли и хранили при -80 °С до анализа. Для определения NSE все образцы анализировали в двух экземплярах, используя иммунолюминетрический анализ с использованием набора ELISA для человека. Для измерения газов крови, лактата и глюкозы образцы анализировали с помощью анализатора ABL 735 (Radiometer; Дания). Для оценки тяжести повреждения мозга и прогноза исхода клинического течения заболевания пациентов использовались оценочные неврологические шкалы GCS (Glasgow Coma Scale). Исследование было одобрено этическим комитетом больницы и информированными согласиями.

Распределение пациентов в группах по полу ($\chi^2 = 0,0184$, $p = 0,8922$) и возрасту ($\chi^2 = 0,0183$, $p = 0,4288$), где исследованы все предикторы были сопоставимы. Для определения возможности использовать белок NSE в прогнозировании исхода вторичных повреждений головного при сосудистом и травматическом поражении головного мозга был проведен дисперсионный анализ. Оценивался максимальный, минимальный и средний уровень белка для каждой группы исходов.

Статистика: Исследование статистической взаимосвязи между качественным признаком и клиническим исходом осуществляли при помощи анализа таблиц сопряженности, с вычислением критерия χ^2 Пирсона. В случае невыполнения условия применимости критерия χ^2 (более 25% ячеек в таблице сопряженности имеют ожидаемую частоту менее 5), анализ проводился попарно по двустороннему точному критерию Фишера (2p(F)). В случае недостаточной статистической значимости связи двух номинальных признаков в многопольной таблице сопряженности, проводили объединение нескольких сходных по смыслу градаций признака в одну, с последующим вычислением критерия χ^2 Пирсона с достигнутым уровнем статистической значимости (p) и отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (95% ДИ). Исследование взаимосвязи между количественным и качественным признаком осуществлялось при помощи однофакторного логистического регрессионного анализа с вычислением статистики χ^2 Вальда с достигнутым уровнем статистической значимости и ОШ с 95% ДИ.

Был проведен анализ множественной линейной регрессии для выявления переменных, независимо связанных с уровнями NSE в сыворотке. NSE использовалась как зависимая переменная. Использовалась пошаговая техника вперед. Данные представлены в виде среднего значения $\pm$ стандартное отклонение или медианы и процентилей, p-значения менее 0,05 считались значимыми.

Построение математических моделей прогноза риска неблагоприятного исхода осуществлялось при помощи метода многофакторного бинарного логистического регрессионного анализа с пошаговым включением независимых переменных. Влияние

независимой переменной на вероятность исхода определяли при помощи ОШ и 95% ДИ. Для оценки качества математической модели вычисляли коэффициент детерминации Найджелкерка (R^2), показывающий долю влияния всех переменных, включенных в модель на дисперсию зависимой переменной, а так же критерий согласия Хосмера-Лемешова, позволяющий установить, насколько модель согласуется с исходными данными. Оценка дискриминирующей способности математической модели выполнялась на основе анализа таблицы классификаций. Оценку прогностической эффективности модели осуществляли при помощи анализа ROC-кривых, с вычислением показателя площади под ROC-кривой, называемый AUC (Area Under Curve). В процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый уровень статистической значимости (p) и число степеней свободы (df). Критическое значение уровня статистической значимости в исследовании составляло $p < 0.05$. Результаты исследования были подвергнуты статистическому анализу и математической обработке данных с использованием пакета прикладных программ Statistics (SPSS25).

Результаты: Нейроспецифическая енолаза (NSE) выполняет ферментативную функцию, участвуя в процессах гликолиза, и является одним из специфических маркеров повреждения нервной ткани. Отмечено очень быстрое нарастание концентрации в крови при гипоксии, травме головного мозга и других патологических состояниях, сопровождающихся массовой деструкцией нейронов.

При сравнении групп выживших и умерших установлено, что концентрация белка NSE в первые сутки после травмы увеличивалась в 2 и 3 раза соответственно. У оставшихся в живых пациентов на третьи сутки после инцидента уровень NSE возвратился к контрольным цифрам, а у умерших - остается высоким относительно показателей контроля. На рис.1 представлено распределение среднего значения белка NSE для каждой группы исходов.

Рисунок 1. Диаграмма размаха NSE в группах по исходу заболевания

Как показали проведенные исследования, при сравнении динамики содержания нейронспецифических белков в группах выживших и умерших больных были определены статистически значимые отличия. Так, если в обеих группах больных отмечалось увеличение NSE в 1-е сутки в 1,4 раза 14,76 95%ДИ(12,98; 16,54) против 20,75 95%ДИ(16,10- 25,39) нг/мл соответственно группам), то достоверное нарастание его концентрации отмечалось в группе умерших больных на 3-и сутки на 1,39 раза 19,75 95%ДИ(14,52- 24,97) $p=0,0260$) на фоне проводимого лечения, что предполагало о раннем возникновении неблагоприятного течения заболевания.

У всех других пострадавших с летальным исходом концентрация NSE в динамике нарастала, достигая максимума к моменту смерти. Проведен дисперсионный анализ для определения статистически значимой разницы. Оценивался максимальный, минимальный и средний уровень белка NSE для каждой группы исходов.

Выявленные различия в характере ответной реакции организма на повреждении головного мозга, дали нам основание для последующей разработки дифференциально-диагностического алгоритма. Переменные продемонстрировавшие статистически значимую связь с (предикторами) повышение целевого $NSE > 12,5$ нг/мл факторами вторичной повреждении головного мозга в одномерном анализе, вводились в множественный ЛРА пошагово. На первом шаге были включены клинические и лабораторные показатели (простая модель) Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозирование риска повышения $NSE > 12,5$ нг/мл.

Фактор	AuRO C	Станд ошибк а	сО Ш	95%ДИ для сОШ ниж ний	верхн ий	Коэфф.ре грессии	χ^2	Уровень Р
Константа		-1,9577				-1,9576	19,4029	<0,0001
ЛДГ ¹ ≥ 218	0,728	0,3376	3,74	1,93	7,25	1,3195	15,279	<0,0001
GCS ² < 13	0,766	0,3447	1,68	0,85	3,29	0,5168	2,2485	0,1337
Возраст < 53	0,783	0,3901	2,95	1,37	6,34	1,0829	7,7076	0,0055
S100 $\geq 0,2$	0,790	0,3868	2,79	1,31	5,95	1,0256	7,0288	0,0080
PCO2 ³ $\geq 38,5$	0,804	0,3741	3,08	1,48	6,41	1,1242	9,0311	0,0027
Лактат	0,809	0,6625	3,29	0,90	12,07	1,1922	3,2392	0,0719

Примечания:

1 ЛДГ- лактатдегидрогеназа

2 GCS- Шкала ком Глазго

3 S100 – кальцийсвязывающий белок

4 PCO2- парциальное давление углекислого газа

Мера определенности полученной модели по критерию псевдо R^2 -250,6%. Независимыми факторами, связанными с NSE были: ЛДГ ≥ 218 ,

GCS < 13 , Возраст < 53 , S100 $\geq 0,2$, PCO2 $\geq 38,5$, Лактат $\geq 4,1$. Результаты анализа указывают на наличие статистически значимой прямой связи между $NSE > 12,5$ нг/мл и ЛДГ по

сравнению другими переменными на 3,7 раза чаще; при повышении лактата крови выше 4,1 ммоль/л почти 3,8 раза; при шкале Глазго ниже 13 баллов на 1,7 раза; $S100 \geq 0,2$ на 2,8 раза; при повышении $PCO_2 < 38,5$ документировали более чем 3 раза чаще. Мера определенности полученной модели по критерию псевдо R^2 Nagelkerke-250,6; logLikelihood- 154,04.

Уравнение логистической регрессии модели имеет следующий вид:

$$\text{Риск} = 1/(1 + \text{Exp}(-(-1,958 + 1,319 \cdot \text{ЛДГ} \geq 218 + 0,517 \cdot \text{GCS} < 13 + 1,083 \cdot \text{Возраст} < 53 + 1,026 \cdot S100 \geq 0 + 1,124 \cdot PCO_2 \geq 38 + 1,192 \cdot \text{Лактат} \geq 4)))$$

Где Р- вероятность риска повышения $NSE > 12,5$ нг/мл, е-основание натурального логарифма ($e=2,72$), -1,9577- константа;

Наилучшую прогностическую ценность модели имела точка отсечения 88,89%, AuROC-0,809; Se-51,59%; Sp-95,06%; NPV-55,80%; PPV-94,20%.

При формировании многофакторного дисперсионного анализа мы при прогнозировании риска $NSE > 12,5$ нг/мл получили регрессии из нескольких факторов которая указаны в таблице № 11.

Таблица 11. Регрессии

Factor	Cut off	Relative risk (95% CI)	Se	Sp	χ^2	AuROC	P-level (df=1)
4 фактора $\geq 1,0$	1,0	4,54 (2,01; 10,24)	96,24%	32,56%	33,8465	0,80	<0,0001
3 фактора $\geq 1,0$	1,0	3,66 (1,86; 7,18)	94,74%	34,88%	32,6368	0,79	<0,0001
5 факторов $\geq 2,0$	2,0	2,45 (1,56; 3,86)	89,47%	40,70%	27,3740	0,82	<0,0001

Регрессия состоящая из 4-х факторов относительный риск плохого исхода 4,54 (95% ДИ 2,01; 10,24); Se-96,24%, Sp-32,56%, χ^2 -33,8465, AuROC-0,80. Расчитываем: если ЛДГ > 218 то балл =35; GCS < 13 то балл =15; Возраст < 53 то балл=24; $S100 \geq 0,2$ то балл =26. Итого=10066. Если при поступлении пациент набирает 10066 у пациента при исследовании риск $NSE > 12,5$ нг/мл и смертность превышает 4,54 раза.

Для прогнозирования количественного показателя NSE мы использовали множественный регрессионный анализ с зависимой переменной NSE и независимыми переменными ЛДГ, Лактат, S100, Глюкоза. Все переменные указанные в таблице прогнозировали количественную величину данного маркера. Ниже указали расширенные результаты регрессионного анализа на таб 2.

Таблица 2. Расширенные результаты регрессионного анализа

Фактор	R-квадрат	R-квадрат изменен	Корреляция с целевой	В-коэфф.	Станд. ошибка	p
	т	е				
	(скорректи.)

константа					3,1990	0,2439
ЛДГ ¹	18,2%	41,87%	0,43	0,008	0,0085	<0,0001
Лактат	22,4%	23,62%	0,28	17,748	0,6259	0,0105
S100 ²	41,4%	19,43%	0,55	52,207	0,5757	<0,0001
Глюкоза	42,1%	0,50%	0,05	-3,529	0,3241	0,0598

Примечания:

1. ЛДГ-лактатдегидрогеназа

2. S100-кальций связывающий белок

Качество модели

R-квадрат	42,9%
R-квадрат скоррек.	42,1%
Стандартная ошибка Y	12,46
F-статистика	40,22
Число степеней свободы	214
Уровень P	<0,0001

Рисунок 14. График зависимости наблюдаемых значений от прогнозных и качество модели

$$NSE = 3,17 + 0,05 \cdot \text{ЛДГ} + 1,7 \cdot \text{Лактат} + 4,9 \cdot \text{S100} - 0,63 \cdot \text{Глюкоза}$$

Где:

3,166 - константа

0,052 - коэффициент регрессии ЛДГ ;

1,699 - коэффициент регрессии лактат;

4,900 - коэффициент регрессии S100;

-0,632 - коэффициент регрессии Глюкозы

Результаты регрессионного анализа показал, что переменные независимо статистически связанные с NSE были ЛДГ, лактат, S100 и глюкоза крови. В данной части исследования мы сосредоточились на те переменные которые сильно связаны с зависимым переменным. Различия в среднем значение белка NSE в сыворотке крови с разными исходами Группа с благоприятным исходом (GOS 4,5,3) и группа с неблагоприятным исходом (GOS 1,2) с летальным исходом достоверно отличаются среднему и максимальному значению уровня белка NSE в сыворотке крови ($p=0.05$). Далее мы построили кривые выживаемости Kaplan-Meier для $NSE < 12,5 \text{ нг/мл}$

Рисунок 15. Кривые выживаемости Kaplan-Meier для NSE <12,5нг/мл и NSE>12,5нг/мл

Как видно из рисунка кумулятивный показатель случаев наступления плохого исхода в группе с уровнем и NSE>12,5нг/мл стал расходиться уже первые дни наблюдения. Достигнутый уровень значимости по критерию log Rank(Mantel Cox)= 0,0062 различия в исследуемых группах являются значимыми. Таким образом, уровень белка NSE>12,5нг/мл может служить предиктором летального исхода в ранние сроки заболевания.

Установлено, что уровни нейронспецифических белков, газы крови и предикторы нарушения метаболизма мозга между собой дифференцировались в зависимости от исхода заболевания. Выявленные различия объяснялись биохимическими особенностями церебральных повреждений, что в свою очередь определялось их морфо-функциональными особенностями. Сущностью доминирующих повреждений мозга является развитие патологического процесса в направлении нарастания цитотоксического отека (отека-набухания) головного мозга, повышения внутричерепного давления с возможной дислокацией и вклиниванием мозга. В целом, результаты сопоставления показателей сыворотки крови дали положительный результат. Они показали, что величина отдельных нейромаркеров может служить в качестве критериев доминирования вторичных повреждений головного мозга.

Обсуждение: Показатели смертности от травматических и сосудистых поражении различаются по данным нескольких исследований. В некоторых исследованиях также используются разные временные методы и параметры для анализа этой смертности. Летальность колеблется от 13 до 22% [20]. Установлено, что после первичного повреждения с первых минут развивается вторичное повреждение мозга, которое может продолжаться и в последующие периоды на протяжении нескольких лет из-за избыточной метаболической, клеточной и молекулярной активности воспаления [20]. Результаты исследований свидетельствуют, что иммуноферментный скрининг нейронспецифических

белков (NSE) позволяет оценить степень повреждения гематоэнцефалического барьера и глубину патологических изменений, происходящих в нервной системе [21]. Во время инфекционного процесса в ЦНС происходит запуск иммунопатологических реакций, приводящих к активации Т-лимфоцитов и увеличению проницаемости ГЭБ [22,23]. Проникновение вируса в ЦНС во многом определяется состоянием ГЭБ. Нарушение проницаемости ГЭБ сопровождается выходом NSE в кровь.

Определение показателей NSE и белка S100 в сыворотке крови и ликворе в остром периоде травматического и сосудистого поражения головного мозга может служить дополнительным критерием ранней диагностики нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера в остром периоде заболевания и критерием восстановления его проницаемости в отдаленном периоде [24,25].

Исследователи также обнаружили, что этот биомаркер отражает степень тяжести травмы на основе GCS [26]. На основе этого исследования было показано, что высокий уровень NSE значительно отличался у выживших или умерших субъектов с травмами головы. Повреждение мозга, которое вызывает высокий уровень NSE может быть сильно связано с нарушением ГЭБ и ишемией. Так, например, и по данным [27] постишемический вазоспазм обычно развивается в течение 3 дней после травматических и сосудистых поражений. Сила краткосрочных предикторов смертности также лучше, чем предикторы долгосрочной риски смертности, как по значимости средних различий, так и по диагностической силе. В другом исследовании выступили против результатов, согласно которым уровень NSE не может быть предиктором смертности. Различия были связаны с вариациями во времени сбора NSE в каждом исследовании, от времени травмы до 84 часов после травмы. Эти исследования проводились неоднородно по времени и методологии, так что результаты исследования также различаются [28]. В этой статье мы описываем разработку прогностического модели возрастающей сложности, основанных на предикторах для прогнозирования неблагоприятных исходов у пациентов. Модель адекватно различал пациентов с плохими и хорошими исходами. Наибольший объем прогностической информации содержался в основном наборе из предикторов: S100, GCS, $p\text{CO}_2$, глюкозы и ЛДГ при поступлении. Эти характеристики уже были учтены во многих прогностических моделях [29,30]. Необходима дальнейшая проверка этой оценки, но требуемые данные были недостаточно доступны в большинстве исследований IMPACT. Было показано, что глюкоза и гемоглобин вносят вклад в прогнозирование исхода, хотя их влияние меньше, чем у других предикторов, например возраста [31]. В отделениях интенсивной терапии было показано, что интенсивное лечение гипергликемии снижает смертность [32]. Раннее прогнозирование исхода позволяет установить базовый профиль риска для отдельных пациентов, тем самым обеспечивая справочную информацию для оценки качества оказания медицинской помощи. Прогностические модели особенно важны для более эффективного планирования и анализа РКИ. Например, мы можем исключить пациентов с очень хорошим или очень плохим прогнозом [33], выполнить ковариативную корректировку эффекта лечения [34,35] и рассмотреть другие анализы, которые приводят к увеличению статистической мощности [36].

Предлагаемые шкалы также могут помочь врачам в их первоначальной оценке тяжести и прогноза пациентов с повреждения головного мозга. Однако мы отмечаем, что модели могут только дополнять, а не заменять клинические суждения, хотя маловероятно, что какой-либо

клиницист имеет эквивалентный систематический опыт результатов тысяч пациентов, лежащих в основе наших моделей. К прогнозам следует относиться с осторожностью и не применять напрямую для принятия решений об ограничении лечения [37].

Эти модели могут быть полезны для предоставления родственникам реалистичной информации об ожидаемых результатах, для количественной оценки и классификации тяжести травмы головного мозга, для стратификации и корректировки ковариаций в клинических испытаниях, а также в качестве справочного материала для оценки качества медицинской помощи

Таким образом, раннее определение и контроль уровня S100, а также одновременные исследования S100 и NSE позволяют выявить и подтвердить наличие повреждений мозга на ранней стадии, есть возможность успешно прогнозировать вторичных повреждений головного мозга.

Ограничения и дальнейшее изучение: Это исследование имело ограничений. Исследование с небольшим количеством пациентов было одноцентровое, что ограничивает его валидность. Во-вторых, были определенные затруднения в процессе работы, связанные с отказом больных или их родственников от дальнейшего участия в данном исследовании; не было динамического долгосрочного наблюдения исследованных больных.

Это исследование обеспечивает основу, на которой должны быть построены дальнейшие многоцентровые исследования, чтобы установить обобщаемость и повысить валидность полученных результатов.

Выводы: 1. Уровни зависимого переменного (NSE) и независимых переменных (S100, глюкоза крови, GCS и Нв) могут быть использованы в качестве мультимодальных предикторов прогнозирования неврологического исхода у больных с острой церебральной патологией. В этом исследовании нам удалось прогнозировать количественного показателя $NSE\ y = 0,4292x + 9,58$. $R^2 = 0,4292$

2. Предложенная математическая модель, включающая в качестве предикторов плохого исхода зависимого переменного (NSE) и независимых переменных (NSE, глюкоза крови, GCS и Нв) имела точка отсечения. Наилучшую прогностическую ценность модели имела точка отсечения 88,89%, AuROC-0,809; Se-51,59%; Sp-95,06%; NPV-55,80%; PPV-94,20%, что соответствует отличному качеству предсказательной способности математической модели. Модель может быть использована в повседневной практике для выявления и снижения вероятности высокого риска неблагоприятного клинического исхода у больных с острой церебральной патологией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Brazinova A, Rehorcikova V, Taylor MS, Buckova V, Majdan M, Psota M, Peeters W, Feigin V, Theadom A, Holkovic L, Synnot A. Epidemiology of Traumatic Brain Injury in Europe: A Living Systematic Review. J Neurotrauma. 2021 May 15;38(10):1411-1440. doi: 10.1089/neu.2015.4126. Epub 2018 Dec 19. PMID: 26537996; PMCID: PMC8082737.

2. Boursin P, Paternotte S, Dercy B, Sabben C, Maier B. Sémantique, épidémiologie et sémiologie des accidents vasculaires cérébraux [Semantics, epidemiology and semiology of stroke]. *Soins*. 2018 Sep;63(828):24-27. French. doi: 10.1016/j.soin.2018.06.008. PMID: 30213310.
3. Faiz KW, Rønning OM. Hjerneslag [Stroke]. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2018 Feb 5;138(3). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.17.0677. PMID: 29411589.
4. David A, Mari C, Vignaud F, Masson D, Planche L, Bord E, et al. Evaluation of S100B blood level as a biomarker to avoid computed tomography in patients with mild head trauma under antithrombotic medication. 2017; 98: 551–556.
5. Wijanarko F, Alifianto U, Setyono H, Arsika Ramadhana G, Sungkar AA, Saadhi I, Setiawati DA. S100 β protein levels as a parameter to assess the clinical development of adult patients with mild traumatic brain injury in Dr. Moewardi Public Hospital, Surakarta. *Surg Neurol Int*. 2021 Jul 12;12:342. doi: 10.25259/SNI_294_2021. PMID: 34345483; PMCID: PMC8326141.
6. Adrian H., Martin K., Salla N., Lasse V. Biomarkers of traumatic brain injury: temporary changes in body fluids. *eNeuro*. 2016; 3 (6): 294-9. <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0294-16.2016> PMid: 28032118 PMCID: PMC5175263.
7. Mercier E., Butin A., Lauzier F., Fergusson D.A., Simard J. F., Zarychansky R. et al. Prognostic value of S-100beta protein for prognosis in patients with moderate and severe traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2013; 346: 1757-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.f1757> PMid: 23558282.
8. Pfortmueller CA, Drexel C, Krahenmann-Muller S, Leichtle AB, Fiedler GM, Lindner G, et al. Concentrations of S-100 B are a prognostic factor of reduced survival in patients with serious trauma, regardless of traumatic brain injury. *PloS One*. 2016; 11 (3): 1–5. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152822> PMid: 27031106 PMCID: PMC4816449.
9. Murillo-Cabezas F., Mu-oz-sAnchez M.A., Rincon-Ferrari M.D., etc. Prognostic value of the time course of the S100B eta protein in severe post-acute brain injury: a prospective and observational study. *Brain Inj*. 2010; 24: 609–19. <https://doi.org/10.3109/02699051003652823> PMid: 20235763.
10. Tokshilykova, A.B., Sarkulova, Z.N., Kabdrakhmanova, G.B. et al. Neuron-Specific Markers and their Correlation with Neurological Scales in Patients with Acute Neuropathologies. *Journal of molecular Neuroscience* (2020). <https://doi.org/10.1007/s12031-020-01536-5>.
11. Rainey T., Lesko M., Sachko R., Lecky F., Childs S. Predicting the outcome after severe traumatic brain injury using the S100B serum biomarker: results using a single time point (24 hours). *Resuscitation*. 2009; 80: 341–5. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.11.021> PMid: 19150161.
12. Chi Y. L. et al. Evaluation of the postoperative cognitive dysfunction in elderly patients with general anesthesia // *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. – 2017. – T. 21. – №. 6. – C. 1346-54.
13. Hong SK, Kim JH, Starenki D, Park JI. Autophagy sensitivity of neuroendocrine lung tumor cells. *Int J Oncol*. 2013 Dec;43(6):2031-8. doi: 10.3892/ijo.2013.2136. Epub 2013 Oct 11. PMID: 24126619; PMCID: PMC3834067.

14. Xu CM, Luo YL, Li S, Li ZX, Jiang L, Zhang GX, Owusu L, Chen HL. Multifunctional neuron-specific enolase: its role in lung diseases. *Biosci Rep*. 2019 Nov 29;39(11):BSR20192732. doi: 10.1042/BSR20192732. PMID: 31642468; PMCID: PMC6859115.
15. Hagmeyer S, Romão MA, Cristóvão JS, Vilella A, Zoli M, Gomes CM, Grabrucker AM. Distribution and Relative Abundance of S100 Proteins in the Brain of the APP23 Alzheimer's Disease Model Mice. *Front Neurosci*. 2019 Jun 20;13:640. doi: 10.3389/fnins.2019.00640. PMID: 31281238; PMCID: PMC6596341.
16. Lasek-Bal A, Jedrzejowska-Szypulka H, Student S, Warsz-Wianecka A, Zareba K, Puz P, Bal W, Pawletko K, Lewin-Kowalik J. The importance of selected markers of inflammation and blood-brain barrier damage for short-term ischemic stroke prognosis. *J Physiol Pharmacol*. 2019 Apr;70(2). doi: 10.26402/jpp.2019.2.04. Epub 2019 Jul 22. PMID: 31356182.
17. Goyal A., Falla M.D., Niyonkuru S., Amin K., Fabio A., Birger R.P., Wagner A.K. S100b as a prognostic biomarker in predicting outcomes for patients with severe brain injury. *J Neurotrauma*. 2013; 30 (11): 946–57. <https://doi.org/10.1089/neu.2012.2579> PMid: 23190274 PMCID: PMC3684103
18. Kellermann I, Kleindienst A, Horan, Buchfelder M, Bronner S. Concentrations of early CSF and S100B serum for predicting outcomes in traumatic brain injury and subarachnoid hemorrhage. *Clin Neurol Neurosurg*. 2016; 145:79–83. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2016.04.005> PMid: 27101088.
19. Olivecrona M, Rodling-Wahlström M, Naredi S, Koskinen LO. S-100B и нейронспецифическая энолаза являются плохими предикторами исхода при тяжелой черепно-мозговой травме, леченной таргетной терапией внутричерепным давлением. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2009; 80 (11): 1241–7. <https://doi.org/10.1136/jnnp.2008.158196> PMid: 19602473.
20. Ballesteros MA, Rubio-Lopez MI, San Martín M, Padilla A, López-Hoyos M., Llorca J, Mi-ambres E. S100B levels from the jugular vein bulb as a biomarker of poor prognosis in patients with severe acute brain injury . *J Neurol Sci*. 2018; 385 : 109–14. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2017.12.017> PMid: 29406887.
21. Anderson BJ, Reilly JP, Shashaty MGS, Palakshappa JA, Wysoczanski A, Dunn TG, Kazi A, Tommasini A, Mikkelsen ME, Schweickert WD, Kolson DL, Christie JD, Meyer NJ. Admission plasma levels of the neuronal injury marker neuron-specific enolase are associated with mortality and delirium in sepsis. *J Crit Care*. 2016 Dec;36:18-23. doi: 10.1016/j.jcrc.2016.06.012. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27546742; PMCID: PMC5096992.
22. Cheng F, Yuan Q, Yang J, Wang W, Liu H. The prognostic value of serum neuron-specific enolase in traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2014 Sep 4;9(9):e106680. doi: 10.1371/journal.pone.0106680. PMID: 25188406; PMCID: PMC4154726.
23. Mattos JD, Campos MO, Rocha MP, Mansur DE, Rocha HNM, Garcia VP, Batista G, Alvares TS, Oliveira GV, Souza MV, Videira RLR, Rocha NG, Secher NH, Nóbrega ACL, Fernandes IA. Human brain blood flow and metabolism during isocapnic hyperoxia: the role of reactive oxygen species. *J Physiol*. 2019 Feb;597(3):741-755. doi: 10.1113/JP277122. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30506968; PMCID: PMC6355640.

24. Czupryna P, Grygorczuk S, Pancewicz S, Świerzbńska R, Zajkowska J, Krawczuk K, Dunaj J, Filipiuk J, Kruszewska E, Borawski K, Moniuszko-Malinowska A. Evaluation of NSE and S100B in patients with tick-borne encephalitis. *Brain Behav.* 2018 Dec;8(12):e01160. doi: 10.1002/brb3.1160. Epub 2018 Nov 22. PMID: 30468006; PMCID: PMC6305942.
25. Lindblad C, Nelson DW, Zeiler FA, Ercole A, Ghatan PH, von Horn H, Risling M, Svensson M, Agoston DV, Bellander BM, Thelin EP. Influence of Blood-Brain Barrier Integrity on Brain Protein Biomarker Clearance in Severe Traumatic Brain Injury: A Longitudinal Prospective Study. *J Neurotrauma.* 2020 Jun 15;37(12):1381-1391. doi: 10.1089/neu.2019.6741. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32013731; PMCID: PMC7249468.
26. Gradisek P, Osredkar J, Korsika M, Kremzar B. A model with multiple indicators of long-term mortality in traumatic brain injury. *Brain Ini.* 2012; 26 (12): 1472–81. <https://doi.org/10.3109/02699052.2012.694567> PMid: 22721420
27. Tum I., Kshih L., Yendzheyevskaya-Shpulka H., Levin-Kovalik Y.L. Serum levels of S100B protein and neuron-specific enolase are associated with mortality in critically ill patients. *Biochimica Polonica.* 2017; 64 : 16–9. https://doi.org/10.18388/abp.2017_1619.
28. Shakeri M, Mahdkhah A, Panahi F. S100B Protein as a Post-traumatic Biomarker for Prediction of Brain Death in Association With Patient Outcomes. *Arch Trauma Res.* 2013 Aug;2(2):76-80. doi: 10.5812/atr.8549. Epub 2013 Aug 1. PMID:24396798; PMCID: PMC3876553
29. Kang C, Jeong W, Park JS, You Y, Min JH, Cho YC, Ahn HJ. Comparison of Prognostic Performance between Neuron-Specific Enolase and S100 Calcium-Binding Protein B Obtained from the Cerebrospinal Fluid of Out-of-Hospital Cardiac Arrest Survivors Who Underwent Targeted Temperature Management. *J Clin Med.* 2021 Apr 6;10(7):1531. doi: 10.3390/jcm10071531. PMID: 33917473; PMCID: PMC8038742.
30. Perel P, Edwards P, Wentz R, Roberts I. Systematic review of prognostic models in traumatic brain injury. *BMC Medical Informatics and Decision Making.* 2006 Nov;6:38. DOI: 10.1186/1472-6947-6-38. PMID: 17105661; PMCID: PMC1657003.
31. Nino A. Mushkudiani, Chantal W.P.M. Hukkelhoven, Adrián V. Hernández, Gordon D. Murray, Sung C. Choi, Andrew I.R. Maas, Ewout W. Steyerberg, A systematic review finds methodological improvements necessary for prognostic models in determining traumatic brain injury outcomes, *Journal of Clinical Epidemiology*, Volume 61, Issue 4, 2008, Pages 331-343, ISSN 0895-4356, <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.06.011>.
32. Rodriguez-rOdriguez A., Higuera-gUerrero J. J., Gordillo-Escobar E., Enamorado-Enamorado J., Hernandez-Garcia S., Ruiz de Azua-Lopez Z., Vilchez-Arenas A., Guerrero J. M., Murillo-100-Cabezas and Ne urllo 100-Cabezas and -specific enolase as predictors of mortality in patients with severe traumatic brain injury. *Neurol Res.* 2016; 38 (2): 130–7. <https://doi.org/10.1080/01616412.2016.1144410> PMid: 27078699.
33. Dulf D, Coman MA, Tadevosyan A, Chikhladze N, Cebanu S, Peek-Asa C. A 3-Country Assessment of Traumatic Brain Injury Practices and Capacity. *World Neurosurg.* 2021 Feb;146:e517-e526. doi: 10.1016/j.wneu.2020.10.115. Epub 2020 Oct 27. PMID: 33127569; PMCID: PMC7897235.
34. Chalos V, A van de Graaf R, Roozenbeek B, C G M van Es A, M den Hertog H, Staals J, van Dijk L, F M Jenniskens S, J van Oostenbrugge R, H van Zwam W, B W E M Roos Y,

- B L M Majoie C, F Lingsma H, van der Lugt A, W J Dippel D; MR CLEAN-MED investigators. Multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke. The effect of periprocedural medication: acetylsalicylic acid, unfractionated heparin, both, or neither (MR CLEAN-MED). Rationale and study design. *Trials*. 2020 Jul 14;21(1):644. doi: 10.1186/s13063-020-04514-9. PMID: 32665035; PMCID: PMC7362523.
35. Alcock S, Batoo D, Ande SR, Grierson R, Essig M, Martin D, Trivedi A, Sinha N, Leeies M, Zeiler FA, Shankar JJS. Early diagnosis of mortality using admission CT perfusion in severe traumatic brain injury patients (ACT-TBI): protocol for a prospective cohort study. *BMJ Open*. 2021 Jun 9;11(6):e047305. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047305. PMID: 34108167; PMCID: PMC8191612.
 36. Nelson LD, Brett BL, Magnus BE, Balsis S, McCrea MA, Manley GT, Temkin N, Dikmen S. Functional Status Examination Yields Higher Measurement Precision of Functional Limitations after Traumatic Injury than the Glasgow Outcome Scale-Extended: A Preliminary Study. *J Neurotrauma*. 2020 Feb 15;37(4):675-679. doi: 10.1089/neu.2019.6719. Epub 2019 Nov 13. PMID: 31663425; PMCID: PMC7045351.
 37. Zampieri FG, Granholm A, Møller MH, Scotti AV, Alves A, Cabral MM, Sousa MF, Balieiro HM, Hortala CC Jr, Filho EMR, Perecmanis E, de Magalhães Menezes MA, Moreira CEN, Moralez GM, Bafi AT, de Carvalho CB, Salluh JIF, Bozza FA, Perner A, Soares M. Customization and external validation of the Simplified Mortality Score for the Intensive Care Unit (SMS-ICU) in Brazilian critically ill patients. *J Crit Care*. 2020 Oct;59:94-100. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.05.016. Epub 2020 May 29. PMID: 32585439.

EDITORS-IN-CHIEF:

Aytekin Hasanova (Azerbaijan)

Tamar Didbaridze (Georgia)

Melis Gönülal (Turkey)

EDITORIAL BOARD:**Honorary Editors**

Davit Tophuria

Tbilisi State Medical University. Head of International Students Academic Department, Associate Professor. PhD in HNA.

Nigar Kamilova

AMU. Department of Obstetrics and Gynecology I. Doctor of Medical Sciences. Professor

Nino Didbaridze

Microbiology and Immunology Department. Tbilisi State Medical University. PhD MD.

Nino Pirtskhelani

Associated Professor of Department of Molecular and Medical Genetics of Tbilisi State Medical University.

Rusudan Sujashvili

New Vision University. School of Medicine. Professor,

Saadat Sultanova

AMU. Department of Obstetrics and Gynecology I. Doctor of Medical Sciences. Professor.

Sabina Mashadiyeva

AMU. Department of Internal Medicine II. PhD in Medicine. Associate Professor.

Tamar Giorgadze

Tbilisi State Medical University. Department of Histology, Cytology and Embryology. Assistant Professor.

Tamar Didbaridze

Tbilisi State Medical University, First University Clinic. PhD in MD.

International Advisory and Reviewer Team**Azerbaijan**

Aytekin Hasanova

Azerbaijan Medical University. I Preventive Medicine Faculty. Deputy of Dean. PhD in Medical Biology.

Araz Manucheri-Lalen

Associated Professor, PhD Department of Psychiatry, Azerbaijan Medical University.

Azer K. Mustafayev

Turan Medical Clinic. Cardiologist. PhD in Medicine. Azerbaijan.

Djamil Alakbarov

A researcher at the Research Institute for Lung Diseases. PhD in medicine. Azerbaijan

Elmira Aliyeva

Azerbaijan Medical University. Head of the Department of Obstetrics and Gynecology I. Doctor of Medical Sciences. Professor.

Gular Fataliyeva

Azerbaijan Medical University. Department of Internal Medicine II. PhD in Medicine. Associate Professor.

Irada Sultanova

Azerbaijan Medical University. Department of Obstetrics and Gynecology I. PhD in Medicine. Associate Professor.

Jamala Mursalova

Azerbaijan National Academy of Sciences. Genetic Resources Institute. PhD BS.

Leyla I. Djafarova

Clinic "Medium" Baku. Doctor of Medical Sciences. Professor

Mina Qarashova

Azerbaijan Medical University. Department of Obstetrics and Gynecology I. PhD in Medicine. Associate Professor.

Naila Quliyeva

Azerbaijan Medical University. Assistant in "Immunology" Program at Paediatrics Diseases Department. Docent and Academic Manager in "Allergology and Immunology" Department.

Rashad G. Abishov

Dental Implant Aesthetic Center Harbor Hospital, Azerbaijan State Doctors Improvement Institute. PhD. Azerbaijan.

Saadat Safarova

Azerbaijan Medical University. Department of Obstetrics and Gynecology I. PhD in Medicine. Associate Professor.

Sain Safarova

Azerbaijan Medical University. Department of Internal Medicine II. PhD in Medicine. Associate Professor.

Sayyara Ibadullayeva

Institute of Botany. National Academy of Sciences. Professor. PhD in Biological Sciences.

Tariel Omarov

Azerbaijan Medical University. Department of surgical diseases. PhD in Medicine

Tubukhanum Gasimzadeh

Azerbaijan National Academy of Sciences. Institute of Dendrology of Azerbaijan NAS. Leading researcher PHD in Biological Sciences, Associate Professor.

Georgia

Eter Bukhnikashvili

Dental clinic "NGM-Innovation Dental". The doctor-stomatologist. PhD in Medicine.

Gulnara Kiliptari

Tbilisi State Medical University. Head of ICU department. Associate professor.

Iamze Taboridze

Scientific Center of the Humanitarian Educational University, Head, PhD in Medicine. Associate professor.

Lali Akhmeteli

Surgery Department #1, Direction of Surgical Disease, Tbilisi State Medical University. Associated Professor of General Surgery.

Maia Matoshvili

Tbilisi State Medical University. The First University Clinic. Dermato-Venereologist. Assistant Professor. PhD in DAPS.

Mariam Darbaidze

Davit Aghmashenebeli National Defense Academy of Georgia. The Head of Education Division. PhD in Biology.

Mariam Kharaishvili

Ilia State University. Assistant Professor. PhD MD.

Nino Gogokhia

Tbilisi State Medical University. Head of Laboratory the First University Clinic. Professor.

Nino Museridze

GGRC Georgian-German Center for Reproductive Medicine, Owner and Clinical Director. The Doctor of Medicine, Full Professor.

India

Prasanta Kumar Mitra

Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences. Department of Medical Biotechnology. PhD in Biochemistry.

Kazakhstan

Alessandra Clementi

Nazarbayev University School of Medicine. MD, GP. Assistant Professor of Medical Practice and Family Medicine

Anar Mirazagalieva

Astana International University. Vice-President. PhD in Biology.

Gulmira Zhurabekova

Marat Ospanov West-Kazakhstan State Medical Academy. Department of Human Anatomy. Associate Professor

Marina Bobireva

West Kazakhstan State Medical University named Marat Ospanov. PhD.

Nuriya Kharissova

State University of Karaganda. Associate Professor of Biological Science

Zhanargul Smailova

Head of the Department of Biochemistry and Chemical Disciplines named after MD, professor S.O. Tapbergenova NAC Medical University of city Semey.

Kyrgyzstan

Tamara Abaeva

Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbayev, Head of the Department of Normal and Topographic Anatomy, Associate Professor. PhD in Medicine.

Libya

Salaheddin Sharif

University of Benghazi, International Conference on Sports Medicine and Fitness, Libyan Football Federation- Benghazi PhD in Medicine (MD)

Poland

Robert Pawel Suslo

Wroclaw Medical University, Public Health Department, Health Sciences Faculty, Adjunct Professor of Gerontology Unit. PhD MD.

Romania

Minodora Dobreanu

University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș. Faculty of Medicine. Professor. PhD in Medicine.

Russia

Alexander A. Sazanov

Leningrad State University named A.S. Pushkin. Doctor of Biological Sciences. Professor

Grigory G. Levkin

Siberian State Automobile and Highway Academy. Omsk State Transport University. PHD of Veterinary Sciences

Nikolay N. Sentyabrev

Volgograd State Academy of Physical Culture. Doctor of Biological Sciences. Professor. Academician.

Olga Pavlova

Medical University named Rehabilitation, Doctors and Health, Professor of the Department of Morphology and Pathology, Doctor of biological sciences, physiology.

Sergei A. Ostroumov

Moscow State University. Doctor of Biological Science. Professor

Serbia

Jane Paunkovic

Faculty for Management, Megatrend University. Full Professor. PhD, Medicine

Turkey

Melis Gönülal

University of Health Sciences, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, PhD in Medicine, Associate Professor.

Mehmet Inan

Turkish Physical Education Teachers Association. Vice president. PhD in Health Sciences, Physical Education and Sport Sciences

Muzaffer Sancı

University of Health Sciences. Tepecik Research and Teaching Hospital. Clinics of Gynecology and Obstetrics Department of Gynecologic Oncologic Surgery. Associated Professor.

Vugar Djafarov

Medical school at the University of Ondokuzmayıs Turkey. PhD. Turkey.

Ukraine

Alla Oleksyuk-Nexhames

Lviv University of Medicine. Neurologist at pedagog, pryvaty refleksoterapy. MD PD.

Dmytro Horilyk

Head of the Council, at Pharmaceutical Education & Research Center. PhD in Medicine.

Hanna Huliaieva

Institute of Microbiology and Virology, NASU, department of phytopatogenic bacteria. The senior research fellow, PhD in Biology.

Roman Lysyuk

Assistant Professor at Pharmacognosy and Botany Department at Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

USA

Nicolai Panikov

Lecturer at Tufts University. Harvard School of Public Health. PhD/DSci, Microbiology

Rose Berkun

State University of New York at Buffalo. Assistant Professor of Anesthesiology, PhD. MD

Wael Al-Husami

Lahey Hospital & Medical Center, Nardone Medical Associate, Alkhaldi Hospital, Medical Doctor, International Health, MD, FACC, FACP

Uzbekistan

Guzel Kutlieva

Institute of Microbiology. Senior Researcher. PhD in BS.

Khurshida Narbaeva

Institute of Microbiology, Academy of Sciences Republic of Uzbekistan, Doctor of biological sciences.

Shaklo Miralimova

Academy of Science. Institute of Microbiology. Doctor of Biology Sciences. PhD in BS.

AIMS AND SCOPE

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals publishes peer-reviewed, original research and review articles in an open access format. Accepted articles span the full extent of the social and behavioral sciences and the humanities.

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals seeks to be the world's premier open access outlet for academic research. As such, unlike traditional journals, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals does not limit content due to page budgets or thematic significance. Rather, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals evaluates the scientific and research methods of each article for validity and accepts articles solely on the basis of the research. Likewise, by not restricting papers to a narrow discipline, ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals facilitates the discovery of the connections between papers, whether within or between disciplines.

ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals offers authors quick review and decision times; a continuous-publication format; and global distribution for their research via ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals Online. All articles are professionally copyedited and typeset to ensure quality.

Those who should submit to ICRET MTÜ The Baltic Scientific Journals include:

- Authors who want their articles to receive quality reviews and efficient production, ensuring the quickest publication time.
- Authors who want their articles to receive free, broad, and global distribution on a powerful, highly discoverable publishing platform.
- Authors who want their articles branded and marketed by a world-leading social science publisher.
- Authors who want or need their articles to be open access because of university or government mandates.

TOPICS OF JOURNAL

Clinical Medicine
Prophylactic Medicine
Theoretical Medicine
Stomatology & Dentistry
Pharmaceutical Chemistry and Pharmacology
Innovations in Medicine
Biophysics and Biochemistry
Radiology and Microbiology
Molecular Biology and Genetics
Health and Reproductive Endocrinology
Microbiology and Hydrobiology
Ecology, Immunology and Biotechnology
Virology and Immunology
Entomology
Alternative medicine
Anatomy
Biochemistry
Clinical immunology
Clinical microbiology
Cytology
Embryology
Endocrinology
Epidemiology
Human Genetics & Genetic Disease
Gynaecology
Histology:
Intensive care medicine
Internal medicine

- Cardiology
- Endocrinology
- Oncology
- Pulmonology
- Rheumatology

Microbiology:
Neuroscience:
Nutrition:
Pathology
Pharmacology
Radiology
Toxicology
Urology
Surgery
Pediatrics
Pharmaceutical sciences

NGO International Center for Research, Education & Training (Estonia, Tallinn) is publishing scientific papers of scientists on Website and in Referred Journals with subjects which are mentioned below:

© **The Baltic Scientific Journals**

ISSN: 2613-5817; E-ISSN: 2613-5825; UDC: 0 (0.034);
DOI PREFIX: 10.36962/PIRETC
Proceeding of The International Research Education & Training Center.
<https://scia.website/index.php/piretc>

ISSN: 2674-4562, E-ISSN: 2674-4597, UDC: 620.9 (051) (0.034);
DOI PREFIX: 10.36962/ENECO
Proceedings of Energy Economic Research Center. ENECO
<https://scia.website/index.php/eneco>

ISSN: 1609-1620, E-ISSN: 2674-5224; UDC: 62 (051) (0.034);
DOI PREFIX: 10.36962/PAHTEI
Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. PAHTEI
<https://scia.website/index.php/pahtej>

ISSN: 2663-8770, E-ISSN: 2733-2055; UDC: 672, 673, 67.01-67.02
DOI PREFIX: 10.36962/ETM
ETM Equipment, Technologies, Materials
<https://scia.website/index.php/etm>

ISSN: 2733-2713; E-ISSN: 2733-2721; UDC: 33
DOI PREFIX: 10.36962/SWD
SOCIO WORLD-SOCIAL RESEARCH & BEHAVIORAL SCIENCES
<https://scia.website/index.php/swd>

E-ISSN: 2587-4713; UDC: 620.9 (051) (0.034)
DOI PREFIX: 10.36962 / ECS
Economics
<https://scia.website/index.php/ecs>

Society of Azerbaijanis living in Georgia. NGO. (Georgia, Tbilisi) is publishing scientific papers of scientists on Website and in Referred Journals with subjects which are mentioned below:

© **Southern Caucasus Scientific Journals**

ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; UDC: 611-618

DOI PREFIX: 10.36962/ALISJMSC

Ambiance in Life-International Scientific Journal in Medicine of Southern Caucasus.

<https://scia.website/index.php/ALISJMSC>

Representation of the International Diaspora Center of Azerbaijan in Georgia. NGO (Georgia Tbilisi) is publishing scientific papers of scientists on Website and in Referred Journals with subjects which are mentioned below:

© **Southern Caucasus Scientific Journals**

ISSN: 2298-0946, E-ISSN: 1987-6114; UDC: 3/k-144

DOI PREFIX: 10.36962/CESAJSC

The Caucasus-Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus

<https://scia.website/index.php/CESAJSC>

[Review Article Template]

[This Review Article Template has the standard set of headings that make up different sections of the manuscript.]
[Below the headings the dummy text is given in red color.]
[Delete the dummy text in red color and replace it with your own text.]
[You can directly type your text here or copy your text from your file and paste it at the appropriate place.]
[Delete any section or heading you do not need.]
[If you need more than one set of headings, you can copy and past the headings.]
[Keep the right margin of the text ragged. Do not use “Justify text” command.]
[Please make sure that the reference format conforms to the journal reference style.]
[DO NOT FORGET TO FREQUENTLY SAVE THIS FILE WHILE WORKING ON THIS MANUSCRIPT TO PREVENT LOSS OF DATA.]
[DOUBLE SPACE THE MANUSCRIPT THROUGHOUT (Title Page need not be double spaced)]
[DELETE ALL TEXT IN RED COLOR BEFORE SUBMITTING YOUR MANUSCRIPT.]

TITLE: PAPER TITLE (Title, Times New Roman, bold, 14)

[Enter here the title of manuscript in sentence case (14 Bold)-capital letter.]

AUTHORS: [List here all author names; identify authors with author affiliations with superscript Arabic numerals]

**[First Name Middle Name Family Name¹], [First Name Middle Name Family Name²]
[First Name Middle Name Family Name³], [First Name Middle Name Family Name⁴]
(Author(s), Times New Roman, bold, 12)**

AFFILIATIONS: [List here all author affiliations including position in the department, department, institute, city, state, country, email; identify authors with author affiliations with superscript Arabic numerals]

¹ [Author affiliations – position, department, institute, city, state, country, email ID, ORCID ID]

² [Author affiliations – position, department, institute, city, state, country, email ID, ORCID ID]

³ [Author affiliations – position, department, institute, city, state, country, email ID, ORCID ID]

(Affiliation1,2,3 Times New Roman, 10)

CORRESPONDING AUTHOR DETAILS

[Give here name, contact address, contact phone number, email and fax number of the corresponding author, Corresponding author must be one of the authors of the manuscript.]

[First Name Middle Name Family Name]

[Complete Mailing Address]

[City]

[State]

[Country]

[Postal Code]

[Contact Phone Number - Country prefix followed by full phone number]

[Contact Email]

[Fax number - Country prefix followed by full fax number]

(Affiliation for CA Times New Roman, 10)

Short Running Title: [Give here a short title of the paper, less than 40 characters] (Times New Roman, 10)

Guarantor of Submission: The corresponding author is the guarantor of submission.

[If an author other than the corresponding author is the Guarantor of Submission, delete the previous line, write the name of the individual and give the details below.]

(Times New Roman, 10)

Guarantor of Submission (if not the corresponding author)

[Give here name, contact address, contact phone number, email and fax number of the guarantor of Submission, if other than the corresponding author]

[First Name Middle Name Family Name]

[Complete Mailing Address]

[City]

[State]

[Country]

[Postal Code]

[Contact Phone Number - Country prefix followed by full phone number]

[Contact Email]

[Fax number - Country prefix followed by full fax number]

(Times New Roman, 10)

SUMMARY (OPTIONAL) (Times New Roman, 12 Bold)

[This section of the manuscript is optional. It is up to the author(s) to decide whether to include this section in the manuscript.]

["Summary" of your work is a short description of the work being presented in your article. It is longer than the "Abstract" which is limited to 250 words for all types of articles. After reading the "Summary" a reader should be able to understand the background information, why the work is being reported, what the significant results are, and what may be the explanation for the results.]

[Although writing an additional section in the form of "Summary" of your work may seem like an extra burden on your time and resources, it will be an important part of your manuscript especially for articles which are highly technical. Many times readers who are students, or who are not expert on the subject of the article or readers who are experts but in related subjects may skip reading an article if on first look the article appears to be very technical with lot of data, facts and statistics. Some other articles may not be easy to understand, on first reading, even by experts in the subject of the article. The "Summary" section will help the readers in understanding the results of your study.]

- The recommended word limit for "Summary" for Review Article is – 800 words (2 pages)
- When writing the "Summary" use as simple and as non-technical language as possible. Write the "Summary" as if you are explaining your study to a first year graduate student.
- Do not repeat or copy text verbatim from the main text of your manuscript. "Summary" will probably be the most important and most widely read part of your manuscript. Write it fresh as a separate section.
- In the "Summary" give: 1) relevant background information, 2) why the work was done, 3) what were the significant results, 4) possible explanation of the results.
- Only give the significant results of your study and give their possible explanation.
- Do not compare your results with other studies.
- Do not give references in the "Summary" section. First reference should start in main text of your manuscript from the "Introduction" section.

TITLE: [Enter Here the Title of Manuscript in Sentence Case.]

ABSTRACT (Times New Roman, 12)

OBJECTIVE: (Times New Roman, 12)

METHODS: (Times New Roman, 12)

RESULTS: (Times New Roman, 12)

CONCLUSION: (Times New Roman, 12)

[Structured or unstructured abstract as required by the manuscript]

[Less than 250 words for all manuscripts]

Keywords: [Four to six keywords for indexing purpose] (Times New Roman, 12)

TITLE: [Enter here the title of manuscript in sentence case.] (Times New Roman, 12)

[Type or copy/paste the manuscript text under the headings below. References are in square brackets, e.g. [1, 2, 3] and figures/tables are in parenthesis, e.g. (Figure 1) or (Table 1)]

INTRODUCTION (Times New Roman, 12 Bold)

[Type or copy/paste your text here]

(Times New Roman, 12)

[After "INTRODUCTION" rest of the headings or subheadings can be as required by the manuscript]

[Heading (level 1 heading is in CAPITALS followed by text)] (Times New Roman, 12 Bold)

DDDD DDDD DDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDD DDDDD DDDDD DDDDD]

(Times New Roman, 12)

[Subheading (level 2 heading is in sentence case, followed by text) (Times New Roman, 12 Bold)

DDDD DDDD DDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDDDD]

(Times New Roman, 12)

[Subheading (level 3 heading is in sentence case, in line with text) (Times New Roman, 12 Bold) DDDD DDDD

DDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDD DDDDDDDDD DDDDDDD DDDD DDD D D DDDDD DDDDDDD D D DD DD]

(Times New Roman, 12)

CONCLUSION (Times New Roman, 12 Bold)

[Type or copy/paste your text here]

(Times New Roman, 12)

CONFLICT OF INTEREST (Times New Roman, 10 Bold)

[Declare here if any financial interest or any conflict of interest exists.]

(Times New Roman, 10)

AUTHOR'S CONTRIBUTIONS (Times New Roman, 10 Bold)

[Enter name of authors followed by author's contribution.]

[At least one task from each group is required from an individual to be listed as author of the article, delete anything which is not applicable.]

(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published
(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

[First Name Middle Name Family Name]

Group1 - Conception and design, Acquisition of data, Analysis and interpretation of data

Group 2 - Drafting the article, Critical revision of the article

Group 3 - Final approval of the version to be published

(Times New Roman, 10)

ACKNOWLEDGEMENTS (Times New Roman, 12 Bold)

[List here any individuals who contributed in the work but do not qualify for authorship base on the above criteria.]

REFERENCES (Times New Roman, 12 Bold)

[List here all the references in the order of citation in the text. List all authors if less than six. If more than six authors, list the first six followed by "et.al."]

[General style of reference is:]

[Surname First Name Middle Name, Surname First Name Middle Name. Title of article. Journal Name

Year;Volume(Number):Full inclusive page numbers.]

[NO SPACES BETWEEN - Year;Volume(Number):Full inclusive page numbers.]

1. [Surname First Name Middle Name, Surname First Name Middle Name. Title of article. Journal Name
Year;Volume(Number):Full inclusive page numbers.]

2. [Surname First Name Middle Name, Surname First Name Middle Name. Title of article. Journal Name
Year;Volume(Number):Full inclusive page numbers.]

3. [Reference 3]

4. [Reference 3]

5. [Reference 3]

6. [Reference 3]

(Times New Roman, 12 Bold)

SUGGESTED READING (Times New Roman, 12 Bold)

[In this section include references to articles, abstracts, books, manuals, web pages, videos, presentations or any other material you have referred to in planning and writing your study which are either not directly relevant to your study or not important enough to be cited in the text and given in the "References" section.]

[Include any number of items in this section, but we suggest you to limit the number to 15 or less for review articles and original articles and 10 or less for case series and case reports.]

[Please DO NOT cite the items in the "Suggested Reading" section in the text of your manuscript.]

TABLES (Times New Roman, 12 Bold)

[All tables should be double spaced. Each table on a separate page]

Table 1: [Type or copy/paste here a brief descriptive title of the table DO NOT use full-stop after table sentence]
 (Times New Roman, 12)

Abbreviations: [Give here full form of all abbreviations used in the table. Give the full form even if it has been explained in the text.]

[All tables should be double spaced. Each table on a separate page]

Table 2: [Type or copy/paste here a brief descriptive title of the table DO NOT use full-stop after table heading]
 (Times New Roman, 12)

Abbreviations: [Give here full form of all abbreviations used in the table. Give the full form even if it has been explained in the text.]

FIGURE LEGENDS (Times New Roman, 12 Bold)

Figure 1: [Give here a description of figures/image, include information like contrast media, stain, chemical, power used, protect patient privacy at all times. End the legend with full stop.]
 (Times New Roman, 12)

Figure 2: (A) – [If a figure has many parts give here a description of part of figures/image, include information like contrast media, stain, chemical, power used, protect patient privacy at all times;] (B) – [Give here a description of part of figures/image, include information like contrast media, stain, chemical, power used, protect patient privacy at all times. End legend with full stop.]
 (Times New Roman, 12)

[illegible]

JOURNAL INDEXING

ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; UDC: 611:612, DOI: 10.36962/ALISJMSC

©**Publisher:** LTD The Southern Caucasus International Academy of Modern Sciences.. (UK, London).

Director and shareholder: Namig Isazade. Professor.

Deputy and shareholder: Namig Isazade. PhD in Business Administration.

Direktorun müavini və Payçı: Namig Isazade. PhD in Business Administration.

©**Editorial office:** 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

©**Typography:** LTD International Research, Education & Training Center. (UK, London).

Registered address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

Telephones: +994 55 241 70 12; +994 51 864 88 94

Website: <https://scia.website/>

E-mail: gulustanbssjar@gmail.com, sc.mediagroup2017@gmail.com

©**Publisher:** Society of Azerbaijanis living in Georgia. NGO. (Georgia, Tbilisi)

Deputy of director of organization: Seyfulla Isayev.

©**Editorial office:** Tbilisi, Georgia, 0163.

©**Typography:** NGO Representation of Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia. SC Journals.

Registered address: Marneuli municipality, v. Takalo, Georgia, 0165.

Telephones: +994 55 241 70 12; +994518648894; +994 55 241 70 09

Website: <https://scia.website/>

E-mail: gulustanbssjar@gmail.com, sc.mediagroup2017@gmail.com

13.08.2021

ISSN: 2346-8068; E-ISSN: 2346-8181; DOI: 10.36962/ALISJMSC

© SOUTHERN CAUCASUS SCIENTIFIC JOURNALS

AMBIANCE

IN LIFE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN MEDICINE

JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE
REFEREED & REVIEWED JOURNAL

<https://scia.website/index.php/AILISJMSC>