

A Revision of the Genera and Species of Herbaceous Capsular Gamophyllous Liliaceæ. By J. G. BAKER, Esq., F.L.S. &c.

[Read February 3, 1870.]

I BELIEVE that I am quite safe in saying that there is now no Order of flowering plants in which, at any rate in proportion to the inherent and necessary complication of the subject, there is more difficulty and loss of time incurred in determining the name of an unknown plant, than in Liliaceæ. One principal reason of this difficulty is that it is now twenty-seven years since the last general handbook of the order, the fourth volume of the 'Enumeratio' of Kunth, was written, and that, of course, during those twenty-seven years a considerable number of new genera and species have been published, the accounts of which are scattered widely through local floras and periodicals, and have never been gathered together and worked up upon a uniform plan. And, for various reasons, the work just mentioned, which is the only one that is at all available for use as a working handbook, is not well adapted for that purpose. It is the production of a very experienced and excellent botanist; but, even for that time, he does not seem to have had in this order an extensive command of material to work upon, and, in consequence, has often been obliged to compile his account of genera and species from his predecessors, who have not described them upon a uniform plan, or used a uniform terminology. His descriptions of genera are very careful and elaborate, occupying frequently the greater part of a closely printed octavo page; but, as Dr. Lindley complained when the work was published, they are scattered all through the book, and no help is given to the student, either by means of italics or an analytical key, towards choosing out from the long array of characters those which are relied upon in each particular case for furnishing the characteristic distinction of the genus. When a number of closely allied genera are dealt with in this way, I need scarcely point out that it requires a very needless expenditure of time and trouble to settle in which an unknown specimen must be placed; and not only so, but there is very great danger of an author who follows this plan making for himself, or adopting from others, genera which do not possess any definite generic individuality. To illustrate this last proposition, I need not go further than the work with which we are

now dealing. As I have lately had occasion to show elsewhere, between the extreme points of *Scilla*, as that genus is (as I believe rightly) constituted in the 'Enumeratio,' four other genera which the author has adopted, must be placed, viz. *Barnardia*, *Lebedouria*, *Eratobotrys*, and *Drimia*. About half the species placed by Kunth in *Scilla* have two, and the other half have several ovules in each of the three cells of the ovary. Lindley separated, under the name of *Barnardia*, two Asiatic species, which only differ structurally from the plants just referred to by having only a single ovule in each of the cells. This character seems quite insufficient to found a genus upon, and he either overlooked or did not know that a long-known species of *Scilla* from Barbary (*parviflora* of Desfontaines) is also uniovulate. Kunth, however, keeps up *Barnardia*, but retains the Barbary plant in *Scilla*, and in consequence this latter has since been made into a monotypic genus by Steinheil under the name of *Stellaris*. The other three genera quite coincide with one another in structure, and only differ geographically, *Lebedouria* being an inhabitant of India, *Eratobotrys* of Nubia and Abyssinia, and *Drimia*, as Kunth defines it, of the Cape of Good Hope. In the typical species of *Scilla* the divisions of the perianth spread from the very base when the flower is fully expanded; but in these plants, as in the Common Wild Hyacinth of our English woods (the *Scilla nutans* of Smith and Kunth), the divisions, though not properly conate at the base, as they are in the cultivated *Hyacinthus orientalis*, yet cohere permanently in a cup, and spread only for the upper half or two-thirds. The intermediate gradation between these two shapes of flower may be easily studied in *Scilla campanulata*, which is a South-European subspecies of *nutans* very common in the gardens round London. But this is rather a digression from the main question. I believe that no one who has at all attended to the order will feel any doubt that a thorough revision both of its genera and species is needed, directed with a view to ascertain, from the consideration of all the species which are now known, what are the best limitations and diagnostic characters of the former, and to bring together the species in one view, and define them more explicitly upon a uniform plan. This is what, in the present paper, I have attempted to do for a section of the order as fully as the material at my command would permit. Liliaceæ is an order in which, as a general rule, the distinction between allied species cannot

be investigated satisfactorily with dried specimens. Unfortunately for the object of this paper, these plants, after having been once the fashion, have now gone out of fashion as general objects of cultivation, and at the present time have given place to Orchids and showy bedding-plants. In consequence of this state of things I am afraid that a large proportion, especially of smaller Cape species, which have been introduced into European gardens, have been entirely, and some, I fear, irrevocably lost in a living state. On the other side of the account, we may congratulate ourselves that good figures (though often without dissections) of most of the species that have been cultivated are preserved in the 'Botanical Magazine,' the 'Botanical Register,' Sweet's 'Flower Garden,' and the magnificent plates of Jacquin; and it is to be noted also that what has just been said about dried specimens, and the differences which characterize species, fortunately does not apply, or applies much less forcibly, to those structural differences which characterize genera and subgenera. For living specimens I have used for this paper almost solely the collection at Kew and that of Mr. Wilson Saunders. Of the Liliaceæ contained in the latter, a selection of figures of some of the most interesting is contained in the number of the 'Refugium Botanicum' which is now ready to appear, which is devoted entirely to the order, and contains plates and descriptions of eighteen new species, several of which are of great horticultural interest; and, I believe, there are very few species now in cultivation in the country which these two collections do not contain. For dried specimens, I have relied mainly upon the three sets now amalgamated at Kew—those of Sir W. Hooker, Mr. Bentham, and M. Gay. The latter contains a very fine series of specimens of the European genera, especially of *Allium*, but little that is extra-European. I have consulted, when necessary, the herbaria of Linnaeus and Sir J. E. Smith; but neither of them contains much affecting that part of the order which is here dealt with. There is a fine series of the older-known species (many of the specimens dried from Kew in the days of Aiton and Solander) at the British Museum, including several I have not elsewhere seen; and I wish to express my best thanks to Dr. Perceval Wright and the Trustees of the Herbarium of Trinity College, Dublin, for their courtesy in allowing me the loan, for leisurely examination and comparison with the Kew specimens, of the set of Cape Liliaceæ there gathered together

under the superintendence of Dr. Harvey, which contains many unpublished species.

The section of the order dealt with in the present paper is one that is circumscribed with tolerable definiteness. I have not thought it needful to enter upon any points connected with the general characterization and relationships of the order, because I believe that these may be regarded as settled quite satisfactorily, and that any thing which I could say would only go to confirm what botanists appear to be already fully agreed upon. The great body of Endogens with a corolla-like perianth, with divisions in sixes, and stamens in sixes or threes, falls into two alliances, characterized, the one by a superior, and the other by an inferior ovary and fruit, so as to leave very few of its genera in a position at all doubtful or intermediate. In subdividing the former alliance, we get characters, which are universally regarded as of ordinal value, in the extrorse anthers, separated styles, and septicidally dehiscent capsules of Colchicaceæ. Deducting also Pontederiaceæ, a small order of not more than thirty species, in which the perianth is twisted in aestivation, there remain considerably over 1000 species, the great bulk of which agree closely in all important points of structure. It seems to be most natural to regard all these plants as constituting a single order, and to arrange the great bulk of the species in two series, in one of which the fruit is a berry, and in the other a capsule. In these two series the great bulk of the order will readily rank, and there will remain over only a few exceptional groups, each containing a few species only, such as *Roxburghia*, *Lapageria*, and *Philesia*, in which the ovary is 1-celled, with parietal placentation, Conantheræ, which approximate to Amaryllidaceæ by their partially adherent ovaries, Uvularieæ, which approximate to Colchicaceæ by their extrorse anthers, Parideæ, which approximate to Colchicaceæ by their disunited styles, and a few others. Taking the capsular series of genera, the most natural and convenient method is, I think, to dispose them in two subseries, one characterized by having the segments of the perianth free from one another down to the very base, and the other by having them joined together for at least the lower third or quarter. If we follow this method there is no difficulty in deciding clearly in which of the two subseries each genus will fall; and if we use for tribal characters the general arrangement of the inflorescence and the nature of the root-stock, the tribes of the two subseries will,

to a large extent, run parallel with one another—*Hyacintheæ*, bulbs of the gamophyllous subseries with racemose inflorescence, answering to *Scilleæ*, in which the segments of the perianth are free, *Hemerocallideæ* in the same way to *Anthericeæ*, *Milleæ* to *Allieæ*, and the other tribes in each of the two subseries less closely. This is a general outline of what I believe to be the most natural classification of the order; and in this paper all the known genera and species of the gamophyllous capsular series are reviewed, with the exception of the tribe *Aloineæ*, which has formed the subject of a beautifully illustrated monograph by Prince Salm-Dyck.

Of the genera, I believe I have had an opportunity of examining a more or less perfect specimen of every one that has been proposed. I have kept up all for which I thought I was able to find any clearly definable structural individuality; but even as compared with the ‘*Enumeratio*,’ I have felt bound to erase a good many of the small ones from the list, finding, as I proceeded, that it was quite impossible to do otherwise and at the same time characterize genera with reasonable clearness. I must not pass this point without acknowledging my obligations to the fragment of *Salisbury’s ‘Genera Plantarum’* which Dr. J. E. Gray has lately so liberally printed and circulated. This order seems to have been a particular favourite with that author; and his researches upon it were made at a time when the cultivation of these plants was at its highest point of popularity. His planning-out and definition of the genera show great care and acuteness; but in circumscribing them he went upon a track the direct opposite of that which I have followed. It will be seen that, although I have only adopted one of his genera as a genus, I have used many of his names and groups for subordinate divisions. Indeed I may say that I have felt it only due to the sterling merits of the work, and of a botanist who left behind him no adequate memorial of his ability and industry, to incorporate as many of his groups and names as I could possibly include. The total number of genera which I have defined is 26, and of species about 220, being an average of about eight species to a genus. In this portion of the capsular series, a condition of things quite different from what we see in other parts of the order, both large genera and good monotypic genera are comparatively few in number, the rule being genera of small or moderate size, in most of the tribes clearly bounded, with

species often very near to one another. Of the 220 species, about 40 are here described for the first time ; and I have placed as varieties a good many forms which may often deserve a higher rank, but which, if so, want their characters elucidated more fully from study in a living state. Half the 220 species belong exclusively to the Cape of Good Hope ; one tribe, containing upwards of 30 species, belongs entirely to America ; and the other 80 species are scattered over the Old World, very few of them extending beyond the bounds of the Temperate Zone.

CLAVIS TRIBUUM ET GENERUM.

Ordo LILIACEÆ. Monocotyledones florideæ perianthio corollino regulari vel subregulari, aestivatione recto, ovario supero triloculari, loculis ex angulo centrali ovuliferis, stylis connatis (raro nullis vel disjunctis vel rarissime ovario uniloculari placentis parietalibus), antheris introrsis, fructibus capsularibus vel baccatis, embryone in albumine immerso.

Subordo 1. LILIACEÆ VERÆ. Fructus capsularis, trilocularis. Styli connati.

Series 1. *Perianthium segmentis basi distincte connatis.*

Tribus 1. HEMEROCALLIDÆ. Herbæ radicibus crasse fibrosis, floribus racemosis vel paniculatis pedunculis paullulum foliatis.

* *Inflorescentia paniculata.*

1. PHORMIUM. Perianthium tubulosum. Folia rigida. Flores copiose thyrsoideo-paniculati. *Nova-Zelandia et Insula Norfolk.*
2. HEMEROCALLIS. Perianthium late infundibuliforme. Folia graminea. Flores sparse corymboso-paniculati. *Regiones boreali-temperatae veteris orbis.*

** *Inflorescentia racemosa.*

3. KNIPHOFIA. Perianthium tubulosum, limbo perbrevi. Folia angusta, dura. *Cap. B. Spei et Africa trop. orientalis.*
4. BLANDFORDIA. Perianthium infundibuliforme segmentis tubo 5-6-plo brevioribus, staminibus supra medium insertis. Capsula longe stipitata, septicide trivalvis. Folia angusta dura. *Australia.*
5. FUNKIA. Perianthium infundibuliforme, segmentis tubo æquantiibus. Stamina hypogyna. Capsula sessilis, loculicide trivalvis. Folia lata. *Japonia, China borealis, Siberia orientalis.*

Tribus 2. AGAPANTHEÆ. Herbæ radicibus crasse fibrosis, floribus umbellatis pedunculis nudis. *Capenses.*

6. AGAPANTHUS. Perianthium infundibuliforme. Filamenta foliiformia, declinata. Capsula septicide trivalvis.
7. TULBAGHIA. Perianthium rotatum. Filamenta nulla. Capsula loculicide trivalvis.

Tribus 3. MILLEÆ. Herbæ bulbosæ pedunculis nudis, floribus umbellatis vel raro solitariis. *Americanæ.*

* *Coronatæ.*

8. ANDROSTEPHIUM. Tubus infundibuliformis, segmentis æquans. Filamenta prorsus in coronam concreta. Capsula loculicide trivalvis. *Texas.*
9. BESSERA. Tubus campanulatus, segmentis 4–6-plo brevior. Filamenta dimidio superiore libera. Capsula septicide trivalvis. *Mexico.*

** *Ecoronatæ.*

10. LEUCOCORYNE. Perianthium infundibuliforme vel subrotatum segmentis tubo æquantibus vel brevioribus. Antheræ 3, in tubo subsessiles. Staminodia 3, calcariformia, ad faucem inserta. *Chili, Peruvia.*
11. BRODIÆA. Perianthium infundibuliforme (vel in specie unica late tubulosum) segmentis tubo longioribus vel brevioribus. Antheræ 3, ad faucem sessiles. Staminodia 3, petaloidea, cum antheris uni-seriata. *Amer. borealis occidentalis.*
12. MILLA. Perianthium infundibuliforme, tubo cylindrico vel campanulato, segmentis tubo æquantibus vel 2–4-plo brevioribus. Stamina 6, perigyna, uniseriata vel biseriata. *Amer. borealis et australis præcipue occidentalis.*

Tribus 4. MASSONIEÆ. Herbæ bulbosæ pedunculis nudis brevibus vel subnullis, floribus congestis corymbosis raro solitariis. *Capenses.*

13. MASSONIA. Perianthium tubuloso-gamophyllum segmentis æquilibus linearibus vel lanceolatis. Folia 2.
14. BRACHYSCYPHA. Perianthium campanulato-gamophyllum, segmentis ligulatis interioribus paulo longioribus. Folia plurima.
15. DAUBENYA. Perianthium tubuloso-gamophyllum limbo subbiliato segmentis valde inæqualibus. Folia 2.

Tribus 5. HYACINTHEÆ. Herba bulbosæ pedunculis nudis, floribus racemosis raro spicatis vel solitariis.

* *Segmenta limbi distincte difformia.*

16. DIPCADI. Perianthium viride vel flavo-virescens, tubuloso-gamophyllum. Filamenta brevia recta. Semina discoidea. *Regiones præcipue temperatae veteris orbis.*

17. LACHENALIA. Perianthium albidum vel fulgens, campanulato-gamophyllum. Filamenta elongata, declinata. Semina parva, lageniformia. *Capenses.*

** *Segmenta limbi conformia deltoidea.*

18. VELTHEIMIA. Perianthium rubrum, longe tubulosum, filamentis filiformibus ad medium tubi uniseriatim insertis. *Capenses.*

19. MUSCARI. Perianthium cœruleum, oblongo- vel obovoideo-urceolatum, filamentis brevibus prope medium tubi biseriatim insertis. *Eur. merid. Barbaria, Oriens.*

20. LITANTHUS. Perianthium viridescens, perparvum, solitarium, tubulosum, staminibus ad faucem sessilibus uniseriatis. *Capenses.*

*** *Segmenta limbi conformia, ligulato-lanceolata.*

21. DRIMIA. Perianthium campanulato-gamophyllum, segmentis ligulatis cucullatis. Semina discoidea. Filamenta elongata, leviter declinata. *Cap. B. Spei, Afr. trop.*

22. HYACINTHUS. Perianthium infundibuliforme, segmentis planis ascendentibus vel falcatis. Filamenta recta. Antheræ versatiles. Semina parva, ediscoidea. *Eur. merid., Oriens, Africa bor. et merid.*

23. RHADAMANTHUS. Perianthium campanulatum, segmentis erectis. Filamenta recta. Antheræ adnatæ. Semina discoidea. *Capenses.*

24. PUSCHKINIA. Perianthium rotatum, turbinato-gamophyllum, fauce tubo profunde 6-dentato coronatum. Antheræ versatiles, filamentis brevibus intra coronam insertis. Semina parva, ediscoidea. *Oriens.*

25. CHIONODOXA. Perianthium rotatum, turbinato-gamophyllum. Corona nulla. Antheræ versatiles, filamentis brevibus petaloideis. Semina parva, ediscoidea. *Oriens.*

Tribus 6. ODONTOSTEMONEÆ. Herba bulbosa floribus racemoso-paniculatis pedunculo sparse foliato.

26. ODONTOSTEMUM. Genus solum. *California.*

1. PHORMIUM, Forst.

Forst. Gen. No. 24; *Endl. Gen.* No. 1101; *Kunth, Enum.* iv. 274; *Hook. fil. Flo. Nov. Zel.* 286; *Salisb. Gen.* 81.—*Chlamydia, Banks & Sol. in Gærtn. Fruct.* t. 18, p. 71.

Perianthium tubuloso-infundibuliforme, marcescens, leviter curvatum, basi obconica solum gamophyllum, segmentis exterioribus firmioribus, lanceolatis, acutis, interioribus longioribus apice subpatulis. *Stamina* 6, ad basin segmentorum inserta, *filamentis* filiformibus æqualibus exsertis leviter curvatis, *antheris* linear-i-oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, ovulis copiose biseriatis; *stylus* filiformis, staminibus æquans, subdeclinatus; *stigma* capitatum. *Capsula* cornea, cylindraceo-triquetra, loculicide trivalvis, seminibus oblongis complanatis alatis, testa nitida, nigra. *Herbae elatae radicibus crasse fibrosis, foliis rigidis equitantibus distichis, floribus copiose thyrsideo-paniculatis, pedicellis apice articulatis.* *De imprægnatione ovuli* cfr. Schacht, *Ann. Sc. Nat. ser. 4, viii. 275, t. 4.*

Folia 2–3 poll. lata, apice fissa 1. *tenax*.

Folia 9–18 lin. lata, apice vix fissa 2. *Cookianum*.

1. P. *TENAX*, *Linn. Suppl.* 204; *Cook, It.* ii. 96, *cum icono*; *Red. Lil. t. 448–449*; *Bot. Mag. t. 3199*; *Kunth, Enum.* iv. 274; *Hook. fil. Nov. Zel.* 286. Folia utrinque scapum 4–6, 4 pedes vel ultra longa, 2–3 poll. lata, supra subglauca, extrorsum intense glauca, margine et carina cito rubro-brunnea, apice fissa. Scapus cum panicula 5–7-pedalis. Perianthium 18–21 lin. longum, flavo-coccineum. Capsula 3–6 poll. longa, 5–6 lin. crassa. *Nova Zelandia, Insula Norfolk.* Embryo saepe ante lapsum seminis germinans.
2. P. *COOKIANUM*, *Lejolis, Bull. Soc. Hort. Cherb.* p. 71; *Walp. Ann. iii. 630*—P. *Colensoi*, *Hook. fil. in Raoul, Choix*, p. 41; *Flo. Nov. Zel.* p. 287.—P. *Forsterianum*, *Hook. Journ. Bot.* 1844, p. 8, 1851, p. 220. Minor; scapus cum panicula 3–6-pedalis; folia 2–3 pedes longa, 9–18 lin. lata, magis acuminata, apice vix fissa. Perianthium 12–15 lin. longum, magis flavum vel segmentis exterioribus virescentibus. Capsula gracilior, saepe longior. *Nova Zelandia.*

2. HEMEROCALLIS, Linn.

Linn. Gen. No. 433 (*ex parte*); *Endl. Gen.* No. 1143; *Kunth, Enum.* iv. 587; *Salisb. Gen.* p. 81.

Perianthium late infundibuliforme, segmentis oblongo-spathulatis æquialongis flore expanso recurvatis, interioribus paullulum

latrioribus, tubo multo longioribus. *Stamina* 6, ad faucem tubi inserta, *filamentis* filiformibus segmentis brevioribus declinatis, *antheris* linear-i-oblongis versatilibus. *Ovarium* subsessile, oblongum, obtuse trigonum, ovulis copiose biseriatis; *stylus* filiformis, declinatus, staminibus longior; *stigma* capitatum. *Capsula* carnos-o-coriacea, obtuse trigona, rugosa, basi angustata, loculicide trivalvis, seminibus in loculo 6–12, biseriatis, sub-compressis exalatis; *testa* nitida, nigra. *Herbæ radicibus carnos-o-fibrosis, foliis linearibus textura gramoideis, floribus speciosis, magnis, sparse coryboso-paniculatis.*

Flores odori, vitellini.

Segmenta interiora firma venis haud conjunctis.

1. flava.

Segmenta interiora margine membranacea, venis paucis conjunctis.

Folia 2–3 lin. lata; pedicelli et tubi elongati.

2. minor.

Folia 6–8 lin. lata; perianthium tubo brevissimo, segmentis interioribus 5–6 lin. latis 3. *Dumortieri.*

Folia 8–12 lin. lata; pedicelli subnuli; perianthium tubo 5–6 lin. longo, segmentis interioribus 9–12 lin. latis.

4. Middendorffii.

Flores inodori, fulvi, segmentis interioribus margine membranaceo-undulatis venis multis conjunctis 5. *fulva.*

1. H. *FLAVA*, Linn. *Sp.* 462; *Jacq. Hort. Vind.* t. 139; *Bot. Mag.* t. 19; *Red. Lil.* t. 15; *Kunth, Enum.* iv. 588; *Reich. Ic.* t. 1112. Folia 18–24 poll. longa, 6–8 lin. lata, viridia. Scapus foliis excedens. *Corymbus* saepe 6–9-florus, pedicellis 12–24 lin. longis, bracteis parvis lanceolatis. Flores odori, vitellini, 3–4 poll. longi, tubo cylindrico 6–15 lin. longo, segmentis omnibus firmis venulis haud anastomosantibus, exterioribus 6–8 lin. latis, interioribus paullulum latioribus apice minus angustatis. *E Gallia per Europam meridionalem ad Siberiam occidentalem; Japonia (an indigena?).*

2. H. *MINOR*, *Mill. Dict.* No. 2.—H. *graminea*, *Andr. Bot. Rep.* t. 244; *Kunth, Enum.* v. 588; *Miquel, Ann. Mus. Lug. Bat.* iii. 152.—H. *graminifolia*, *Schlecht. Abh. zu Halle, neue Folge*, *Bd. i. quart.* iv. p. 15. H. *pumila*, *Salisb. Gen.* p. 81. Folia 15–18 poll. longa, vix ultra 3 lin. lata, saturate viridia. Scapus foliis subaequans. *Corymbus* 3–6-florus, pedicellis 3–24 lin. longis, bracteis parvis lanceolatis. Flores odori, vitellini, 2½–4 poll. longi, tubo cylindrico 6–12 lin. longo, segmentis exterioribus firmis 4–5 lin. latis, interioribus latioribus ob-

tusioribus, margine membranaceis, venulis paucis conjunctis. *Siberia orientalis*, *China borealis*, et *Japonia*.

3. H. DUMORTIERI, *Morren*, *Hort. Belg.* ii. p. 195, t. 43; *Miquel*, *Ann.* iii. 152; *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 213.—H. graminea β . humilior, *Maxim. Prim.* 285.—H. Sieboldii et rutilans, *Hort.*—H. graminea, *Schlecht. loc. cit.* Folia 12–15 poll. longa, 6–8 lin. lata, viridia. Scapus foliis vix æquans. Corymbus 2–3-florus, pedicellis 3–6 lin. longis, bracteis late lanceolatis pedicellis subæquantibus. Flores odori, vitellini, 2–2½ poll. longi, tubo perbrevi (2–3 lin. longo) vel subnullo, segmentis exterioribus firmis 4–5 lin. latis, interioribus 6 lin. latis obtusioribus margine membranaceis venulis paucis conjunctis. *Siberia orientalis et Japonia*.
 4. H. MIDDENDORFII, *Traut. et Mey. Fl. Ochot.* 94; *Maxim. Amur.* 283; *Regel, Gart.* t. 522. Folia 15–18 poll. longa, 8–12 lin. lata, viridia. Scapus foliis subæquans. Corymbus 2–4-florus, pedicellis brevissimis, bracteis magnis deltoideis interdum 1 poll. longis sufful- Flores odori, vitellini, 3–4 poll. longi, tubo cylindrico 5–6 lin. ongo, segmentis exterioribus subacutis 6–9 lin. latis, interioribus 9–12 lin. latis obtusis, margine membranaceis venulis paucis conjunctis. *Amurland*, *Maximowicz*!
 5. H. FULVA, *Linn. Sp.* 462; *Bot. Mag.* t. 64; *Red. Lil.* t. 16; *Kunth, Enum.* iv. 588; *Reich. Ic.* t. 1113.—H. disticha, *Don in Sweet, Fl. Gard.* t. 28; *Kunth, loc. cit.*—H. crocea, *Lam. Gall.* iii. 267. Fo- a 1½–2 pedes vel ultra longa, 9–15 lin. lata, infra primum glauca. Scapus 2–3-pedalis. Corymbus 6–12-florus, pedicellis brevibus, bra- cteis parvis lanceolatis. Flores inodori, extus flavi, intus fulvo-rubri, 3–4 poll. longi, tubo 9–12 lin. longo, segmentis exterioribus firmis planis 6–9 lin. latis subacutis, interioribus sæpe 1 poll. latis margine membranaceo-undulatis venis multis conjunctis. *E Gallia per Euro- pam meridionalem ad Japoniam.* *Lahul*, *Jaeschke*! *Khasia*, *Griffith*! —H. Kwango, *Hort.* (*Regel, Gart.* t. 500) est forma magna hortensis flore pleno.
- Var. β . *ANGUSTIFOLIA*, *Baker*.—H. longituba, *Miquel, Ann. Mus. Lug. Bat.* iii. 152. Multo minor; scapus subpedalis; folia 12–18 poll. longa, 2–4 lin. lata; segmenta perianthii angustiora, acutiora. *Ja- ponia*, teste *Miquel*, *Khasia, regio temperata*, *Hook. fil. Guriel et Kara- bagh*, *Fischer*!

2*. *HESPEROCALLIS*, *A. Gray*.

A. Gray, Proc. Amer. Acad. 1867, p. 390.

Perianthium infundibuliforme, segmentis erectis subæqualibus ob-

longo-spathulatis medio 5-7-nervatis flore expanso leviter imbricatis, tubo cylindrico duplo longioribus. *Stamina* 6, ad faucem tubi inserta, *filamentis* filiformibus æqualibus subrectis segmentis brevioribus antheris linear-i-oblongis versatilibus. *Ovarium* subsessile, globosum, ovulis copiose biseriatis; *stylus* filiformis, staminibus longior, extrorsum leviter curvatus; *stigma* capitatum. *Capsula* substipitata, subglobosa, loculicide trivalvis, seminibus in loculo 16-20 compressis exalatis; *testa* nigra, nitida. *Herba caule foliato e "bulbo eduli" (an cormo?) oriente, foliis linearibus textura gramoideis, floribus speciosis laxeracemosis pedicellis apice articulatis. Vix ab Hemerocallide generice separanda?*

1. *H. UNDULATA*, *A. Gray, loc. cit.* Caulis bipedalis; folia linearia, margine membranacea, valde undulata; pedicelli 2-3 lin. longi; bractæ coriaceæ, lanceolatæ, pedicellis 2-3-plo longiores; perianthium 24-27 lin. longum, pallide flavum, segmentis circiter 4 lin. latis centro solum verticaliter nervatis. *California (Fort Mohave), Dr. Cooper!* *Mexico Nova, Prof. Newberry.*

3. KNIPHOFIA, Mænch.

Mænch, Meth. 631; Endl. Gen. 1114; Kunth, Enum. iv. 550; Harv. Gen. 2nd edit. 399.—Tritoma, Ker, Bot. Mag. t. 744.—Tritomanthe, Link, Enum. i. 333.—Trichissa, Salisb. Gen. 75.—Rudolphoræmeria, Steud. in Schimp. Pl. Abyss. No. 752.

Perianthium longe tubuloso-gamophyllum, leviter curvatum, segmentis perparvis deltoideis subæqualibus. *Stamina* 6, hypogyna, *filamentis* filiformibus inclusis vel exsertis, 3 paulo longioribus, *antheris* parvis oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongum, ovulis copiose biseriatis; *stylus* filiformis, filamentis excedens; *stigma* trisulcatum. *Capsula* firma, oblonga, sessilis, loculicide trivalvis, seminibus copiose biseriatis subcompressis, arillo parvo pallido præditis. *Testa* atro-castanea, punctata. *Herbæ radicibus carnosofibrosis, foliis multis firmis angustis subtriquetris persistentibus, floribus flavo-coccineis dense ramosis.*

Perianthium 3-4 lin. longum, subæqualiter tubulosum, staminibus omnibus demum exsertis.

- | | |
|--|-----------------------|
| Bractæ floribus triplo breviores | 1. <i>parviflora.</i> |
| Bractæ floribus sesqui vel duplo breviores . . . | 2. <i>breviflora.</i> |

- Perianthium 6–7 lin. longum, tubo pergracili vix ultra $\frac{1}{3}$ lin.
crasso 3. *gracilis*.
 Perianthium 8–10 lin. longum, supra ovarium vix constrictum,
exsiccatum 1– $1\frac{1}{2}$ lin. crassum.
 Stamina inclusa; folia 1 lin. lata 4. *triangularis*.
 Stamina longiora demum exserta.
 Folia 2–3 lin. lata, venis 2–3-jugis 5. *abyssinica*.
 Folia 4–6 lin. lata, venis 6–8-jugis 6. *sarmentosa*.
 Perianthium 15–18 lin. longum, exsiccatum 3–4 lin. crassum,
supra ovarium valde constrictum 7. *isoetifolia*.
 Perianthium 6–8 lin. longum, exsiccatum 2 $\frac{1}{2}$ –3 lin. latum, supra
ovarium valde constrictum.
 Bracteæ ovato-lanceolatæ, 1 $\frac{1}{2}$ –2 lin. longæ .. 8. *Quartiniana*.
 Bracteæ lineares, 4–6 lin. longæ.
 Stamina vix exserta 9. *Grantii*.
 Stamina omnia demum exserta 10. *pumila*.
 Perianthium 15–18 lin. longum, supra ovarium leviter constrictum,
exsiccatum 2–2 $\frac{1}{2}$ lin. latum.
 Folia viridia; stamina longiora vix exserta.
 Bracteæ oblongo-lanceolatæ, pedicellis vix longiores.
 11. *Burchellii*.
 Bracteæ lanceolatae, pedicellis 2–3-plo longiores.
 Folia 1 poll. lata, venis utrinque costæ 12–15.
 12. *precox*.
 Folia 15–18 lin. lata, venis utrinque costæ circiter 20.
 13. *Rooperi*.
 Folia glauca; stamina longiora demum exserta.
 14. *aloidea*.

1. K. *PARVIFLORA*, *Kunth*, *Enum. iv*. 553. Folia 2 lin. lata, margine lævia.
 Racemus 3 poll. longus, pedicellis brevissimis, bracteis ovatis vix ultra
1 lin. longis. Perianthium vix 4 lin. longum, tubulosum, staminibus
exsertis. Loculi 4–5-ovulati. *Cap. B. Spei*, Drège, 4528 (*non vidi*).
 2. K. *BREVIFLORA*, *Hare. MSS.* Folia 9–12 poll. longa, deorsum 1
lin. lata, lævia, venis utrinque costæ 2. Scapus folii subæquans.
 Racemus 12–18 lin. longus, expansus 1 poll. latus. Bracteæ ovato-
lanceolatæ, 2–2 $\frac{1}{2}$ lin. longæ. Pedicelli infimi vix $\frac{1}{2}$ lin. longi Perian-
thium flavum, in floribus superioribus 2 lin., in inferioribus 3–3 $\frac{1}{2}$ lin.
longum, exsiccatum 1 lin. latum, supra ovarium vix constrictum, sta-
minibus omnibus demum exsertis. Loculi 4–5-ovulati. *Cap. B. Spei*
(*Draachensberg, Orange Free State*), Cooper, 1029!

3. K. GRACILIS, *Harv. MSS.* Folia bipedalia, deorsum 2 lin. lata, margine lævia, venis utrinque costæ 5–6. Scapus foliis subæquans. Racemus $2\frac{1}{2}$ –3 poll. longus, expansus 12–15 lin. latus. Bractæ ovatæ, naviculares, obtusæ, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longæ. Pedicelli vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. longi. Perianthium albidum, 6–7 lin. longum, tubo pergracili (hanc ultra $\frac{1}{2}$ lin. crasso) ore dilatato, lacinia ligulato-spathulatis 1 lin. longis, staminibus longioribus et stylo demum exsertis. *Natal (Zulu)*, Gerrard et M'Ken, 2140!
4. K. TRIANGULARIS, *Kunth, Enum. iv.* 551. Folia subpedalia, lævia, vix ultra 1 lin. lata, vena solitaria utrinque costæ, supra omnino triquetra. Scapus foliis subæquans. Racemus $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longus, expansus 15–16 lin. latus. Bractæ linearis-lanceolatae, 3–4 lin. longæ, pedicellis multoties longiores. Perianthium 8–9 lin. longum, exsiccatum 1 lin. latum, staminibus inclusis. Loculi 8–9-ovulati. *Cap. B. Spei*, Drège, 3524!
5. K. ABYSSINICA, *Schwein. Beit.* 249.—*Veltheimia abyssinica*, *Red. Lil. t.* 186. Folia 9–12 poll. longa, 2–3 lin. lata, lævia, venis utrinque costæ 2–3. Scapus foliis subæquans. Racemus 1 poll. vel in planta culta 2 poll. longus. Bractæ lanceolatae, 2–3 lin. longæ, pedicellis 2–3-plo longiores. Perianthium 9–10 lin. longum, exsiccatum 1 lin. latum, staminibus demum exsertis. *Abyssinia*, Dr. Roth!
6. K. SARMENTOSA, *Kunth, Enum. iv.* 552.—*Aletris*, *Andr. Bot. Rep. t.* 54.—*Veltheimia*, *Willd. Enum.* 380.—*Tritoma media*, *Gawl. Bot. Mag. t.* 744; *Red. Lil. t.* 161. Folia glauca, lævia, 12–18 poll. longa, 4–6 lin. lata, venis utrinque costæ 6–8. Scapus foliis subæquans vel excedens. Racemus 2–4 poll. longus, densiflorus, expansus 2 poll. latus. Bractæ lanceolatae, 3–5 lin. longæ. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longi. Perianthium 9–10 lin. longum, supra ovarium vix constrictum, exsiccatum $1\frac{1}{2}$ –2 lin. latum, stylo et staminibus longioribus demum exsertis. Loculi 10–12-ovulati. *Cap. B. Spei*; *Natal*, Sanderson, 416!
7. K. ISOETIFOLIA, *A. Rich. Fl. Abyss.* ii. 324; *Schwein. Beit.* 294.—*Rudolphoræmeria isoetifolia*, *Steud. in Schimp. Pl. Abyss.* no. 721. Folia 6–8, magis herbacea quam in speciebus reliquis, 6–9 poll. longa, deorsum 2 lin. lata, dorso et margine scabra, venis utrinque costæ 3–4. Scapus foliis distincte excedens, 12–15 poll. longus. Racemus $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longus, expansus $2\frac{1}{2}$ –3 poll. latus. Bractæ lanceolatae, inferiores 5–6 lin. longæ, pedicellis multoties longiores. Perianthium 15–18 lin. longum, supra ovarium valde constrictum, exsiccatum 3–4 lin. latum, stylo et interdum staminibus longioribus demum exsertis. Loculi 6–8-ovulati. *Abyssinia*, Schimper, 511! 752!
8. K. QUARTINIANA, *A. Rich. Fl. Abyss.* ii. 324. Folia 12–18 poll. longa, deorsum 8–9 lin. lata, margine scabra, venis utrinque costæ

- 12-15. Scapus foliis excedens. Racemus 5-6 poll. longus, densiflorus, expansus 15-18 lin. latus. Bractæ ovato-lanceolatæ, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longæ, ad apicem acutum eite angustatæ. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ lin. longi. Perianthium 7-8 lin. longum, ore exsiccatum $2\frac{1}{2}$ lin. latum. Styli et stamina omnia demum exserta, longiora 1 poll. attingentia. *Abyssinia*, Quartin-Dillon et Petit!
9. K. GRANTII, Baker. Folia 7-8, 12-15 poll. longa, 5-6 lin. lata, ad apicem sensim angustata, margine lævia, venis utrinque costæ 10-15. Scapus foliis subæquans. Racemus densiflorus, 2- $2\frac{1}{2}$ poll. longus. Bractæ lineares, inferiores 4-6 lin. longæ. Pedicelli vix 1 lin. longi. Perianthium 9-10 lin. longum, supra ovarium valde constrictum, ore exsiccatum $2\frac{1}{2}$ -3 lin. latum, stylo exerto, staminibus inclusis. *Africa tropicalis*, lat. 6° S., long. 33° E., alt. 4400 pedes anglicanae, Speke et Grant!
10. K. PUMILA. Kunth, *Enum.* iv. 552 (*excl. syn. Red.*).—Aletris. Ait. *Kew.* i. 464.—Tritoma, *Bot. Mag.* t. 764.—Veltheimia, *Willd. Sp. Plant.* ii. 182. Folia 12-18 poll. longa, 6-8 lin. lata, venis utrinque costæ 10-12, glauca, margine scabra. Scapus foliis excedens. Racemus 3-5 poll. longus, densiflorus, expansus 16-18 lin. latus. Bractæ lineares, acuminatæ, 4-6 lin. longæ. Pedicelli vix 1 lin. longi. Perianthium 6-8 lin. longum, supra ovarium valde constrictum, ore exsiccatum $2\frac{1}{2}$ -3 lin. latum. Styli et stamina omnia demum exserta, longiora perianthio sesqui excedentia. Cap. B. Spei.
11. K. BURCHELLII, Kunth, *Enum.* iv. 552.—Tritoma, *Herbert, Lindl. Bot. Reg.* t. 1745.—K. laxiflora, Kunth, *loc. cit.* Folia 2-3 pedes longa, 6-9 lin. lata, viridia, margine et carina nunquam scabra, venis utrinque costæ 15-20. Scapus foliis subæquans. Racemus 3-4 poll. longus densiflorus, expansus $2\frac{1}{2}$ -3 poll. latus. Bractæ oblongo-lanceolatæ, acutæ vel obtusæ, 2-3 lin. longæ. Pedicelli $2-2\frac{1}{2}$ lin. longi. Perianthium 15-18 lin. longum, supra ovarium leviter constrictum, exsiccatum $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latum. Stylus demum exsertus. Stamina longiora vix exserta. Loculi 10-12-ovulati. Cap. B. Spei, Thunberg! Burchell! &c. Floret in Septembri in hortis nostris.
12. K. PRÆCOX, Baker in *Saund. Ref. Bot.* t. 168. Folia 2- $2\frac{1}{2}$ pedes longa, deorsum 1 poll. lata, margine scabra, carina lævia, pallide viridia, hand glauca, venis utrinque costæ 12-15. Scapus 15-18 poll. longus. Racemus 3-4 poll. longus, densissimus, 3 poll. latus. Bractæ lanceolatæ, acutæ, 4-6 lin. longæ. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longi. Perianthium 16-18 lin. longum, supra ovarium leviter constrictum, exsiccatum $2-2\frac{1}{2}$ lin. latum. Stamina longiora fauce attingentia. Stylus leviter exsertus. Cap. B. Spei, Cooper (*v. v. in Hort. Saunders*). Floret in Maio in hortis nostris.
13. K. ROOPERI, Lemaire, *Jard. Fleur.* t. 362.—Tritoma Rooperi,

Moore, Gard. Comp. i. 113, *cum icono*. Folia 2 pedes longa, deorsum 15–18 lin. lata, pallide viridia, margine scabra, venis utrinque costæ circiter 20, sursum sensim angustata. Scapus subpedalis. Racemus densus, 3–4 poll. longus, expansus 3 poll. latus. Bractæ lanceolatæ, 3–4 lin. longæ, pedicellis multoties excedentes. Perianthium 16–18 lin. longum, supra ovarium leviter constrictum, exsiccatum 2–2½ lin. latum, staminibus haud exsertis. *Kaffraria*, Capt. Rooper (*v. v. cult.*).

14. K. ALOIDES, *Mænch, Meth.* 631; *Kunth, Enum.* iv. 551; *Flore des Serres*, t. 1393.—K. Uvaria, *Hook. Bot. Mag.* t. 4816.—Aloe Uvaria, *Linn. Sp. Plant.* 460.—Aletris Uvaria, *Linn. Mant.* 308.—Tritoma Uvaria, *Gawl. Bot. Mag.* t. 758; *Red. Lil.* t. 291. Folia 2–3 pedes longa, 8–12 lin. lata, glauca, margine et carina scabra vel saepe omnino lævia, venis utrinque costæ 12–15. Scapus foliis paululum excedens. Racemus densissimus, in hortis saepe 5–6 poll. longus, 2½–3 poll. latus. Bractæ lanceolatæ, 3–4 lin. longæ, pedicellis 2–3-plo longiores. Perianthium 16–18 lin. longum, supra ovarium leviter constrictum, exsiccatum 2–2½ lin. latum. Styli et staminæ longiora demum exserta. Loculi 12–15-ovulati. *Cap. B. Spei*, Drège! Zeyher 113! &c. Floret in Septembri in hortis nostris.
- Var. β. MINOR, *Baker*.—Minor, foliis vix ultra 3 lin. latis, margine lævibus vel scabris, pedicellis brevioribus, perianthio graciliore pallide aurantiaco, 10–12 lin. longo, staminibus inclusis. *Zulu*, Gerrard et M'Ken 2141! (*bractæ ovatæ subobtusæ*), Mrs. Barber, 524! (*bractæ lanceolatæ*). Ab typo ad *K. sarmentosam* vergens.

4. BLANDFORDIA, *Smith*.

Smith, Exot. Bot. 54, t. 4; *R. Br. Prodr.* 295; *Endl. Gen.* No. 1104; *Kunth, Enum.* iv. 589; *Hook. fil. Fl. Tasm.* ii. 49; *Salisb. Gen.* 80.

Perianthium rectum, infundibuliforme, marcescens, segmentis æqualibus oblongo-deltoides tubo 5–6-plo brevioribus. *Stamina* 6, ad vel supra medium tubi inserta; *filamentis* filiformibus æqualibus haud exsertis, antheris linearí-oblongis versatilibus. *Ovarium* longe stipitatum, cylindrico-trigonum, *ovulis* copiose biseriatis, in stylum brevem rectum sensim attenuatum; *stigma* trisulcatum. *Capsula* firma, longe stipitata, exserta, clavato-triquetra, septicide-trivalvis, seminibus parvis linearí-oblongis compressis copiose biseriatis; *testa* grisea, dense pubescens. *Herbæ radicibus crasse fibrosis*, *foliis numerosis duris persistentibus anguste linearibus venis exsculptis*, *floribus numerosis speciosis breviter racemosis*, *pedicellis apice haud articulatis*, *floriferis nutantibus fructiferis erectis*.

- Filamenta supra medium tubi inserta, 3 lin. longa. Bracteæ linearí-acuminatæ 1. *grandiflora*.
 Filamenta ad medium tubi inserta, 6–10 lin. longa. Bracteæ lanceolatae, pedicellis distincte breviores.
 Folia margine nullo modo serrulata 2. *Cunninghami*.
 Folia margine serrulato-scabra.
 Perianthium anguste infundibuliforme, 3–4-plo longius quam latum 3. *nobilis*.
 Perianthium late infundibuliforme, vix 2-plo longius quam latum.
 Pedicelli infimi floribus æquantes 4. *aurea*.
 Pedicelli infimi floribus multo breviores 5. *flammea*.

1. B. **GRANDIFLORA***, *R. Br. Prod.* 296; *Bot. Reg.* 924; *Kunth, Enum.* iv. 590; *Paxt. Fl. Gard.* vii. 219; *Hook. fil. Fl. Tasm.* ii. 249.—B. *grandiflora*, *marginata et Backhousii*, *Lindl. Bot. Reg.* 31, sub t. 18.—*Aletris punicea*, *Lab. Nov. Holl.* i. 85, t. 111. Folia 12–18 poll. longa, 3–4½ lin. lata, margine serrulato-scabra, venis utrinque costæ 6–8. Flores 10–30, pedicellis infimis floriferis 18–24 lin. longis. Bracteæ inferiores lineares, longe acuminatæ, 12–18 lin. longæ. Perianthium flavo-coccineum, 16–21 lin. longum, ore exsiccatum 5–6 lin. latum, segmentis tubo sensim ampliato 5–6-plo brevioribus. Filamenta supra medium tubi inserta, 3 lin. longa. *Tasmania*, Gunn, 241! Archer, &c.
 Var. **B. INTERMEDIA**, Baker.—B. *intermedia*, *Herbert, Bot. Reg.* 31, *Suppl.* 64. Folia angustiora (2 lin. lata); bracteæ breviores; flores minores (12–18 lin. longæ); filamenta ad medium tubi inserta. *Tasmania*, Gunn! Verisimiliter species vera, inter *grandifloram* et *nobilem* medium tenens.
2. B. **CUNNINGHAMI**, *Lindl. Bot. Reg.* 31, sub t. 18; *Hook. Bot. Mag.* t. 5734. Folia 18–24 lin. longa, 3–4 lin. lata, margine haud serrulata, venis utrinque costæ 5–6. Flores 10–15, pedicellis infimis floriferis 9–12 lin. longis. Bracteæ lanceolatae, infimæ 6–9 lin. longæ. Perianthium flavo-coccineum, 21–24 lin. longum, ore exsiccatum 1 poll. latum, segmentis tubo spatulatim ampliato 5–6-plo brevioribus. Filamenta ad medium tubi inserta, 9–10 lin. longa. *Cambria Nova Australis (Blue Mountains)*, A. Cunningham!
3. B. **NOBILIS**, *Smith, Exot. Bot.* 5, t. 4; *R. Br. Prod.* 296; *Bot. Mag.* t. 2003; *Bot. Reg.* t. 286; *Reich. Exot.* t. 91; *Kunth, Enum.* iv. 590; *Lindl. Bot. Reg.* 31, sub t. 18. Folia 12–18 poll. longa, saturate viridia, durissima, triquetra, $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ lin. lata, margine leviter

* Nomen nunc decipiens; flores sunt minores quam in 2, 4, 5.

serrulato-scabra, venis utrinque costæ 2–3. Flores 4–9, pedicellis infimis floriferis 9–15 lin. longis. Bracteæ lanceolatæ, inferiores 3–6 lin. longæ. Perianthium flavo-coccineum, 12–18 lin. longum, ore exsiccatum 4–5 lin. latum, segmentis tubo spathulatum ampliato 5–6-plo brevioribus. Filamenta ad medium tubi inserta, 6–8 lin. longa. *Cambria Nova Australis*, Sieber, 195! Backhouse! &c.

4. B. AUREA, *Hook. fil. Bot. Mag.* t. 5809. Folia 8–12 poll. longa, 1½–2 lin. lata, margine serrulato-scabra, venis utrinque costæ 3–4. Flores 3–6, pedicellis infimis 18–24 lin. longis. Bracteæ lanceolatæ, pedicellis multo breviores. Perianthium aureum, 18 lin. longum, ore exsiccatum 15 lin. latum, segmentis valde imbricatis tubo obconico 3–4-plo brevioribus. Filamenta ad medium tubi inserta, 8–9 lin. longa. *Australia (N. S. Wales)*, (v. v. in *Hort. Veitch*).
5. B. FLAMMEA, *Lindl. Paxt. Mag.* xvi. t. 354; *Hook. fil. Bot. Mag.* t. 4819; *Journ. Hort.* ii. t. 1; *Flore des Serres*, vi. t. 585. Folia 12–18 poll. longa, 2–2½ lin. lata, margine serrulato-scabra, venis utrinque costæ 4–6. Flores 4–12, pedicellis infimis floriferis 9–15 lin. longis. Bracteæ lanceolatæ, acuminate, 3–4 lin. longæ. Perianthium flavum plus minus coccineo suffusum, 18–21 lin. longum, ore exsiccatum 1 poll. latum, segmentis valde imbricatis tubo spathulatum ampliato quadruplo brevioribus. Filamenta ad medium tubi inserta, 8–9 lin. longa. *Australia orientalis* (*lat. 25°–39° S.*), Backhouse! Lady Parry! C. Moore! &c.

5. FUNKIA, *Spreng.*

Spreng. Syst. ii. 41; *Endl. Gen.* No. 1100; *Kunth, Enum.* iv. 590.—*Hosta*, *Tratt. Obs.* ii. 56; *Aschers. Bot. Zeit.* 1863, 52, non *Jacq.*—*Niobe* et *Bryocles*, *Salisb. Hort. Trans.* i. 335, *Gen.* 81, 82.—*Libertia*, *Dumort. Com.* 9, non *Spreng.*—*Hemerocallis* sp., *Thunb.*, &c.

Perianthium infundibuliforme, segmentis oblongo-spathulatis erectis tubo cylindrico subæquantibus. *Stamina* 6, hypogyna, filamentis filiformibus subæqualibus leviter incurvatis perianthio subæquantibus, antheris linearis-oblängis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongum, ovlis copiose biseriatis; *stylus* filiformis, leviter exsertus, extorsum incurvatus; *stigma* capitatum. *Capsula* coriacea, linearis-oblänga, trigona, loculicide trivalvis, seminibus complanatis, testa nigra nitida. *Herbæ radicibus* crasse fibrosis, *foliis* latis *textura* herbaceis, distincte nervatis, *floribus* magnis albis vel cœruleis in racemis laxis subsecundis dispositis, *pedunculis* elongatis sparse foliatis.

§ NIOBE (Salisb.). *Bracteæ geminatæ; tubus centro 2 lin. crassus, sursum sensim ampliatus.*

Species sola 1. *subcordata.*

§ BRYOCLES (Salisb.). *Bracteæ solitariæ; tubus centro vix 1 lin. crassus, sursumcite ampliatus.*

Folia glauca, magna, venis utrinque costæ 12–13. 2. *Sieboldiana.*
Folia viridia, basi plerunque late rotundata vel subcordata, venis
utrinque costæ 5–6 3. *ovata.*

Folia viridia, lanceolata, basi angustata, venis utrinque costæ
3–4 4. *lancifolia.*

1. F. SUBCORDATA, *Spreng. Syst.* ii. 41; *Kunth*, iv. 591; *Miquel*,
Ann. Mus. Bat. iii. 153; *Baker*, *Gard. Chron.* 1868, 1015.—*Hemerocallis japonica*, *Thunb. Linn. Trans.* ii. 335; *Red. Lil. t. 3; Bot. Mag. t. 1433*.—*H. alba*, *Andr. Bot. Rep.* t. 194.—*H. plantaginca*, *Lam.*—*H. cordata*, *Cav.*—*F. grandiflora*, *Sieb. Fl. des Serres*, t. 158, 159 (*forma hortensis elatior*).—*Hosta japonica*, *Tratt. t. 52*. Folia pallide viridia, cordato-ovata, 6–9 poll. longa, 3–5 poll. lata, petiolis 6–8 poll. longis, venis utrinque costæ 6–8 deorsum 6–7 lin. inter sese distantibus. Scapus 1½–2-pedalis. Racemus 9–15-florus. Bracteæ lanceolatæ, geminate, erecto-patentes, majores 1–2 poll. longæ. Pedicelli inferiores patentes 6–12 lin. longi. Perianthium album, 4–4½ poll. longum, tubo sursum sensim ampliato, segmentis 6–9 lin. latis. Capsula 2 poll. longa. 4 lin. crassa, utrinque sensim angustata. *Japonia*, *Thunberg* 1 &c.; *China borealis*, Sir G. Staunton!

2. F. SIEBOLDIANA, *Hook. Bot. Mag. t. 3663 (mala); Kunth, Enum.* iv. 592; *Miquel, Ann. Mus. Lug. Bat.* iii. 153; *Baker, Gard. Chron.* 1868, 1015.—*Hemerocallis Loddinge*, *Bot. Cab.* t. 1869.—*F. Sieboldii*, *Lindl. Bot. Reg.* 1839, t. 50 (*bona*). Folia utrinque glauca, late cordato-ovata, majora 10–12 poll. longa, 7–8 poll. lata, petiolis 8–12 poll. longis, venis utrinque costæ 12–13, deorsum inter sese 5–6 lin. distantibus. Racemus 10–15-florus cum scapo vix folia cum petiolo superans. Bracteæ solitariae, inferiores 1½–3 poll. longæ, demum subpatentes. Pedicelli 5–6 lin. longi, inferiores cernui. Perianthium pallide lilacinum, 2–2½ poll. longum, tubo pergracili sursum citè ampliato, segmentis 3–4 lin. latis. Capsulae pendulæ, 15–18 lin. longæ. *Japonia*.

3. F. OVATA, *Spreng. Syst.* ii. 240; *Baker, Gard. Chron.* 1868, 1015.—*F. ovata a*, *Kunth, Enum.* iv. 591; *Miquel, Ann. Mus. Lug. Bat.* iii. 153.—*Hemerocallis cærulea*, *Andrews, Bot. Rep.* t. 6; *Bot. Mag. t. 894*; *Vent. Hort. Malm.* t. 18; *Red. Lil. t. 106*.—*Hosta cærulea*, *Tratt. Tab.* t. 189; *Thes.* t. 51. Folia viridia, late, sæpe subcordato-

ovata, majora 5–9 poll. longa, 3–5 poll. lata, petiolis 4–12 poll. longis, venis utrinque costæ 6–8, deorsum 4–6 lin. inter sese distantibus. Scapus 1–1½-pedalis. Racemus laxus, 10–15-florus, cum scapum foliis cum petiolo longe superans. Bractæ solitariæ, infimæ raro ultra 1 poll. longæ. Pedicelli 3–4 lin. longi, inferiores cernui. Perianthium pallide vel sœpe saturate lilacino-caeruleum, 1½–2 poll. longum, tubo pergracili sursum cite ampliato, segmentis 4–6 lin. latis. Capsulæ pendulæ, 12–18 lin. longæ. *Japonia*; *China borealis*; *Siberia orientalis*.

Var. β . *INTERMEDIA*, Baker. Äqualiter magna ac α , sed foliis duplo longioribus quam latis ovatis basi sensim subspathulatim angustatis, venis utrinque costæ 6, deorsum 3–4 lin. inter sese distantibus. *Japonia*, Wilford! Hodgson!—F. marginata, Siebold, est forma hujus varietatis foliis margine albo-cinctis.

Var. γ . *MINOR*, Baker. Multo minor, foliis ovatis 2½–3 poll. longis basi late rotundatis venis utrinque costæ 5–6 deorsum 2–2½ lin. inter sese distantibus, scapo foliis 5–6-plo longiore. *Insulae Koreanæ*, Oldham, 865!

4. F. *LANCEOLATA*, Spreng. *Syst.* ii. 41; Baker, *Gard. Chron.* 1868, 1015.—*Hemerocallis*, Thunb. *Linn. Trans.* ii. 335.—F. ovata β , Kunth, *Enum.* iv. 592; Miquel, *Ann. Mus. Lug. Bat.* iii. 153. Folia viridia, lanceolata, majora 4–5 poll. longa, 1½–2 poll. lata, petiolis 6–9 poll. longis, venis utrinque costæ 4–5, deorsum 3 lin. inter sese distantibus. Scapus subpedali. Racemus laxus, 6–10-florus. Bractæ solitariæ. Pedicelli 2–3 poll. longi, inferiores cernui. Perianthium pallide lilacinum, 1–1½ poll. longum, tubo pergracili apice cite ampliato. Capsulæ pendulæ. *Japonia*.—F. albo-marginata (Hook. *Bot. Mag.* t. 3663; Kunth, *Enum.* iv. 592) est forma magna hortensis hujus speciei foliis paullulum albo-cinctis. F. undulata (Otto et Dietr. *Gartenzeit.* 1833, p. 120, Kunth, *loc. cit.*) est forma altera hortensis foliis undulatis valde albo-variegatis petiolis reductis undulato-alatis.

6. AGAPANTHUS, L'Herit.

L'Herit. Sert. Angl. t. 18; *Endl. Gen.* 1102: *Kunth, Enum.* iv. 478; *Salisb. Gen.* 82: *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 398.—Abumon, *Adans. Fam.* ii. 54.—Crini sp., *Linn.*—Mauhliae sp., Thunb.

Perianthium infundibuliforme, tubo cylindrico sursum ampliato, segmentis oblongo-spathulatis æquilongis tubo subduplo longioribus, inferioribus demum laxis. *Stamina* 6, ad tubi faucem inserta, filamentis filiformibus subæqualibus segmentis paulo brevioribus extrorsum leviter declinatis, antheris linearis ob-

longis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, ovulis copiosis; *stylus* filiformis, filamentis subæquans et cum eis incurvatus; *stigma* trisulcatum. *Capsula* subsessilis, clavato-triquetra, septicide trivalvis, seminibus in loculis copiosis, discoides, uniseriatis, superne anguste alatis. *Testa* nigra, nitida. *Herbæ radicibus carnoso-fibrosis, foliis anguste loratis numerosis carnoso-herbaceis, floribus speciosis numerosis umbellatis, pedicellis apice articulatis.*

1. A. UMBELLATUS, L'Hérit. *Sert. Angl.* 18; *Ait. Kew.* i. 414; *Bot. Mag.* t. 500; *Redouté, Lil.* t. 4; *Kunth, Enum.* iv. 479.—*Crinum africanum*, *Linn.*—*Mauhlia linearis*, *Thunb.* Folia 6–8, 8–12 poll. longa, 6–8 lin. lata. Scapi foliis duplo longiores vel ultra. Umbellæ 12–30-floræ, pedicellis 9–15 lin. longis. Perianthium saturate cœruleum, 15–21 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis 3–3½ lin. latis, 2–3-plo longioribus. *Cap. B. Spei*, Masson! Sieber, 238! Zeyher, 4267! &c. In hortis sæpissime culta, foliis 10–20 sesqui-vel bipedalibus 18–24 lin. latis, scapo 2–3-pedali (var. *maximus*, *Bot. Reg.* xxix. t. 7.—A. multiflorus, *Willd. Enum.* 353; *Kunth, Enum.* iv. 480).
2. A. PRÆCOX, *Willd. Enum.* 353; *Kunth, Enum.* iv. 480.—A. umbellatus, var. *minimus*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 699. Folia 6–8, pedalia, in planta sylvestri 5–6 lin. lata. Scapus bipedalis vel ultra. Umbellæ 30–40-floræ, pedicellis elongatis (2–2½ poll. longis). Perianthium pallide cœruleum, 12–14 lin. longum, tubo et segmentis angustioribus quam in præcedente. *Natal* (ad altit. 0–1000 pedum angl.), Dr. Sutherland! *Kaffraria*, Bowker! In hortis folia 12–20, 12–14 lin. lata; perianthium 2 poll. longum segmentis 4–4½ lin. latis, et floratio paullulum præcocior (ad finem Junii) quam in aliis.
3. A. MINOR, *Lodd. Bot. Cab.* t. 42 (*pessima*).—A. umbellatus, var. *minor*, *Redouté, Lil.* 403; *Kunth, Enum.* iv. 479. Folia 6–8, 4–6 poll. longa, 3–4 lin. lata. Scapi 12–18 poll. longi. Umbellæ 12–30-floræ, pedicellis 3–9 lin. longis. Perianthium pallide cœruleum. 6–9 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis tubo 3–4-plo longioribus. *Cap. B. Spei*, Masson, Milne! Dr. Hooker! Burchell, 7138! &c. In hortis folia 10–12, pedalia, ½ lin. lata, perianthium 15–18 lin. longum, segmentis 3–4 lin. latis. Species 2. et 3. vix ultra varietates.

7. TULBAGHIA, *Linn.*

Linn. Gen. 1300; *Endl. Gen.* 1159; *Kunth, Enum.* iv. 480; *Salisb. Gen.* 87; *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 398.—Omentaria, *Salisb. Gen.* 87.

Perianthium infundibuliforme vel rotatum, tubo urceolato vel

cylindrico, segmentis biseriatis subæqualibus lanceolatis vel linearibus erecto-patentibus, vel patentibus tubo subæqualibus vel brevioribus. *Antheræ* biseriatæ, subsessiles, oblongæ, in tubo vel corona insertæ. *Staminodia* faucem tubi coronantia, 3, discreta, integra vel emarginata, vel in coronam concreta. *Ovarium* sessile, oblongum, ovulis in loculis paucis (sæpe 5–8); *stylus* brevis, rectus; *stigma* capitatum, trisulcatum. *Capsula* sessilis, membranacea, obovoidea, loculicide trivalvis, seminibus in loculis paucis (2–6) ob lanceolatis, parvis, exalatis, vix compressis. *Testa nigra*. *Herbae radicibus crasse fibrosis, foliis numerosis anguste ligulatis, floribus parvis umbellatis, odore forti alliaceo*.

§ EUTULBAGHIA. *Stamina carnosa, in coronam concreta, raro sub-libera.*

Staminodia profunde emarginata, libera vel basi solum connata.

1. *capensis.*

Staminodia in coronam integrum vel crenatam concreta.

Corona 1–1½ lin. alta.

Folia carnoso-herbacea, 2–3 lin. lata vel ultra.

2. *alliacea.*

Folia firma, filiformia, ½–1 lin. lata 3. *acutiloba.*

Corona ½ lin. alta.

Segmenta obtusa, coronam vix excedentia. 4. *Dregeana.*

Segmenta linearia, corona 4–6-plo longiora. 5. *hypoxidea.*

§ OMENTARIA^{*} (Salisb.). *Staminodia parva, ligulata, inter sese omnino libera.*

Folia ½–1 lin. lata. Perianthium 5–6 lin. longum.

6. *cepacea.*

Folia 2–3 lin. lata. Perianthium 8–9 lin. longum.

7. *violacea.*

1. T. CAPENSIS. Jacq. Hort. Vind. ii. t. 115! Linn. Mant. 223.—

T. alliacea, Bot. Mag. t. 806; Kunth, Enum. iv. 481. Folia 10–12, carnoso-herbacea, pedalia vel ultra, 4–6 lin. lata. Scapi 1½–2 pedes alti. Valvae spathæ lanceolatae, 6–9 lin. longæ. Umbellæ 6–8-floræ, pedicellis 9–12 lin. longis. Perianthium viridi-purpureum, segmentis lanceolatis basi 1 lin. latis, tubo 1½ lin. crasso duplo brevioribus. Staminodia obscure purpurea, segmentis subæqualia, profunde emarginata, basi concreta vel interdum inter se libera. Cap. B. Spei, Drège! &c. (v. s. cult. in herb. Linn. & Banks. a Jaquinio missum).

Var. β. GRACILIS, Baker. Minor, foliis 3–4 poll. longis, 2–3 lin. latis,

scapo subpedali, tubo graciliore, segmentis limbi linearibus, tubo duplo brevioribus. *Cap. B. Spei*, Zeyher, 4268!

2. T. **ALLIACEA**, *Thunb. Prodr.* 60; *Fl. Cap.* 306; *Linn. Suppl.* 193, *non Kunth*.—T. brachystemma, *Kunth, Enum.* iv. 483. Folia 5–6, carnosæ-herbacea, 6–9 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapi 9–18 poll. longi. Valvæ spathæ late lanceolatæ, 6–9 lin. longæ. Umbellæ 4–12-floræ, pedicellis flexuosis 6–15 lin. longis. Perianthium viridi-purpureum, 5–6 lin. longum, segmentis viridibus oblongis obtusis 1 lin. latis 1½–2 lin. longis, tubo 1½–2 lin. crasso. Corona carnosæ, integra vel crenata, obscure rubra, 1–1½ lin. longa. Stamina ad basin coronæ biseriata. *Cap. B. Spei*, Drège! Macowan, 913! Bowker, 249! &c.; *Natal*, Fannin, 43! *Namaqua-land*, Rev. H. Whitehead! (*segmenta breviora*).
Var. β . **AFFINIS**, Baker.—T. affinis, *Link, Enum.* i. 310; *Kunth, Enum.* iv. 480. Robustior, foliis pedalibus vel ultra, 3–6 lin. latis, perianthio 5–6 lin. longo, segmentis tubo duplo brevioribus, angustioribus, acutioribus. *Kaffraria Britannica*, Mrs. Hutton! *Natal*, Sanderson, 429!
Var. γ . **LUDWIGIANA**, Baker.—T. Ludwigiana, *Harv. Bot. Mag.* t. 3547; *Kunth, Enum.* iv. 482. Folia lorata 6–8 poll. longa, 8–9 lin. lata. Scapi 1½–2 pedales. Perianthium et coronæ typi. *Kaffraria Britannica*, Mrs. Hutton!
3. T. **ACUTILOBA**, *Harv. Thes. Cap.* t. 180. Folia 4–6, 2–3 poll. longa, firma, ½–1 lin. lata. Scapi graciles, 6–12 poll. longi. Umbellæ 4–6-floræ, pedicellis 4–8 lin. longis. Valvæ spathæ lineares, 5–6 lin. longæ. Perianthium 4–5 lin. longum, viridi-purpureum, segmentis linearibus acutis 1½–2 lin. longis, patentibus vel subreflexis tubo cylindrico ¾–1 lin. crasso sesquibrevioribus vel subæquantibus. Corona atro-purpurea, 1–1½ lin. longa, crenata. Stamina ad faucem tubi, biseriata. *Cap. B. Spei*, Zeyher, 262! Pappe! Harvey! Cooper, 463! &c.
Var. β . **CURTA**, Baker. Segmenta haud ultra 1 lin. longa, tubo triplo breviora. *Cap. B. Spei*, Drège, 2658, *ex parte*! 1516!
Var. γ . **MAJOR**, Baker (*Harv. t. 180 quoad flores*). Elatior, pedalis vel sesquipedalis, foliis 6–9 poll. longis, 1½–2 lin. latis, perianthio 5–6 lin. longo, tubo 1½ lin. crasso, segmentis linearibus 1½–2 lin. longis. *Cap. B. Spei*, Zeyher, Burchell, 1829, 4465! *Natal*, Sanderson, 271! Fannin, 60! Inter typum et *T. alliaceam* medium tenens.
4. T. **DREGEANA**, *Kunth, Enum.* iv. 483. Folia 4–5, 4–6 poll. longa, 1 lin. lata. Scapi 6–12 poll. longi. Valvæ spathæ lanceolatae, 3–4 lin. longæ. Umbellæ 4–8-floræ, pedicellis 4–8 lin. longis. Perianthium 3–4 lin. longum, viridi-purpureum, tubo cylindrico ½ lin. crasso, segmentis oblongo-deltoides obtusis ½ lin. longis. Corona crenata,

lacinis vix brevior. Stamina ad faucem tubi biseriata. *Cap. B. Spei*, Drège, 2658, *ex parte*! Zeyher, 645!

5. T. HYPOXIDEA, *Smith in Rees's Cylop.*; *Kunth, Enum.* iv. 482. Folia subpedalia, 2-3 lin. lata. Scapi foliis subæquantes. Umbellæ 6-8-floræ, pedicellis 8-12 lin. longis. Perianthium 6 lin. longum, segmentis linearibus acuminatis tubo subæquantibus. Corona sub-integra, segmentis 4-6-plo brevior. *Cap. B. Spei* (*v. s. cult. in herb. Smithii*).
 6. T. CEPACEA, *Thunb. Prodr.* 60; *Linn. Suppl.* 194; *Willd. Sp.* ii. 34; *Kunth, Enum.* iv. 484 (*excl. 3*).—Omentaria cepacea, *Salisb. Gen.* 87. Folia 4-5, 4-6 poll. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. Scapi 6-12 poll. longi. Valvæ spathæ lanceolatae, 4-6 lin. longæ. Umbellæ 6-12-floræ, pedicellis 3-6 lin. longis. Perianthium purpureum, 5-6 lin. longum, segmentis lanceolatis vel oblongis acutis vel subobtusis tubo cylindrico $\frac{1}{2}$ lin. crasso duplo brevioribus. Staminodia 3, 1 lin. longa, ligulato-lanceolata, integra vel emarginata. Stamina ad medium et faucem tubi inserta. *Cap. B. Spei*, Thunberg! Masson! Drège! Burchell, 4741! Ecklon et Zeyher! &c.
 7. T. VIOLACEA, *Harv. in Hook. Bot. Mag.* t. 3555; *Kunth, Enum.* iv. 485. Folia 6-10, carnosò-herbacea, viridia, 8-12 poll. longa, 2-3 lin. lata. Scapi 1-2 pedes longi. Valvæ spathæ lanceolatae, 6-9 lin. longæ. Umbellæ 8-20-floræ, pedicellis 3-18 lin. longis. Perianthium saturate purpureo-violaceum, 8-9 lin. longum, segmentis lanceolatis tubo cylindrico 1 lin. crasso duplo brevioribus. Staminodia ligulata, 1-1½ lin. longa, emarginata. Stamina ad faucem et medium tubi inserta. *Cap. B. Spei*, Harvey! Macowan, 914! Bowker! Bunbury! &c. *Kaffraria Britannica*, Cooper, 544! *ad ripas fluv. Orange*, Burke!
- Var. β . MINOR, Baker. Multo minor, scapi 3-4 poll. longi; umbellæ 5-6-floræ, pedicellis 2-3 lin. longis: perianthium 5-6 lin. longum, segmentis lanceolatis acutis. *Kaffraria, ad montes*, Mrs. Barber, 41!
- Var. γ . OBTUSA, Baker.—T. cepacea, var. robustior, *Kunth, Enum.* iv. 484. Statura et folia plantæ typicæ; perianthium 7-8 lin. longum, tubo crassiore, segmentis oblongis obtusis, staminodiis longioribus. *Cap. B. Spei*, Drège!

8. ANDROSTEPHIUM, Torrey.

Torrey, Bot. Mex. Bound. 218.—Millæ sp. *Scheele, Linnæa*, xxv. 260; *Walp. Ann.* vi. 219.

Perianthium infundibuliforme, segmentis lanceolato-spathulatis flore expanso subpatentibus tubo infundibuliformi æquantibus. *Stamina* 6, *filamentis* in coronam ad faucem tubi insertam segmentis breviorem prorsus concretis, *antheris* linear-ioblongis

versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, loculis 12-14-ovulatis; *stylus* rectus filiformis; *stigma* capitatum, trisulcatum. *Capsula* membranacea, sessilis, obovoidea, triquetra, loculicide trivalvis, seminibus in loculis pluribus, subcompressis; *testa nigra*, nitida. *Herba bulbosa habitu omnino* Millæ.

1. A. **VIOLACEUM**, Torrey, loc. cit.—Milla cærulea, Scheele, *Linnæa*, loc. cit. Bulbus globosus, tunicatus, 8-9 lin. crassus, membranis externis seorsum productis. Folia 4-6, synanthia, 6-8 poll. longa, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapi 2-4 poll. longi. Valvæ spathæ 3-4, lanceolatæ, membranaceæ. Umbellæ 3-4-floræ, pedicellis 6-12 lin. longis. Perianthium violaceum, 10-12 lin. longum. Corona 3 lin. longa. Stylus 5-6 lin. longus, ultra coronam haud exsertus. Segmenta limbi 2-2½ lin. lata. Texas, Lindheimer 544! C. Wright, &c.

9. BESSERA, Schult. fil.

Schult. fil. Linnæa, iv. 121; *Syst.* vii. 58 et 996; *Endl. Gen.* 1112; *Kunth, Enum.* iv. 477 et 699; *Benth. Pl. Hartw.* 26.—*Pharium*, *Herbert, Bot. Reg.* t. 1546.

Perianthium late infundibuliforme, segmentis oblongo-lanceolatis erecto-patentibus tubo campanulato 4-6-plo longioribus. *Stamina* 6, *filamentis* exsertis extrorsum leviter incurvatis pro dimidio superiore filiformibus liberis, pro dimidio inferiore in coronam ad faucem tubi insertam concretis, *antheris* linearis-oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-trigonum, loculis 15-25-ovulatis; *stylus* filiformis, staminibus æquans et cum eis paullulum incurvatus; *stigma* capitatum, trisulcatum. *Capsula* sessilis, membranacea, oblonga, obtuse trigona, septicide trivalvis, seminibus in loculis pluribus complanatis. *Testa nigra*, membranacea. *Herba bulbosa foliis paucis carnoso-herbaceis subteretibus post scapum maturis, floribus speciosis umbellatis pedicellis apice haud articulatis.*

1. B. **ELEGANS**, Schult. fil. loc. cit.; *Lindl. Bot. Reg.* 1839, t. 34; *Kunth, loc. cit.*—*Pharium fistulosum*, *Herbert, Bot. Reg.* t. 1546. Bulbus globosus, 1 poll. crassus, tunicatus, membranis externis seorsum circa basin scapi et foliorum productis. Folia 2-3, demum 10-12 poll. vel ultra longa. Scapus 1-2-pedalis, fistulosus, fragilis. Valvæ spathæ 3-4, membranaceæ, lanceolatæ, 3-4 lin. longæ. Umbellæ 4-10-floræ, pedicellis gracilibus 12-18 lin. longis. Perianthium 9-10 lin. longum, saturate rubrum, segmentis viridi carinatis 3-4 lin. latis. Corona 4 lin. longa, glabra vel scabra, filamentis deorsum an-

guste alatis. Stylus demum 9–10 lin. longus. *Mexico*, Hartweg, 232! Bates! Karwinsky! &c.—*P. fistulosum*, *Herbert*, loc. cit., est forma filamentis scabris, corona inter basin filamentorum margine dentata.—*B. multiflora*, *Mart. et Gal. Enum.* 14; *Kunth*, *Enum.* iv. 699, est verisimiliter forma robustior multiflora.

10. LEUCOCORYNE, *Lindl.*

Lindl. Bot. Reg. t. 1293; *Endl. Gen.* 1105; *Kunth*, *Enum.* iv. 472.—*Brodiææ* sp., *Hook. &c.*—*Anthoceras*, *Bertero*, *MSS.*

Perianthium infundibuliforme vel subrotatum, segmentis æquabilis lanceolatis vel linearibus tubo cylindrico subæquantibus vel brevioribus. *Stamina* 3, ad medium tubi inserta, *filamentis* brevissimis, *antheris* linear-i-oblongis dorsifixis. *Staminodia* 3, ad faucem tubi inserta, calcarata, erecta, segmentis æquantia vel breviora, rarissime antherifera. *Ovarium* subsessile, oblongum, obtuse trigonum, loculis multiovulatis; *stylus* brevis, rectus; *stigma* capitatum. *Capsula* subsessilis, membranacea, oblonga, obtuse trigona, loculicide trivalvis, seminibus in loculis pluribus (5–6) parvis triquetris. *Testa nigra*, membranacea. *Herbae bulbosæ foliis pluribus synanthiis anguste linearibus, floribus umbellatis, spathis bivalvatis, pedicellis haud articulatis.*

Staminodia segmentis lanceolato-spathulatis 3–4-plo breviora.

1. *ixioides*.

Staminodia segmentis linearibus acuminatis subæquantia.

Segmenta tubo paullulum longiora.

Perianthium 8–9 lin. longum 2. *alliacea*.

Perianthium 5–6 lin. longum 3. *angustipetala*.

Segmenta tubo duplo breviora 4. *Gayi*.

1. **L. IXIOIDES**, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1293; *Kunth*, *Enum.* iv. 473; *C. Gay*, *Fl. Chil.* vi. 121.—*Brodiææ ixioides*, *Hook. Bot. Mag.* t. 2382.

—*L. odorata*, *Lindl. Bot. Reg. t. 1293*; *Kunth et C. Gay*, loc. cit.—*Anthoceras odorata*, *Bertero*, *MSS.*—*L. narcissiflora*, *Phil. Flor. Atacam.* 52.

Bulbus 6–9 lin. crassus, brunneo-tunicatus, membranis externis basin scapi et foliorum arcte cingentibus. *Folia* plurima, viridia, carnosæ-herbacea, 8–12 poll. longa, 1 lin. lata, evanescentia. *Scapi* erecti, fragiles, fistulosi, 12–18 lin. longi. *Valva* spathæ linear-i-acuminatae, 12–15 lin. longæ. *Umbellæ* 3–12-floræ, pedicellis 9–18 lin. longis. *Perianthium* 9–15 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis lanceolato-spathulatis 2½–3-lin. latis. *Staminodia* segmentis 3–4-plo breviora. *Chili*, copiose prope urbem Valparaiso, &c. Cuming 557! Bertero 806! Menzies 290! Bridges 75! C. Gay! Philippi, &c. *Guilli* incolis dictum,

Andes Peruvianæ, Bollaert! *L. odorata* est mera forma pedicellis brevioribus.

Var. β . *PURPUREA*, Baker.—*L. purpurea*, C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 122; *Atlas*, t. 68. Elatior, perianthio 15–18 lin. longo tubo saturate pureo segmentis obtusioribus 3–4 lin. latis. *Chili*, C. Gay!

2. *L. ALLIACEA*, *Lindl. Bot. Reg. sub t. 1293*; *Hook. et Arn. Bot. Beech.* 48; *Kunth, Enum.* iv. 474; C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 123.—*Brodiaeæ alliacea*, Miers, *MSS.*—*Anthoceras ornithogalooides*, Bertero, *MSS.* Bulbus ovoideus, 9–12 lin. crassus, brunneo-truncatus, membranis externis basin scapi et foliorum arcte longe cingentibus. Folia plurima, firmiora, viridia, 6–8 poll. longa, vix 1 lin. lata. Scapi 6–12 poll. longi. Valvæ spathæ linear-i-acuminatæ, 1 poll. vel ultra longæ. Umbellæ 2–4-floræ, pedicellis 3–24 lin. longis. Perianthium 8–9 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis linearibus acutis tubo longioribus. Staminodia segmentis paullulum breviora (3–4 lin. longa). *Chili*, Bertero! Macrae! Philippi 654! Germain! &c.
3. *L. ANGUSTIPETALA*, C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 124. Bulbus 8–9 lin. crassus, brunneo-tunicatus, membranis externis seorsum productis. Folia plurima, firmiora, 3–4 poll. longa, vix 1 lin. lata. Scapi 3–4 poll. longi. Valvæ spathæ 8–9 lin. longæ. Umbellæ 3–4-floræ, pedicellis 3–6 lin. longis. Perianthium 5–6 lin. longum, pallide purpureum, segmentis linearibus acutis tubum paullulo excedentibus. Staminodia segmentis æquantia. *Chili*, Philippi!
4. *L. GAYI*, Baker.—*Tristagma dimorphopetala*, C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 126; *Atlas*, t. 69 bis. Bulbum non vidi, membranis externis longe circa basin scapum cingentibus. Folia 6–9 poll. longa, carnosæ-herbacea, 1½ lin. lata. Scapi fragiles, fistulosi, 8–12 poll. longi. Valvæ spathæ lanceolatæ, seorsum attenuatæ, 12–15 lin. longæ. Umbellæ 6–8-floræ, pedicellis 1–3 poll. longis. Perianthium 5–6 lin. longum, segmentis anguste linearibus tubo duplo brevioribus. Staminodia segmentis subæquantia. *Chili*, C. Gay! Petala diformia suspicata sunt staminodia generis.

11. BRODLEA, Smith.

Smith, Linn. Trans. x. 2, t. 1; *Endl. Gen.* 1106; *Hooker, Fl. Bor. Amer.* ii. 186; *Kunth, Enum.* iv. 470.—*Hookera*, *Salisb. Parad. Lond.* t. 98.—*Dichelostemma*, *Kunth, Enum.* iv. 469.—*Stropholirion*, *Torrey, Bot. Pac. Rail.* iv. 149.—*Brevoortia*, *Wood, Proc. Phil. Acad.* 1867, 173.

Perianthium infundibuliforme vel late tubulosum, segmentis plerisque tubo longioribus vel subæquantibus, raro brevioribus. *Antheræ* 3, lineares, ad faucem tubi sessiles vel subsessiles, ex-

alatæ vel alatæ. *Staminodia* 3, complanata, membranacea, cum staminibus uniseriata. *Ovarium* sessile vel stipitatum, loculis 4–6-ovulatis; *stylus* rectus, filiformis; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, oblongo-trigona, sessilis vel stipitata, loculicide trivalvis, seminibus in loculis 2–4 parvis triquetris. *Testa* nigra, membranacea. *Herbae bulbosæ floribus speciosis umbellatis spathis multivalvatis pedicellis apice articulatis, scapo in specie una longe volubili.*

§ EUBRODIEA. *Scapi erecti. Perianthium infundibuliforme, segmentis tubo æquantibus vel excedentibus. Antheræ exalatæ. Umbellæ laxæ, pedicellis elongatis. Ovarium stipitatum.*

1. *grandiflora.*

Umbellæ densæ, pedicellis brevibus vel subnullis. Ovarium sessile.

Staminodia quadrata, bifida 2. *congesta.*

Staminodia lanceolata, integra 3. *multiflora.*

§ STROPHOLIRION (Torrey). *Scapi longe volubiles. Perianthium infundibuliforme, segmentis tubo subæquantibus. Antheræ alatæ. Species sola* 4. *volubilis.*

§ BREEVOORTIA (Wood). *Scapi erecti. Perianthium late tubulosum, basi 6-saccatum, segmentis tubo quadruplo brevioribus. Antheræ exalatæ.*

Species sola 5. *coccinea.*

1. B. GRANDIFLORA, Smith, *Linn. Trans.* x. 2; *Lindl. Bot. Reg.* t. 1183; *Hook. Bot. Mag.* t. 2877; *Kunth, Enum.* iv. 471; *Wood, Proc. Acad. Phil.* 1867, 172, *non Nuttall nec Pursh.* — *Hookera coronaria, Salisb. Par.* t. 98. Bulbus globosus, 8–9 lin. crassus, brunneotunicatus, membranis externis seorsum productis. Folia 4–6, ante scapum matura, 6–12 poll. longa, 1½ lin. lata, subteretia, facie concava, saturate viridia, subglauca, evanescentia. Scapus erectus, fistulosus, fragilis, 6–18 poll. altus. Valvæ spathæ plurimæ, lineares, 4–6 lin. longæ. Umbellæ 2–8-floræ, pedicellis inæqualibus 3–18 lin. longis. Perianthium 9–15 lin. longum, violaceum, segmentis oblongo-lanceolatis tubum ore 1½–2 lin. crassum excedentibus. Antheræ 3 lin. longæ, filamentis filiformibus triplo brevioribus ad faucem tubi insertis. Staminodia ligulata, flavida, subintegra, antheris æquantia. Ovarium breviter stipitatum, stylo filiformi 3–4 lin. longo. Semina in loculo 3–4. *Insulae Vancouver et St. Juan, Lyall!* *Wood!* *Oregon et Columbia Britannica, Menzies!* *Gardner!* *Lyall!* *California, Douglas!* *Coulter 742!* *Hartweg 2002!*

- Var. β . **MACROPODA**, *Torrey*, *Bot. Whipple*, 93.—B. *Torreyi*, *Wood*, *Proc. Phil. Acad.* 1867, 172. Scapus brevissimus vel subnullus. Pedicelli elongati, 3–6 poll. longi. *California, in locis paludosis*, Bigelow! *Wood*.
- Var. γ . **MAJOR**, *Benth. MSS.*—B. *californica*, *Lindl. Trans. Hort. Soc.* iv. 84, *cum icono*. Elatior, robustior, perianthio 18–21 lin. longo, tubo ore 3–4 lin. crasso segmentis 12–15 lin. longis, pedicellis 6–24 lin. longis. *California*, Hartweg 1999! Fremont! Jeffray 1124!
2. B. **CONGESTA**, *Smith*, *Linn. Trans.* x. 3, t. 1; *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 186.—*Dichelostemma congestum*, *Kunth*, *Enum.* iv. 470; *Wood*, *Proc. Phil.* 1867, 173.—*Hookera pulchella*, *Salisb. Par.* t. 117? Bulbus globosus, brunneo-tunicatus, 8–9 lin. crassus. Folia 3–4, ante scapum matura, carnosso-herbacea, evanescens, pedalia vel ultra, 1½–2 lin. lata, subtereta, facie valde concava, glauca. Scapus fragilis, fistulosus, 1–2-pedalis. Valvae spathæ 3–4, lanceolatæ, 6–9 lin. longæ. Umbellæ 6–12-floræ, congestæ, pedicellis subnullis vel 1–3 lin. longis. Perianthium 8–9 lin. longum, saturate violaceo-cæruleum, segmentis oblongo-lanceolatis tubo 3 ore lin. crasso subæquantibus. Stamina 3, sessilia, 2½ lin. lata, apice profunde emarginata. Staminodia 3, cucullata, profunde emarginata. Ovarium sessile, stylo filiformi 2 lin. longo. Semina in loculo 5–6. *E Columbia Britannica ad Californiam borealem*, Menzies! Douglas! &c.
3. B. **MULTIFLORA**, *Benth. Pl. Hartweg*. 339.—B. *parviflora*, *Torrey et Gray* *Bot. Pac. Rail.* p. 125; *Wood*, *Proc. Phil. Acad.* 1867, 172. Bulbus fibroso-tunicatus, 1 poll. vel ultra crassus. Folia carnosso-herbacea, firmiora, 12–18 poll. longa, 1½–2 lin. lata. Scapus fragilis, 1–2 pedes longus. Valvae spathæ plurimæ, late lanceolatæ, 4–6 lin. longæ. Umbellæ congestæ, 6–20-floræ, pedicellis subnullis vel 3–6 lin. longis. Perianthium 8–10 lin. longum, cæruleum, segmentis oblongo-lanceolatis tubo ventricoso subæquantibus. Stamina sessilia 2 lin. longa. Staminodia lanceolata, integra, 1½ lin. longa. Ovarium sessile, stylo 2½ lin. longo. Semina in loculo 4–6. *California*, Hartweg 2001! Jeffray 1125! Lobb 237! Bridges 276! *Utah*, Fremont!
4. B. **VOLUBILIS**, *Baker*.—*Stropholirion californicum*, *Torrey*, *Bot. Pac. Rail.* iv. 149; *Bot. Whipple*, t. 23.—*Rupalleya volubilis*, *Morrièr*, *Bull. Soc. Linn. Norm.* viii. *cum icono ex Bull. Soc. Bot. France*, xi. *Bibl.* 25.—*Dichelostemma Californica*, *Wood*, *Proc. Phil.* 1867, 173. Folia synanthia, carnosso-herbacea, 12–18 poll. longa, 3–4 lin. lata. Scapi volubiles, 4–12-pedales. Valvae spathæ 4–5, lanceolatæ. Umbellæ 15–20-floræ, pedicellis 3–9 lin. longis. Perianthium roseo-purpureum, 5–6 lin. longum, segmentis oblongo-lanceolatis tubum ventricosum paullulo excedentibus. Staminodia ligulata, emarginata. Antheræ sessiles, emarginato-alatae, 1½ lin. longæ. Ovarium breviter

stipitatum, loculis 3-4-ovulatis, stylo filiformi $1\frac{1}{2}$ lin. longo. Semina in loculo saepe solitaria. *California*, Hartweg 1992! Bigelow! Bridges 277! &c.

5. B. COCCINEA, *A. Gray*, *Proc. Amer. Acad.* 1867, 389.—*Brevoortia Ida-Maia*, *Wood*, *Proc. Phil. Acad.* 1867, 173. Folia carnoso-herbacea, pedalia vel ultra, 2-3 lin. lata, ante scapum evanescentia, glauca. Scapi fragiles, erecti, 2-3 pedes longi. Valvae spathæ 4-6, membranaceæ, lanceolatae vel lineares, saturate rubræ, 6-12 lin. longæ. Umbellæ 4-12-floræ, pedicellis 8-12 lin. longis. Perianthium 12-16 lin. longum, tubulosum, basi 6-saccato, tubo 3-4 lin. crasso saturate coccineo, segmentis lanceolato-oblongis, flavidis, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longis flore expanso patentibus. Ovarium oblongum, distincte stipitatum, loculis 4-6-ovulatis; stylus filiformis, 8-9 lin. longus, interdum subexsertus. Antheræ lineares, basi emarginatæ, segmentis subæquantes, Staminodia flava, latissima, quadrata, dentata, antheris duplo breviora. *California*, W. Lobb! Bolander! v. v. ex hort. Thompson.

12. MILLA, Cav.

Cav. Icon. ii. 76, t. 196; *Endl. Gen.* 1109; *Kunth, Enum.* iv. 278.—*Triteleia*, *Dougl. in Lindl. Bot. Reg. sub* t. 1293; *Endl. Gen.* 1107; *Kunth, Enum.* iv. 465.—*Seubertia*, *Kunth, Enum.* iv. 475.—*Hesperoscordium*, *Lindl. Bot. Reg. sub* t. 1293; *Endl. Gen.* 1110; *Kunth, Enum.* iv. 464.—*Calliprora*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1590; *Endl. Gen.* 1111; *Kunth, Enum.* iv. 476.—*Themis*, *Salisb. Gen.* 85.

Perianthium late vel anguste infundibuliforme vel subrotatum, segmentis tubo infundibuliformi vel campanulato subæquantiibus, vel 2-4-plo longioribus, vel raro brevioribus. *Stamina* 6, semper distincte perigyna, uniseriata vel plus minus distincte biseriata, filamentis plerisque elongatis raro subnullis, antheris lineari-oblongis versatilibus. *Ovarium* obovoideum, sessile vel plus minus distincte stipitatum; *stylus* rectus, filiformis; *stigma* capitatum, trisulcatum. *Capsula* membranacea, sessilis vel stipitata, loculicide trivalvis, seminibus in loculis 2-12 parvis triquetris laxis vel biseriatis. *Testa* nitida, nigra. *Herbæ bulbosæ foliis angustis synanthiis floribus umbellatis.*

- § *BEBODIOPSIS*, Baker. *Tubus late infundibuliformis, segmenta superans. Stamina e basi et medio segmentorum biseriata.*
Species sola 1. *grandiflora*.

§ EUMILLA. *Tubus infundibuliformis, segmentis 1½-2-plo brevior. Stamina e fauce tubi uniseriata.*

Stamina sessilia vel subsessilia.

Flores 1-4 pedicellis elongatis. Stamina exalata.

2. *biflora.*

Flores 5-9 pedicellis subnullis vel perprevibus. Stamina alterna emarginato-alata 3. *capitata.*

Filamenta 2-3 lin. longa.

Ovarium sessile, loculis 6-8-ovulatis 4. *andicola.*

Ovarium stipitatum, loculis 10-12-ovulatis. 5. *macrostemon.*

§ TRITELEIA (Dougl.). *Tubus infundibuliformis, segmentis æquans vel 1½-2-plo brevior, vel raro excedens. Stamina distincte biseriata, in tubo inserta.*

Pedicelli apice inarticulati. Ovarium sessile (*Amer. merid.*).

Scapi uniflori.

Segmenta linearia tubo duplo breviora . . . 6. *sessiliflora.*

Segmenta tubo subæquantia. Perianthium pallide lilacinum.
Folia filiformia; segmenta linearia 7. *patagonica.*

Folia plana; segmenta lanceolata vel oblonga.

8. *uniflora.*

Segmenta tubum duplo superantia. Perianthium flavum.
9. *Sellowiana.*

Scapi bi- vel multiflori.

Segmenta linearia, tubo cylindrico duplo breviora.

10. *nivalis.*

Segmenta oblonga, tubo infundibuliformi subæquantia.

11. *Poppigiana.*

Pedicelli apice articulati. Umbellæ multifloræ. Ovarium longe stipitatum (*Amer. bor.*).

Filamenta elongata, basi utrinque alata (*Calliprora*, Lindl.).
12. *ixioides.*

Filamenta brevissima, exalata vel nulla (*Seubertia*, Kunth).

Perianthium cœruleum, 15-18 lin. longum. 13. *laxa.*

Perianthium cœruleum, 8-9 lin. longum . . . 14. *peduncularis.*

Perianthium flavum, 9 lin. longum 15. *crocea.*

§ HESPEROCORDIUM (Lindl.). *Tubus campanulatus, segmentis 3-4-plo brevior. Stamina in tubo plus minusve distincte biseriatim inserta.*

Pedicelli apice articulati. Ovarium longe stipitatum (*Amer. bor.*) 16. *hyacinthina.*

Pedicelli apice haud articulati. Ovarium sessile (*Amer. merid.*).

Scapi semper uniflori. Folia setacea.

Perianthium album scapo glabro 17. *setacea*.

Perianthium flavum scapo hirtello 18. *hirtella*.

Scapi 1-2-flori. Folia $\frac{1}{2}$ lin. lata 19. *subbiflora*.

Scapi 2-6-flori.

Perianthium album. Folia 1-2 lin. lata.

Pedicelli vix 1 lin. longi 20. *brevipes*.

Pedicelli 6-12 lin. longi.

Perianthium 6-7 lin. longum, segmentis oblongis.

21. *bivalvis*.

Perianthium 9-10 lin. longum, segmentis lanceolatis
acutis 22. *porrifolia*.

Perianthium flavum. Folia $\frac{1}{2}$ lin. lata .. 23. *aurea*.

1. M. **GRANDIFLORA**, Baker.—*Triteleia grandiflora*, *Lindl. Bot. Reg.*
sub t. 1293 & 1685; *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 186, *t.* 198 B; *Wood*,
Proc. Acad. Phil. 1867, 171. Bulbus globosus, 1 poll. crassus,
fibroso-tunicatus, edulis. Folia synanthia, carnosso-herbacea, pedalia
vel ultra, 3-4 lin. lata. Scapi 1 $\frac{1}{2}$ -2 pedes alti. Valvæ spathæ
plurimæ, lanceolatæ, 6-8 lin. longæ. Umbellæ 6-20-floræ, pedicellis
apice articulatis 6-18 lin. longis. Perianthium saturate cæruleum,
8-10 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis obtusis erectis tubo
late infundibuliformi ore 3-4 lin. crasso paullulum brevioribus. An-
theræ 1 lin. longæ biseriatae, inferiores ad faucem tubi sessiles, su-
periores ad medium segmentorum insertæ, filamentis filiformibus
brevibus. Ovarium distincte stipitatum, loculis 6-8-ovulatis, stylo
filiformi 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. longo. *Columbia Britannica*, *Oregon et Missouri*,
Douglas! Burke! Geyer, 289! Lyall! &c.

2. M. **BIFLORA**, Cav. *Ic.* ii. 76, *t.* 196; *Willd. Sp. Plant.* ii. 62;
Lindl. Bot. Reg. 78, *t.* 1555; *Kunth, Enum.* iv. 478; *Flore des*
Serres, *t.* 1459. Bulbus globosus, brunneo-tunicatus, 6-9 lin. crassus,
membranis externis seorsum productis. Folia 4-6, filiformia, 6-12
poll. longa. Scapus fragilis, 6-18 poll. longus. Flores 1-4, pedi-
cellis strictis 2-6 poll. longis apice incrassatis. Valvæ spathæ plu-
rimæ, lineares, 3-6 lin. longæ. Perianthium albido, 15-18 lin.
longum, segmentis oblongo-lanceolatis, carina viridi firmiore, tubo
infundibuliformi ore 1 $\frac{1}{2}$ lin. crasso subduplo longioribus, interioribus
angustioribus. Stamina ad faucem uniseriata, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, sub-
sessilia, exalata. Ovarium oblongum, stipite brevi obconico, stylo
filiformi 5-6 lin. longo. Semina in loculo 5-9. *Mexico*, Pavon!
Schaffner! Hartweg, 233! Galeotti, 5508! Graham, 359! Coulter,
1545! &c.; *Nova Mexico*, C. Wright, 1913!

3. **M. CAPITATA**, Baker.—*Brodiaea capitata*, Benth. *Pl. Hartw.* 339.—*Dichelostemma capitata*, Wood, *Proc. Acad. Phil.* 1868, 173. Bulbus edulis, proliferus, globosus, 6–9 lin. crassus, brunneo-tunicatus, membranis externis paullulum productis. Folia carnosæ-herbacea, pedalia vel ultra, glauca, 2 lin. lata, evanescentia. Scapi fragiles, 1–2 pedes alti. Valvæ spathæ plurimæ, lanceolatae, violacea, 5–6 lin. longæ. Umbellæ congestæ, 5–9-floræ, pedicellis subnullis vel 1–3 lin. longis. Perianthium 7–8 lin. longum, saturate lilacino-cæruleum, segmentis oblongo-lanceolatis erectis, tubum 2–2½ lin. crassum paullulo excedentibus. Stamina 1½ lin. longa ad faucem sessilia, alterna emarginato-alata. Ovarium basi angustatum, stylo 2 lin. longo. Semina in loculo 8–9. *California*, Hartweg, 2600! Bigelow! Jeffray, 1026! Douglas! Coulter, 743!

Var. β . **PAUCIFLORA**, Torrey, *Bot. Mex. Bound.* 218. Umbellæ 2–4-floræ, pedicellis spathæ valvis subduplo longioribus. *Novo-Mexico*, Bigelow; *Sonora*, Capt. E. K. Smith! *ad ripas fluv. Gila*, Parry.

Habitu *Brodiæam congestam et multifloram* arce simulat: differt inde staminum.

4. **M. ANDICOLA**, Baker.—*Nothoscordum andicola*, Kunth, *Enum.* iv. 463. Bulbus 1 poll. crassus, brunneo-tunicatus, membranis externis circa basin scapi et foliorum longe productis. Folia 5–6, carnosæ-herbacea, modice diurna, scapos superantia, $\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapi firmi, 3–6 poll. longi. Valvæ spathæ 2, oppositæ, lanceolatae, basi connatæ, 6–8 lin. longæ. Umbellæ 6–10-floræ, pedicellis 3–6 lin. longis apice haud articulatis. Perianthium 5–6 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis lanceolato-spathulatis erecto-patentibus tubo ore 1–1½ lin. crasso duplo longioribus. Stamina e fauce uniseriata, filamentis 2 lin. longis deorsum applanatis. Ovarium sessile, loculis 6–8-ovulatis, stylo 2 lin. longo. *Andes Peruviaæ et Boliviaæ ad ripas lacus Titicaca*, Meyen, Pentland!

5. **M. MACROSTEMON**, Baker.—*Nothoscordum macrostemon*, Kunth, *Enum.* iv. 463.—*Sowerbaea americana*, Spreng. MSS. Bulbum non vidi. Folia carnosæ-herbacea, subpedalia, 2–2½ lin. lata. Scapi 1½–2 pedes longi, basi interdum 3 lin. crassi. Valvæ spathæ 2–3, lanceolatae, 6–10 lin. longæ. Umbellæ 12–20-floræ, pedicellis 6–30 lin. longis. Perianthium 7–9 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis lanceolato-spathulatis flore expanso erecto-patentibus tubo infundibuliformi ore 1½ lin. crasso duplo longioribus. Stamina e fauce uniseriata, filamentis 2½–3 lin. longis, præcipue dimidio superiore applanatis, antheris oblongis vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. longis. Ovarium basi in stipitem brevem sensim angustatum, loculis 10–12-ovulatis, stylo 1 lin. longo. *Montevideo*, teste Kunth; *Brasilia meridionalis*; *St. Jago del Esterra*, Tweedie, 1393! 1394!

Var. β . **GRACILIS**, Baker. Gracilior, pedicellis 6–10 lin. longis, pe-

rianthio 6 lin. longo, tubo angustiore, ovario stipite gracili demum 1½ lin. longo. *Montevideo*, Capt. King ! Verisimiliter species vera sed bulbum et folia non vidi.

6. **M. SESSILIFLORA**, *Baker*.—*Triteleia sessilis*, *Philippi*, *MSS.* Bulbus ovoides, 3-4 lin. crassus, membranaceo-tunicatus, membranis externis longe productis. Folia 4-5, synanthia, carnosæ-herbacea, filiformia, florem superantia. Scapus 12-15 lin. longus. Valvæ spathæ 2, lineares, deorsum longe connatae. Flores solitarii, in spathis sessiles, albidi, 9-10 lin. longi, segmentis ascendentibus lanceolatis tubo pergracili 2-3-plo brevioribus. Stamina supra medium tubi biseriatim inserta, filamentis filiformibus antheras oblongas 3-4-plo excedentibus. Ovarium sessile, stylo 5-6 lin. longo. *Chili*, *Philippi* ! Germain !
7. **M. PATAGONICA**, *Baker*. Bulbum non vidi. Folia 4-5, synanthia, filiformia, modice firma, 6-9 poll. longa. Scapi uniflori, 4-6 poll. longi. Valvæ spathæ 2, lanceolatae, erectæ, 8-9 lin. longæ, basi connatae. Pedicelli 6-9 lin. longi. Perianthium 10-12 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis lanceolatis acuminatis erectis carina saturatiore tubo anguste infundibuliformi duplo longioribus. Stamina in tubo biseriata, filamentis filiformibus 3-4 lin. longis. Ovarium sessile, stylo 3 lin. longo. *Patagonia*, Capt. Middleton ! Habitu *M. uniflora*; differt foliis filiformibus, segmentis lanceolatis acuminatis.
8. **M. UNIFLORA**, *Graham*, *Edin. Phil. Journ. Dec. 1832*; *Hook. Bot. Mag.* t. 3327.—*Triteleia uniflora*, *Lindl. Bot. Reg.* 1293, t. 1921; *Kunth*, *Enum.* iv. 466; *Flore Jard.* iii. 177.—*Milla bonariensis*, *Gillies*, *MSS.* Bulbus ovoides, proliferus, membranaceo-tunicatus, 6-9 lin. crassus, fibris carnosis, membranis externis sursum longe productis. Folia 6-9, synanthia, carnosæ-herbacea, 6-12 poll. longa, 1½-3 lin. lata, glauca. Scapi uni- vel in hortis rarissime biflori. Valvæ spathæ 2, lanceolatae, 9-15 lin. longæ, deorsum connatae. Pedicelli 1-2 poll. longi. Perianthium 9-18 lin. longum, pallide lilacinum, segmentis lanceolato-spathulatis flore expanso subpatentibus carina saturatiore tubo infundibuliformi ore 2-2½ lin. crasso paullulum longioribus. Stamina in tubo biseriata, filamentis filiformibus autheris paulo longioribus, superiora ad faucem attingentia. Ovarium sessile, stylo filiformi 3-4 lin. longo. *Bonaria*, *Gillies* ! Tweedie !

Var. β . **CONSPICUA**, *Baker*.—*Triteleia conspicua*, *Baker*, *in Saund. Ref. Bot.* t. 43. Segmenta oblongo-spathulata, sursum minus angustata, flore expanso late imbricata. Pedicelli sæpe longiores. *Montevideo*, Tweedie, 1839 ! Gibert, 507 !

Var. γ . **TWEEDIEANA**, *Baker*. Multo minor; folia vix ultra ½ lin. lata;

scapus 2-3 poll. longus; pedicelli 3 lin. longi, e spatho haud exserti; perianthium 5-6 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis tubo æquantibus; stamina omnia e tubo distincte exserta. *Bonaria*, Tweedie! Verisimiliter species vera.

9. M. SELLOWIANA, Baker.—*Triteleia Sellowiana*, *Kunth*, *Enum.* iv. 466. Bulbus globosus vel ovoideus, membranaceo-tunicatus, 4-6 lin. crassus, membranis externis breviter sursum productis. Folia 6-12, synanthia, firma, modice durantia, 2-4 poll. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. Scapi 1-3, 1-4 poll. longi. Flores semper solitarii, pedicellis 2-3 lin. longis. Valvæ spathæ 2, lanceolatæ, 4-6 lin. longæ, basi connatæ. Perianthium 9-10 lin. longum, flavum, segmentis oblongo-spathulatis purpureo-carinatis 3-4 lin. latis tubo late infundibuliformi duplo longioribus. Stamina leviter biseriata, prope faucem tubi inserta, filamentis filiformibus deorsum applanatis 2- $2\frac{1}{2}$ lin. longis. Ovarium sessile, stylo 3 lin. longo. *Brasilia meridionalis* et *Montevideo*, Sello, 3664! Gibert, 512!
10. M. NIVALIS, Baker.—*Tristagma nivalis*, *Pöppig*, *Nov. Gen.* ii. 28, t. 140; *C. Gay*, *Fl. Chil.* vi. 125. Bulbus ovoideus, membranaceo-tunicatus, membranis externis longe sursum productis. Folia 5-6, viridia, carnosæ-herbacea, synanthia, 6-9 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapi foliis subæquantes. Valvæ spathæ 2, lanceolatæ, 1 poll. longæ, basi connatæ. Umbellæ 2-3-floræ, pedicellis 3-15 lin. longis. Perianthium infundibuliforme, 9-10 lin. longum, segmentis linearibus viridibus carnosis acutis flore expanso patentibus tubo cylindrico ore vix ultra 1 lin. lato duplo brevioribus. Antheræ in tubo distincte biseriatae, sessiles. Ovarium sessile, lanceolatum, stylo filiformi $1\frac{1}{2}$ lin. longo. *Chili*, Germain!
11. M. PÖPPIGIANA, Baker.—*Triteleia Pöppigiana*, *C. Gay*, *Fl. Chil.* vi. 117.—T. uniflora, *Flore des Serres*, ix. t. 283? Bulbum non vidi. Folia 6-8, synanthia, carnosæ-herbacea, subplana, 8-12 poll. longa, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata. Scapi 2-3, flaccidi, foliis subæquantes. Valvæ spathæ 2 (raro 3-4) lanceolatæ, 1 poll. longæ, basi connatæ. Umbellæ 4-8-floræ, pedicellis apice haud articulatis 12-15 lin. longis. Perianthium infundibuliforme, pallide lilacinum, 9-10 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis tubo infundibuliformi ore 2 lin. crasso paullulum longioribus. Stamina in tubo biseriata, filamentis filiformibus 2 lin. longis, superiora ad faucem attingentia. Ovarium sessile, stylo filiformi 2 lin. longo. *Chili*, C. Gay!
12. M. IXIOIDES, Baker.—*Ornithogalum ixioides*, *Ait. Hort. Kew.* edit. alt. ii. 257.—*Themis ixioides*, *Salisb. Gen.* 85.—*Calliprora lutea*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1590; *Hook. et Arn. Bot. Beech.* 400; *Hook. Bot. Mag.* t. 3588. Bulbus globosus, fibroso-tunicatus, 6-8 lin. crassus. Folia 2-3, synanthia, carnosæ-herbacea, basin scapi

cingtia, 6–12 poll. longa, 2–6 lin. lata. Scapi erecti, fistulosi, 6–18 lin. longi. Valvæ spathæ 3–4, lineares, 4–6 lin. longæ. Umbellæ 10–20-floræ, pedicellis apice articulatis 1–2 poll. longis. Perianthium infundibuliforme, flavum, 7–12 lin. longum, segmentis lanceolato-spathulatis distincte viridi vittatis subacutis tubo turbinato duplo longioribus. Stamina e fauce tubi leviter biseriata, filamentis complanatis apice tricuspidatis 2–2½ lin. longis. Ovarium longe stipitatum, stylo filiformi 1½ lin. longo. Semina in loculo 5–6. *California*, Douglas! Hartweg, 1996! Jeffray, 1124! Coulter, 741! Bridges, 294! &c.

13. M. *LAXA*, Baker.—*Triteleia laxa*, Benth. *Trans. Hort. Soc.* i. 413, t. 15. fig. 2; Lindl. *Bot. Reg.* t. 1685; Hook. et Arn. *Bot. Beech.* 401.—*Seubertia laxa*, Kunth, *Enum.* iv. 475; Wood, *Proc. Phil. Acad.* 1868, 172. Bulbus globosus, 6–9 lin. crassus, fibroso-tunicatus. Folia synanthia, carnosò-herbacea, subplana, 12–18 poll. longa, 2–4 lin. lata. Scapi fragiles, erecti, 12–18 poll. longi. Valvæ spathæ multæ, lanceolatae et lineares, 6–9 lin. longæ. Umbellæ 8–20-floræ, pedicellis apice articulatis 1–3 poll. longis. Perianthium infundibuliforme, saturate cæruleum, 15–18 lin. longum, segmentis lanceolatis acutis erecto-patentibus tubo infundibuliformi ore 3–4 lin. crasso distincte brevioribus. Stamina in dimidio superiore tubi biseriatim inserta, antheris linearibus filamenta excedentibus. Ovarium stipe 6–9 lin. longo, loculis 12–15-ovulatis, stylo filiformi 1½ lin. longo. *California*, Douglas! Hartweg, 1998! Bigelow! Bridges, 273! &c.
14. M. *PEDUNCULARIS*, Baker.—*Triteleia peduncularis*, Lindl. *Bot. Reg.* 1865; Hook. et Arn. *Bot. Beech.* 401; Kunth, *Enum.* iv. 469. Bulbum non vidi. Folia synanthia, carnosò-herbacea, 12–18 poll. longa, 3–4 lin. lata. Scapi 1½–2 pedes longi, erecti, fragiles. Valvæ spathæ multæ, lineares, 6–8 lin. longæ, basi liberae. Umbellæ 12–20-floræ, pedicellis apice articulatis 2–3 poll. longis. Perianthium infundibuliforme, cæruleum, 8–9 lin. longum, segmentis erecto-patentibus lanceolato-spathulatis acutis carina saturatiore tubo infundibuliformi ore 2 lin. crasso paullulum longioribus. Anthereæ sessiles, 1½ lin. longæ, in dimidio superiore tubi biseriatim insertæ. Ovarium longe stipitatum, stipe 2–2½ lin. longo, stylo filiformi 1½ lin. longo. Semina in loculo 3–4. *California*, Douglas! Fremont!
15. M. *CROCEA*, Baker.—*Seubertia crocea*, Wood, *Proc. Acad. Phil.* 1868, 172.—Folia linearia, scapo pedali breviora. Valvæ spathæ 4, acuminatae, pedicellis breviore. Umbellæ 5–6-floræ. Perianthium infundibuliforme, croceum, 9 lin. longum, segmentis obtusis. Anthereæ oblongæ, biseriatæ. Ovarium longe stipitatum. Semina in loculo 5. *California*, Prof. Wood (*non vidi*).

16. *M. HYACINTHINA*, Baker.—*Hesperoscordium hyacinthinum*, Lindl. *Bot. Reg.* sub t. 1293; *Kunth*, *Enum.* iv. 464.—*H. Lewisii*, Hook. *Flo. Bor. Am.* ii. 185.—*Brodiaea grandiflora*, Nuttall, non Smith. Bulbus globosus, 6–12 lin. crassus, fibroso-tunicatus. Folia 2–3, synanthia, carnosæ-herbacea, 12–18 poll. longa, 3–6 lin. lata. Scapi firmi, erecti, 1–2 pedes longi. Valvæ spathæ multæ, lineares, 5–6 lin. longæ. Umbellæ 10–30-floræ, pedicellis 6–12 lin. longis apice articulatis. Perianthium infundibuliforme, album, 6–7 lin. longum, segmentis lanceolato-spathulatis viridi-vittatis erecto-patentibus tubo campanulato triplo longioribus. Stamina e fauce subuniseriata, filamentis deltoideis petaloideis vix 1 lin. longis. Ovarium distincte stipitatum, stylo 1 lin. longo. Semina in loculo 2–3. *Insulæ Vancouver et St. Juan*, Lyall! *Columbia britannica*, Douglas! Hinds! &c. *Oregon*, Nuttall! *California*, Bridges!
- Var. *B. LACTEUM*, Baker.—*H. lacteum*, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1639; *Kunth*, *Enum.* iv. 464; *Wood*, *Proc. Acad. Phil.* 1868, 171. Gracilior, floribus paucioribus, pedicellis elongatis (1–3 poll. longis). *California*, Douglas! Hartweg 1994!
17. *M. SETACEA*, Baker. Bulbus ovoideus, 3–4 lin. crassus, membranaceo-tunicatus, membranis externis sursum longe productis. Folia 5–6, synanthia, 3–4 poll. longa, setacea, modice firma. Scapus filiformis, glaber, 2–3 poll. longus, semper uniflorus. Valvæ spathæ 2, lineares, 3–4 lin. longæ, basi connatæ. Pedicelli 1½–2 lin. longi. Perianthium infundibuliforme, albidum, 4½–5 lin. longum, tenerum, segmentis oblongo-spathulatis subacutis carina pallide brunnea tubum campanulatum 3–4-plo excedentibus. Stamina ad faucem tubi inserta, leviter biseriata, filamentis filiformibus 1½–2 lin. longis. Ovarium sessile, stylo filiformi 2 lin. longo. *Tucuman*, Tweedie!
18. *M. HIRTELLA*, Baker.—*Triteleia hirtella*, Kunth, *Enum.* iv. 465. Bulbus subgloboso-ovoideus. Folia 4–6, synanthia, 3 poll. longa, filiformia, vix ¼ lin. lata. Scapus 3–3½ poll. longus, hirtellus, unicus. Valvæ spathæ pedicellum brevem longe superantes. Perianthium luteum, parum minor quam in *M. Sellowiana*, segmentis ellipticis acutis tubo campanulato triplo longioribus. Stamina prope faucem tubi inserta, filamentis late subulatis. Ovarium sessile, stylo filiformi ovario longiore. *Montevideo*, Gaudichaud (*non vidi*).
19. *M. SUBBIFLORA*, Baker.—*Allium subbiflorum*, Colla, *Act. Taur.* 39, p. 13, t. 52.—*Triteleia Berteri*, Kunth, *Enum.* iv. 467; C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 116. Bulbus ovoideus, 4–6 lin. crassus, membranaceo-tunicatus, membranis externis productis. Folia 4–6, modice firma, synanthia, 3–5 poll. longa, ½ lin. lata. Scapi 1½–3 poll. longi, uni- vel saepe biflori. Valvæ spathæ 2, lanceolatae, 4–5 lin. longæ, basi con-

natæ. Pedicelli 1-2 lin. longi. Perianthium infundibuliforme, albidum, 5-6 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis subacutis distincte brunneo-carinatis tubum campanulatum 3-4-plo excedentibus. Stamina e fave tubi leviter biseriata, filamentis filiformibus 1½ lin. longis. Ovarium sessile, stylo 1 lin. longo. *Chili*, Bertero! Bridges 342!

20. M. BREVIPES, *Baker*.—*Triteleia brevipes*, *Kunze*, *Linnæa*, xx. 9. Folia 4-8, 3 poll. longa, 1½ lin. lata. Scapus foliis paullulum brevior. Valvae spathæ 2, basi connatæ, parte libera 6 lin. longa. Umbellæ 3-floræ, pedicellis vix 1 lin. longis. Perianthium album, 5-6 lin. longum, segmentis lanceolatis brunneo-carinatis tubo quadruplo longioribus. Stamina biseriata, filamentis filiformibus deorsum complanatis. Ovarium sessile. *Chili* (*non vidi*).
21. M. BIVALVIS, *Baker*.—*Triteleia bivalvis*, *Lindl. Bot. Reg. sub t.* 1293; *Kunth*, *Enum. iv.* 468; *C. Gay*, *Fl. Chil. vi.* 117.—T. Gaudichaudiana et violacea, *Kunth*, *loc. cit.* Bulbus ovoideus, 6-9 lin. crassus, membranaceo-tunicatus. Folia 4-6, synanthia, carnosoherbacea, 6-9 poll. longa, 1-2 lin. lata. Scapus tener, foliis subæquans. Valvae spathæ 2, linear-lanceolatae, basi connatae, 6-9 lin. longæ. Umbellæ 2-4-floræ, pedicellis flaccidis 6-12 lin. longis. Perianthium infundibuliforme, album vel albido-violaceum, 6-7 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis distincte brunneo-carinatis tubum campanulatum quadruplo excedentibus. Stamina e tubo biseriata, filamentis deorsum complanatis 1½ lin. longis. Ovarium sessile, stylo filiformi 1-1½ lin. longo. Semina in loculo 5-6. *Chili*, Beechey! Cuming, 651! Bridges! &c.
22. M. PORRIFOLIA, *Baker*.—*Triteleia porrifolia*, *Pöpp. Fragm.* 10; *Kunth*, *Enum. iv.* 468; *Pöpp. et Endl. Nov. Gen. t.* 139; *C. Gay*, *Fl. Chil. vi.* 118. Bulbus ovoideus, 8-12 lin. crassus, membranaceo-tunicatus. Folia 4-5, synanthia, carnosoherbacea, 6-8 poll. longa, 1-2 lin. lata. Scapus foliis subæquans. Valvae spathæ 2, lanceolatae vel lineares, basi connatae, 8-12 lin. longæ. Umbellæ 4-6-floræ, pedicellis 6-9 lin. longis. Perianthium infundibuliforme, albido-violaceum, 9-10 lin. longum, segmentis lanceolato-spathulatis tubo subtriplo longioribus. Stamina e tubo biseriata, filamentis 2½-3 lin. longis. Ovarium sessile, stylo filiformi 4 lin. longo. *Chili*, Philippi! Germain! Beechey!
23. M. AUREA, *Baker*.—*Triteleia aurea*, *Lindl. Bot. Reg.* 1841, p. 78; *Kunth*, *Enum. iv.* 469; *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 42. Bulbus globosus, 4-6 lin. crassus, membranis albidis tunicatus. Folia 6-8, carnosoherbacea, synanthia, filiformia, 3-4 poll. longa, ½ lin. lata. Scapi 1-3, erecti, 2-4 poll. longi. Valvae spathæ 2, lanceolatae, basi connatae, 4-6 lin. longæ. Umbellæ 2-6-floræ, pedicellis 6-18

lin. longis. Perianthium erodium, 5–6 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis subobtusis viridi-vittatis flore expanso subpatentibus tubo brevi 3–4-plo longioribus, Stamina e fauce tubi leviter biseriata, filamentis filiformibus $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longis. Ovarium sessile, stylo $1\frac{1}{2}$ lin. longo. Semina in loculo 5–6. *Bonaria*, Gillies! *Montevideo*, Gibert! Isabelle! *Entre Rios*, Tweedie!

13. MASSONIA, Linn.

Linn. Gen. 1381; *Endl. Gen.* 1126; *Kunth, Enum.* iv. 295; *Salisb. Gen.* 17; *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 395.—*Polyxena*, *Kunth, Enum.* iv. 294; *Harv. loc. cit.*—*Podocallis*, *Salisb. Gen.* 17.—*Mauhlia*, *Thunb. Nov. Gen.* iii. *Prodr.* 60, t. 1 (*ex parte*); *Salisb. Gen.* 17 (*sphalmate Manilia*).

Perianthium tubuloso-gamophyllum, segmentis linearibus vel lanceolatis æqualibus plerisque reflexis tubo æquantibus vel brevioribus. *Stamina* 6, ad faucem tubi uniseriatim inserta vel raro plus minus distincte biseriata e tubo, filamentis filiformibus basi sœpe in cupulum melliferum connatis; *antheris* oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, ovoidis in loculis pluribus; *stylus* rectus, filiformis; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, pro planta magna, sessilis, obovata, loculicide trivalvis, profunde trisulcata, acute angulata, seminibus globosis parvis plerisque pluribus raro paucis vel solitariis. *Testa* nitida nigra. *Herbae bulbosæ habitu proprio singulari*, *floribus corymbosis rarissime solitariis pedunculis nullis vel brevibus, foliis semper 2 synanthiis plus minus carnosis humistratis*.

§ EUMASSONIA. *Corymbi sessiles vel breviter pedunculati, bracteis exterioribus magnis involucrati. Stamina e fauce uniseriata.*

Folia facie setosa.

Segmenta tubo paulo breviora.

Folia carnosa, dense setosa.

Folia rotundata, $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longa 1. *hirsuta*.

Folia ovata, 3–5 poll. longa 2. *echinata*.

Folia lanceolata, firma, sparse setulosa .. 3. *setulosa*.

Segmenta tubo duplo breviora.

Filamenta $\frac{1}{2}$ lin. longa 4. *tenella*.

Filamenta 5–6 lin. longa 5. *muricata*.

Folia facie pustulata.

Folia lanceolato-elliptica 6. *pauciflora*.

Folia rotundato-ovata 7. *pustulata*.

Folia lœvia.

Filamenta 1 lin. longa.

Tubus $\frac{1}{2}$ lin. crassus. Pedicelli 2–3 lin. longi.

8. *jasminiflora*.

Tubus 1 lin. crassus. Pedicelli nulli.... 9. *Bowkeri*.

Filamenta 3 lin. longa 10. *Huttoni*.

Filamenta 6–9 lin. longa.

Segmenta tubo subæquantia.

Filamenta saturate rubra.

Folia subrotundata. Scapus subnnullus.

11. *latifolia*.

Folia anguste obovata. Scapus 1½–2 poll. longus.

12. *lanceæfolia*.

Filamenta viridi-flavescens 13. *obovata*.

Segmenta tubo duplo breviora.

Folia oblongo-oblanceolata 14. *longifolia*.

Folia subrotundata.

Filamenta saturate rubra..... 15. *sanguinea*.

Filamenta flavescenti-rubra..... 16. *cordata*.

Filamenta alba 17. *candida*.

§ ASTEMMA (Endlich.). *Corymbus breviter pedunculatus exinvolucratus. Stamina e fauce tubi uniseriata*.

Stamina segmentis limbi subæquantia.

Tubus cylindricus, 5–6 lin. longus 18. *angustifolia*.

Tubus filiformis, 15–18 lin. longus 19. *comata*.

Stamina segmentis limbi duplo longiora.

Segmenta patentia 20. *marginata*.

Segmenta erecta.

Bracteæ minutæ, deltoideæ 21. *Zeyheri*.

Bracteæ lanceolatæ, 3–4 lin. longæ..... 22. *Burchellii*.

§ POLYXENA (Kunth). *Corymbus vel flos solitarius breviter pedunculatus, exinvolucratus. Stamina plus minus distincte biseriata*.

Folia gramoidea. Scapus uniflorus 23. *uniflora*.

Folia lata, subcarnosa. Flores corymbosi.

Bracteæ elongatae. Segmenta tubo paulo breviora.

24. *pygmæa*.

Bracteæ minutæ. Segmenta tubo 4–6-plo breviora.

25. *ensifolia*.

1. M. HIRSUTA, *Link et Otto, Abbild. t. 1; Roem. et Schult. vii. 987*;

- Kunth*, *Enum.* iv. 296.—*M. pusilla*, *Masson*, *MSS.*, *Salisb. Gen.* 17. *Folia carnosa*, rotundata, $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longæ et lata, obtusa, basi cordata, utrinque setis albidis dense vestita. *Scapi nulli*. *Bracteæ pubescentes*, ciliatæ, exteriore oblongo-spathulatæ, 5–6 lin. longæ. *Corymbi* dense 20–30-flori. *Pedicelli* 2–3 lin. longi. *Perianthium albidum*, 5–6 lin. longum, segmentis linearibus demum reflexis, tubo ore $\frac{1}{2}$ lin. crasso paulo brevioribus. *Filamenta filiformia*, segmentis sequantia. *Cap. B. Spei*, *Masson*! *Zeyher*, 130! 4273!
2. *M. ECHINATA*, *Linn. Suppl.* 193; *Thunb. Prodri.* 60, *Fl. Cap.* 308; *Kunth*, *Enum.* iv. 296. *Folia tenuiter carnosa*, ovata, 3–5 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ –2 poll. lata, utrinque setis albidis nitidis 2– $2\frac{1}{2}$ lin. longis dense vestita. *Scapi subnulli*. *Bracteæ exteriore lineares* 8–9 lin. longæ. *Corymbi* dense 20–30-flori. *Pedicelli exteriore* 6–9 lin. longi. *Perianthium albidum*, 7–8 lin. longum, segmentis linearibus reflexis tubo ore $\frac{1}{2}$ lin. crasso paulo brevioribus. *Stamina filiformia*, 4–5 lin. longa. *Capsula sessilis*, oblonga, $4\frac{1}{2}$ lin. longa. *Cap. B. Spei*, *Masson*! *Zeyher*, 1717! &c.
3. *M. SETULOSA*, *Baker*. *Folia coriaceo-carnosa*, lanceolata, acuta, ascendentia, 12–15 lin. longa, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. lata, basi sensim angustata, supra setis albidis brevibus sparse vestita. *Scapi nulli*. *Bracteæ exteriore oblongo-rotundate*, acutæ, 5–6 lin. longæ. *Corymbi* 10–12-flori. *Pedicelli exteriore* 2–3 lin. longi. *Perianthium albidum*, 5–6 lin. longum, segmentis lanceolatis reflexis tubo gracili paulo brevioribus. *Filamenta albida*, 3–4 lin. longa. *Cap. B. Spei*, *Ecklon et Zeyher*!
4. *M. TENELLA*, *Soland. MSS. in Herb. Mus. Brit.* *Folia crasse carnosso-coriacea*, lanceolata, acuta, 1 poll. longa, utrinque angustata, petiolata, petiolis scapum arte cingentibus, supra setis robustis albidis dense vestita. *Scapi* 12–15 lin. longi. *Bracteæ exteriore oblongo-spathulatæ*, 5–6 lin. longæ. *Corymbi pauciflori*. *Perianthium* 4– $4\frac{1}{2}$ lin. longum, segmentis linear-lanceolatis erectis tubo gracili duplo brevioribus. *Filamenta lanceolata*, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Cap. B. Spei*, *Masson*! *Drège*, 3509!
5. *M. MURICATA*, *Gawl. Bot. Mag.* t. 559; *Ait. Hort. Kew. edit.* 2, ii. 210; *Kunth*, *Enum.* iv. 296. *Folia carnosso-herbacea*, rotundato-cordata, 3–4 poll. longa et lata, extrorsum supra dense setosa. *Scapi subnulli*. *Bracteæ exteriore oblongo-lanceolatae*, 1 poll. longæ. *Pedicelli exteriore* 5–6 lin. longi. *Perianthium albidum*, 1 poll. longum, segmentis lanceolatis reflexis tubo subdupo brevioribus. *Filamenta albida*, tubo subæquantia, basi connata. *Cap. B. Spei*.
6. *M. PAUCIFLORA*, *Dryand. in Ait. Hort. Kew. edit.* 2, ii. 210; *Roem. et Schult. vii. 987*; *Kunth*, *Enum.* iv. 296. *Folia lanceolata*

- vel elliptica, tuberculata, tuberculis nudis. Segmenta limbi ovatae.
Cap. B. Spei (non vidi).
7. M. PUSTULATA, *Jacq. Coll.* iv. 177; *Hort. Schoen.* t. 454; *Redouté, Lil.* t. 183; *Bot. Mag.* t. 642; *Kunth, Enum.* iv. 296. Folia carnosæ-herbacea, rotundato-ovata, 5–6 poll. longa, 3–4 poll. lata, subacuta, basi angustata, facie pustulata. Scapi semiunciales. Bractææ exteriæ ovato-lanceolatæ, 1 poll. longæ. Pedicelli exteriæ 3–4 lin. longæ. Corymbi 10–20-flori. Perianthium 1 poll. longum, segmentis linearis-lanceolatis reflexis tubo duplo brevioribus. Filamenta alba, 6–7 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei.*
8. M. JASMINIFLORA, *Burchell, MSS.*—Podocallis nivea, *Salisb. Gen.* 17? Folia oblongo-rotundata, carnosæ-herbacea, lævia, subacuta, 2 poll. longa, 12–16 lin. lata, basi spathulatim angustata. Scapi nulli. Bractææ exteriæ ovatæ, acutæ, 3–4 lin. longæ. Pedicelli exteriæ 2–3 lin. longi. Corymbus 10–12-florus. Perianthium albidum, 6 lin. longum, segmentis lanceolatis reflexis tubo $\frac{1}{2}$ lin. crasso duplo brevioribus. Filamenta 1 lin. longa, basi distincte connata. *Cap. B. Spei, Burchell!* (*v. s. cult.*). ’
9. M. BOWKERI, *Baker.* Folia carnosæ-herbacea, oblongo-rotundata, lævia, obtusa, 12–15 lin. longa, 9–12 lin. lata. Scapi nulli. Bractææ exteriæ lanceolatæ, acuminatæ, 6–7 lin. longæ. Corymbus 15–20-florus. Pedicelli subnulli. Perianthium albidum, 6 lin. longum, segmentis lanceolatis erectis tubo cylindrico 1 lin. crasso duplo brevioribus. Filamenta 1 lin. longa, carnosæ, complanata, basi distincte connata. *Cap. B. Spei (Orange River Free State), Bowker!*
10. M. HUTTONI, *Baker.* Folia carnosæ-herbacea, lævia, ovato-rotundata, 21–24 lin. longa, 15–16 lin. lata, subobtusa, basi in petiolum brevem citè angustata. Scapi 6–9 lin. longi. Corymbi 15–20-flori. Bractææ exteriæ rotundatæ, acutæ, 7–8 lin. longæ, 6–7 lin. latæ. Pedicelli exteriæ 2–3 lin. longi. Perianthium albidum, 6–7 lin. longum, segmentis linearibus reflexis 3 lin. longis. Filamenta filiformia, 3 lin. longa, basi libera. *Cap. B. Spei (Albany) Hutton!*
11. M. LATIFOLIA, *Linn. Suppl.* 195; *Thunb. Fl. Cap.* 307; *Jacq. Schoen.* iv. 28, t. 455; *Kunth, Enum.* iv. 296. Folia carnosæ-herbacea, lævia, ovato-subrotundata, demum 8–10 poll. longa, 6–8 poll. lata, lineata, interdum purpureo-maculata. Scapus nullus vel brevissimus. Bractææ ovato-lanceolatæ, exteriæ 12–18 lin. longæ. Corymbi dense 20–30-flori. Pedicelli exteriæ 5–6 lin. longi. Perianthium album, segmentis linearis-lanceolatis reflexis tubo subæquantibus. Filamenta saturate rubra, basi connata, 8–9 lin. longa. Capsula obovoidea, 1. poll. longa. *Cap. B. Spei, Masson! Burchell! Drège, 2683 c! Ecklon et Zeyher!*

12. *M. LANCEÆFOLIA*, *Jacq. Hort. Schoen.* iv. 29, t. 436; *Roem. et Schult.* vii. 991; *Kunth, Enum.* iv. 297. Folia carnosæ-herbacea, lævia, anguste obovata, 8–10 poll. longa, 4–5 poll. lata, lineata, basi sensim angustata, scapum cingentia. Scapus $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longus. Bractæ exteriæ ovato-lanceolatæ, 12–15 lin. longæ. Corymbi 15–20-flori. Pedicelli exteriæ 5–6 lin. longi. Perianthium album, segmentis linear-i-lanceolatis reflexis tubo subæquantibus. Filamenta saturate rubra, 7–8 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei.*
13. *M. OBOVATA*, *Jacq. Hort. Schoen.* iv. 29, t. 458; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 991; *Kunth, Enum.* iv. 297.—*M. grandiflora*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 958. Folia carnosæ-herbacea, lævia, obovata, subacuta, 6–7 poll. longa, 3–4 lin. lata, sublineata. Scapus brevis. Bractæ exteriæ lanceolatæ, 1 poll. longæ. Pedicelli exteriæ 5–6 lin. longi. Perianthium album, 1 poll. longum, segmentis linear-i-lanceolatis reflexis tubo subæquantibus. Corymbi 10–12-flori. Filamenta viridi-flavescens, 6 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei.*
- 13*. *M. NERVOSA*, *Hornem. Hafn. Suppl.* 39; *Kunth, Enum.* iv. 298. Folia ovato-lanceolata, acuta, 15-nervata, lævia. Tubus pallide vioaceus. Segmenta pallide straminea, tubo æquantia, erecta. Stamina straminea, segmentis duplo longiora. *Cap. B. Spei (non vidi).*
14. *M. LONGIFOLIA*, *Jacq. Hort. Schoen.* iv. 29, t. 457; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 990; *Kunth, Enum.* iv. 297. Folia carnosæ-herbacea, oblongo-oblanceolata, 10–12 poll. longa, 4 poll. lata, subacuta, lævia, basi angustata, scapum cingentia. Scapus uncialis. Bractæ exteriæ ovato-lanceolatæ, 1 poll. longæ. Pedicelli exteriæ 9–12 lin. longi. Corymbi 20–30-flori. Perianthium album, 1 poll. longum, segmentis linear-i-lanceolatis tubo 3 lin. crasso subduplo brevioribus. Filamenta albida, 8–9 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei.*
15. *M. SANGUINEA*, *Jacq. Hort. Schoen.* iv. 31, t. 461; *Roem. et Schult.* vii. 989; *Kunth, Enum.* iv. 297.—*M. latifolia*, *Bot. Mag.* t. 848, non *L.* Folia carnosæ-herbacea, subrotundato-cordata acuta, 4–6 poll. longa, 3–4 poll. lata, lineata. Scapus brevis. Bractæ exteriæ ovato-lanceolatæ, circiter 1 poll. longæ. Pedicelli exteriæ 5–6 lin. longi. Corymbi 15–20-flori. Perianthium album, 9–10 lin. longum, segmentis linear-i-lanceolatis tubo ore 3 lin. crasso duplo brevioribus. Filamenta saturate rubra, 6 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei.*
Var. *β. CORONATA*, *Baker*.—*M. coronata*, *Jacq. Schoen.* iv. 30, t. 460; *Kunth, Enum.* iv. 297. Folia paulo minora, obtusiora, minus lineato-nervosa. Flores pauciores. *Cap. B. Spei.*
16. *M. CORDATA*, *Jacq. Hort. Schoen.* iv. 36, t. 459; *Roem. et Schult.*

- Syst.* 989; *Kunth*, *Enum.* iv. 297. Folia carnosa-herbacea, lœvia, sublineata, subrotundata, acuta, 6–7 poll. longa, $4\frac{1}{2}$ –5 poll. lata. Scapus subnus. Corymbi dense 20–30-flori. Bracteæ exteriore lanceolatæ, circiter 1 poll. longæ. Pedicelli exteriore 5–6 lin. longi. Perianthium album, 9–10 lin. longum, laciniis linearibus tubo ore 2– $2\frac{1}{2}$ lin., crasso duplo brevioribus. Filamenta flavescenti-rubra, 6 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei*.
17. M. CANDIDA, *Burchell in Bot. Reg.* t. 694. Folia carnosoherbacea, rotundata, lœvia, obtusa, lineata, 3–5 poll. longa et lata, basi cordata vel late rotundata. Scapi nulli. Bracteæ exteriore ovato-lanceolatæ, 1 poll. longæ. Pedicelli exteriore 5–6 lin. longi. Corymbi 20–30-flori. Perianthium album, 9–10 lin. longum, segmentis lineari-lanceolatis reflexis tubo duplo brevioribus. Filamenta albida, 5–6 lin. longa. *Cap. B. Spei*, Burchell!
18. M. ANGUSTIFOLIA, *Linn. Suppl.* 193; *Ait. Kew.* i. 105, t. 4; *Bot. Mag.* t. 736; *Kunth*, *Enum.* iv. 298.—M. lanceolata, *Thunb. Fl. Cap.* 308. Folia lanceolata, ascendentia, acuta, 3–4 poll. longa, circiter 1 poll. lata. Corymbus breviter pedunculatus, 6–20-florus. Bracteæ lineari-lanceolatæ, 6–7 lin. longæ. Pedicelli inferiores 4–6 lin. longæ. Perianthium albidum, 8–9 lin. longum, segmentis linearibus reflexis tubo duplo brevioribus. Stamina filiformia, segmentis æquantia, rubra, e fauce uniseriata, basi connata. *Cap. B. Spei* (*v. s. cult. in Herb. Mus. Brit.*).
19. M. COMATA, *Burchell, MSS.* Folia carnosoherbacea, lorato-lanceolata, in exemplis originalibus 3–4 poll. in cultis 9–12 poll. longa, 12–15 lin. lata, haud petiolata, basi scapum arete cingentia. Scapus $\frac{1}{2}$ –1 poll. longus, foliis omnino occultus. Corymbus 20–30-florus. Pedicelli brevissimi. Bracteæ lineares, 6–9 lin. longæ. Perianthium album, 15–21 lin. longum, tubo filiformi interdum 18 lin. longo, segmentis linearibus reflexis 3 lin. longis. Filamenta e fauce uniseriata, libera, segmentis subæquantia. *Cap. B. Spei*, Burchell, 2751!
20. M. MARGINATA, *Willd. Herb.*; *Kunth*, *Enum.* iv. 299. Folia oblonga, carnosohorbiacea, margine undulata, glabra, scapo vix longiora. Scapus brevis. Bracteæ lanceolatæ, tubo breviores. Perianthium albidum, segmentis lanceolatis acutis patentibus tubo paulo brevioribus. Filamenta rosea, segmentis duplo longiora, libera. *Cap. B. Spei* (*non vidi*).—M. rugulosa, *Lichst.*; *Kunth*, *loc. cit.*, e descriptione non potui distinguere.
21. M. ZEYHERI, *Kunth*, *Enum.* iv. 298.—M. angustifolia, *Redouté*, *Lil. t.* 392? Folia carnosoherbacea, lanceolata, 3–4 poll. longa, 1 poll. lata, basi in petiolum scapum cingentia sensim angustata. Scapus 2 poll. longus. Corymbus 12–20-florus. Bracteæ parvæ,

deltoideæ. Pedicelli inferiores 3–4 lin. longi. Perianthium album, 1 poll. longum, segmentis linearibus erectis tubo duplo brevioribus. Filamenta filiformia, 8–9 lin. longa, purpurea, basi connata. *Cap. B. Spei*, Zeyher !

22. M. BURCHELLII, *Baker*. Folia carnoso-herbacea, lœvia, lanceolata, 5–6 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ –2 poll. lata, lœvia, basi in petiolum brevem sensim angustata. Scapus subpollicaris. Corymbus dense 10–12-florus. Pedicelli brevissimi. Bracteæ lanceolatæ, 3–4 longæ. Perianthium albidum, 10–12 lin. longum, segmentis linearis-ligulatis obtusis erectis tubo gracili duplo brevioribus. Stamina saturate rubra, 8–9 lin. longa, basi connata. *Cap. B. Spei*, Burchell !
23. M. UNIFLORA, *Soland*. *MSS.*; *Bot. Reg.* sub t. 694 (*nomen solum*). Folia gramoïdea, erecta, $3\frac{1}{2}$ –4 poll. longa, vix 1 lin. lata. Scapus pollicaris, uniflorus. Perianthium pallide lilacinum, tubo pergracili 15 lin. longo, segmentis lanceolatis reflexis tubo quadruplo brevioribus. Stamina filiformia, valde biseriata, inferiora ad medium, superiora ad faucem tubi inserta, filamentis segmentis sub-duplo brevioribus. *Cap. B. Spei* (*v. s. in Herb. Mus. Brit.*).
24. M. PYGMÆA, *Schlecht*. *MSS.*; *Kunth*, *Enum.* iv. 298. Folia coriaceo-carnosa, glabra, elliptica, obtusiuscula, basi angustata, corymbum paulo superantia. Scapus brevis. Bracteæ lineares, apice spathulato-dilatatae, floribus æquantes. Pedicelli floribus subæquantes. Perianthium tubo elongato gracili segmentis linearibus tubo paulo brevioribus. Stamina inæqualia, superiora segmenta paulo superantia. *Cap. B. Spei* (*Mundt et Maire*).
25. M. ENSIFOLIA, *Gawl. Bot. Mag.* t. 554; *Ait. Kew. edit.* 2, ii. 211.—*Mauhlia ensifolia*, *Thunb. Fl. Cap.* 308.—*Polyanthes pygmæa*, *Jacq. Ic.* ii. 15, t. 380.—*Polyxena pygmæa*, *Kunth. Enum.* iv. 294.—*Massonia violacea*, *Andr. Bot. Rep.* t. 46; *Red. Lil.* t. 386. Folia carnoso-herbacea, lanceolata, 2–4 poll. longa, 12–18 lin. lata, basi scapum arete cingentia. Scapus $\frac{1}{2}$ –1 poll. longus, occultus. Corymbus 3–12-florus. Pedicelli inferiores 6–9 lin. longi. Bracteæ minutæ deltoideæ. Perianthium lilacinum, 9–12 lin. longum, segmentis linearis-ligulatis patentibus tubo gracili 4–6-plo brevioribus. Stamina leviter biseriata, segmentis subæquantia. *Cap. B. Spei*, Drège ! Zeyher, 757 ! &c.

14. BRACHYSCYPHA, *Baker*.

Massoniæ sp., *Thunb.*—*Lachenalia*, sp. *Jacq.*

Perianthium campanulato-gamophyllum, segmentis ligulatis erectis tubo multoties longioribus, 3 exterioribus paulo brevioribus apice galeatis. *Stamina* 6, ad faucem tubi uniseriatim inserta,

filamentis filiformibus exsertis, antheris oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, ovulis in loculis 6–8; *stylus* rectus, filiformis; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, sessilis, obovato-triquetra, loculicide trivalvis, seminibus in loculis paucis. *Semina* matura non vidi. *Herba* bulbosa *foliis pluribus lanceolatis coriaceis, floribus corymbosis pedunculis brevibus*. *Inter Massoniam et Lachenaliam habitu medium tenens.*

1. *B. UNDULATA*, Baker.—*Massonia undulata*, Thunb. *Prodri.* 60; *Fl. Cap.* 308; *Willd. Sp. Plant.* ii. 28; *Kunth, Enum.* iv. 300.—*Lachenalia pusilla*, Jacq. *Ic.* t. 385; *Kunth, Enum.* iv. 292. Folia 4–5, lanceolata, 12–18 lin. longa, glabra, undulata, basi in petiolo scapum cingentia sensim angustata. Scapus 6–18 lin. longus. *Corymbus* 6–12-florus. Bractæ et pedicelli infimi 1½ lin. longi. *Perianthium* lilacinum, membranaceum, 3½–4 lin. longum. *Cap. B.* Spei, Jacquin, cult. ! Drège, 2687! Ecklon et Zeyher, Asphod. 23!

15. DAUBENYA, Lindl.

Lindl. Bot. Reg. t. 1813; *Endl. Gen.* 1127; *Kunth, Enum.* iv. 300; *Harv. Cape Genera*, 2nd edit. 395.

Perianthium tubuloso-gamophyllum, limbo in floribus omnibus vel precipue exterioribus bilabiato, segmentis labii superioris linearibus multo minoribus, labii inferioris majoribus oblongo-spathulatis. *Stamina* 6, ad basin segmentorum inserta, uniseriata vel biseriata, filamentis filiformibus antheris oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongo-triquetrum, ovulis in loculis pluribus; *stylus* rectus, filiformis; *stigma* capitatum. *Capsulam* non vidi. *Herbe* bulbosæ *foliis et habitu* Massoniæ *sed floribus irregularibus speciosioribus.*

Flores aurei, exteriore 15 lin. longi 1. *aurea*.

Flores rubri, exteriore 2–3 poll. longi

Scapus perspicuus; segmenta majora 1½–2 lin. lata.

2. *fulva*.

Scapus nullus; segmenta majora 5–6 lin. lata .. 3. *coccinea*.

1. *D. AUREA*, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1813; *Kunth, Enum.* iv. 301.

Folia carnosò-herbacea, oblongo-lanceolata, 4 poll. longa. Scapus brevissimus. *Corymbus* dense multiflorus, floribus flavis subsessilibus. Flores exteriore ultra 1 poll. longi, segmentis labii inferioris oblongo-spathulatis tubum excedentibus, filamentis 3–4 lin. longis. Flores centrales segmentis erectis linearibus irregularibus

tubo multo brevioribus, filamentis basi leviter connatis. *Cap. B. Spei.*

2. D. **FULVA**, *Lindl. Bot. Reg.* 1839, t. 53; *Kunth, Enum.* iv. 300. Folia carnosò-herbacea, lanceolata, 3–4 poll. longa, basi in petiolos scapum cingentia angustata. Scapus 2–4 poll. longus. Corymbus 20–30-florus, floribus saturate rubris subsessilibus. Bractææ exteriæ oblongo-spathulatæ, 8–9 lin. longæ. Flores exteriæ 2–2½ poll. longi, segmentis labii inferioris ligulato-spathulatis 6–9 lin. longis, 1½–2 lin. latis, labii superioris minutis linearibus uniseriatis vel biseriatis, filamentis 1–3 lin. longis. Flores centrales segmentis irregulariter superpositis, suberectis linearibus 1½–2 lin. longis. *Cap. B. Spei?* (*v. s. cult. in Herb. Saunders*).
3. D. **COCCINEA**, *Harv. MSS.* Folia carnosò-coriacea, oblongo-spathulata, 4–5 poll. longa, 18–21 lin. lata, valde lineata, margine undulata, haud petiolata. Corymbus subsessilis, dense multiflorus, floribus coccineis subsessilibus. Bractææ exteriæ obovatæ, 1 poll. longæ. Flores exteriæ 3 poll. longi, segmentis labii inferioris oblongo-spathulatis 15–18 lin. longis 5–6 lin. latis, labii superioris linearibus minutis, filamentis 1–1½ lin. longis. Flores centrales segmentis linearibus minutis suberectis inæqualibus. *Cap. B. Spei*, Harvey!

16. DIPCADI, *Medic.*

Medic. Act. Palat. vi. 431; *Ust. Ann.* ii. 13; *Moench, Meth.* 633; *Webb, Phyt.* iii. 340; *Parl. Fl. Ital.* ii. 481.—*Uropetalum*, *Burch. MSS.*; *Ker, Bot. Reg.* t. 156; *Endl. Gen.* 1122; *Kunth, Enum.* iv. 377; *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 398.—*Zucagnia*, *Thunb.* non *Cav.*—*Polemannia*, *Berg.* non *Ecklon*.—*Tricharis*, *Salisb. Gen.* 24.—*Hyacinthi* sp., *Linn.* &c.

Perianthium tubulosum, viride vel albido- vel flavo-virescens, tubo cylindrico, segmentis difformibus, interioribus valvatis alte approximatis apice patulis, exterioribus falcatis dorso sub apice gibbosis saepè longioribus caudatis. *Stamina* ad faucem vel medium tubi uniseriata, æqualia, filamentis nullis vel brevibus filiformibus, antheris linearibus versatilibus. *Ovarium* oblongum, sessile vel stipitatum, ovulis in loculis pluribus; *stylus* brevis, rectus; *stigma* trilobatum. *Capsula* membranacea, rotundata vel late obovata, profunde trisulcata, sessilis vel stipitata, loculicide trivalvis, seminibus in loculis 6–20, complanatis alatis discoideis uniseriatis. *Testa* nigra, nitida. *Herbae bulbosæ floribus secundo racemosis, foliis særissime carnosò-herbaceis anguste linearibus.*

§ *TRICHARIS* (Salisb.). *Segmenta limbi æquiloniga.*

Ovarium sessile vel subsessile.

Folia glabra anguste linearia, deorsum 2–3 lin. lata.

Bractæ pedicellis longiores.

Folia 6–12 poll. longa.

Perianthium 5–6 lin. longum 1. *serotinum.*

Perianthium 7–8 lin. longum 2. *unicolor.*

Folia 1½–2-pedalia vel ultra 3. *longifolium.*

Bractæ pedicellis subdupo breviores 4. *hydsuricum.*

Folia glabra, semiteretia, ½–1 lin. crassa 5. *hyacinthoides.*

Folia deorsum rigide setosa.

Folia recta: antheræ ad faucem tubi sessiles.

6. *setosum.*

Folia circinata; stamina infra medium tubi inserta filamentis brevibus 7. *ciliare.*

Ovarium distincte stipitatum.

Perianthium 7–8 lin. longa, segmentis tubo subæquantibus.

8. *montanum.*

Perianthium 12–18 lin. longum, segmentis tubo 2–3-plo brevioribus 9. *concanense.*

§ *UROPETALUM* (Burchell, Salisb.). *Segmenta exteriora interioribus longiora, caudata.*

Folia teretia filiformia 10. *minimum.*

Folia anguste linearia, deorsum 3–6 lin. lata.

Folia firma, striato-nervosa 11. *rigidifolium.*

Folia carnosæ-herbacea, crispata 12. *crispum.*

Folia carnosæ-herbacea, nullo modo crispata.

Bractæ 1–2 lin. longæ.

Folium solitarium; perianthium 4½–5 lin. longum.

13. *unifolium.*

Folia 2; perianthium 9–10 lin. longum. 14. *Welwitschii.*

Bractæ lanceolato-acuminatæ 5–6 lin. longæ.

Capsula breviter stipitata 15. *umbonatum.*

Capsula sessilis.

Segmenta exteriora ½–1 lin. longiora.

Perianthium 4½–5 lin. longum 16. *taccaceanum.*

Perianthium 7–8 lin. longum 17. *erythræum.*

Segmenta exteriora 4–6 lin. longiora. 18. *viride.*

Folia lorata, 4–5 poll. lata 19. *glaucum.*

1. D. SEROTINUM, *Medic. et Mœnch. loc. cit.*—*Hyacinthus serotinus*, *Linn. Sp. Plant.* 453; *Cav. Ic.* t. 30; *Red. Lil.* t. 202.—*Scilla serotina*, *Bot. Mag.* t. 859.—*Uropetalum serotinum*, *Gawl. Bot. Reg.* sub t. 156; *Reich. Ic.* x. t. 459; *Kunth, Enum.* iv. 378.—*Tricharis serotina*, *Salisb. Gen.* 24. Folia 5–6, carnosso-herbacea, glabra, anguste linearia, facie canaliculata, 6–12 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapus 4–12-pollicaris. Racemus laxe 4–12-florus. Pedicelli infimi 3–4 lin. longi. Bractæ lanceolate, 4–6 lin. longæ. Perianthium brunneo-viride, 5–6 lin. longum, segmentis æquilongis tubo 1–1½ lin. crasso longioribus, exterioribus angustioribus margine convolutis flore expanso falcatis. Filamenta ad faucem inserta, antheris breviora. Capsula 5–6 lin. longa et lata, basi angustata, seminibus in loculo 8–12. *Insulae Fortunate*; *Lusitania*; *Hispania*; *Barbaria*; *Gallia meridionalis*; *Liguria*.
- D. FULVUM, *Webb, Phyt. Can.* iii. 140 (*Hyacinthus fulvus*, *Cav. Ann.* iii. 47; *Bot. Mag.* t. 1185), est forma robusta floribus flavescentibus.
2. D. UNICOLOR, *Baker*.—*Uropetalum unicolor*, *Stocks, Hook. Journ.* iv. 180; *Walp. Ann.* vi. 119. Folia 5–6, carnosso-herbacea, glabra, anguste linearia, facie canaliculata, 6–8 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapus 4–8-pollicaris. Racemus laxe 4–6-florus. Pedicelli infimi 2–2½ lin. longi. Bractæ deltoideo-acuminatæ, 3–4 lin. longæ. Perianthium 7–8 lin. longum, gramineo-viride, segmentis æquilongis tubo 1 lin. crasso æquantibus, exterioribus ligulatis margine convolutis flore expanso paullulum falcatis. Capsula 6–7 lin. longa et lata, basi angustata. *India orientalis*; *Scinde et Beloochistan*, *Stocks*, 634! Ad præcedentem arcte affinis.
3. D. LONGIFOLIUM, *Baker*.—*Uropetalum longifolium*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 194; *Kunth, Enum.* iv. 378. Folia 5–6, carnosso-herbacea, glabra, anguste linearia, 18–24 poll. longa vel ultra, deorsum 3–4 lin. lata. Scapus 1–2-pedalis. Racemus laxe 4–8-florus. Pedicelli 2–3 lin. longi. Bractæ lineari-acuminatæ, 3–6 lin. longæ. Perianthium viride, 6–8 lin. longum, segmentis æquilongis tubo 1 lin. crasso subæquantibus, exterioribus margine convolutis flore expanso falcatis. Antheræ ad faucem subsessiles. Capsula subsessilis. *Africa tropicalis*; *Mozambique*, *Forbes!* *Zambesi-land*, *Dr. Kirk!* *Guinea*, *in ditione nigritana*, *Barter*, 3441!
4. D. HYDSURICUM, *Baker*.—*Uropetalum hydsuricum*, *Edgew. Linn. Trans.* xx. 88. Folia 5–6, carnosso-herbacea, glabra, anguste linearia, canaliculata, 6–9 poll. longa, 2–3 lin. lata. Racemus laxe 5–8-florus. Pedicelli infimi 3–4 lin. longi. Bractæ deltoideo-acuminatae, 2–2½ lin. longæ. Perianthium 6 lin. longum, flavo-virescens, segmentis æquilongis tubum paulo excedentibus, exterioribus anguste ligulatis. Filamenta ad faucem inserta, antheris breviora.

Capsula basi angustata, seminibus in loculo 8–9. India orientalis; Punjaub, prope Loodiana, Edgeworth!

5. D. HYACINTHOIDES, Baker.—*Uropetalum hyacinthoides*, Spreng. *Cur. Post.* 135; Kunth, *Enum.* iv. 378.—*Polemannia hyacinthoides*, Berg. *Linnæa*, 1826, 250.—*Lachenalia graminifolia*, Soland. MSS. Folia 2–3, carnosò-herbacea, semitereta, 4–9 poll. longa, $\frac{1}{2}$ –1 lin. crassa, glabra. Scapus 6–12-pollicaris. Racemus laxe 4–9-florus. Pedicelli infimi 2–3 lin. longi. Bracteæ lanceolato-acuminatae, 3–4 lin. longæ. Perianthium viride vel viridi-flavescens, 6–7 lin. longum, segmentis æquilongis tubo 1 lin. crasso subæquantibus, exterioribus angustioribus margine convolutis flore expanso falcatis. Antheræ ad faucem tubi sessiles. Capsula sessilis. Cap. B. Spei, Masson! Burchell! Drege, 1571! Zeyher, 1700! Natal, Mrs. Fannin!
6. D. SETOSUM, Baker. Folia 4–5, firma, linearia, deorsum 2–3 lin. lata, præcipue ad dorsum setis flavidis firmis instructa. Scapus 4–6 pollicaris. Racemus laxe 5–8-florus. Pedicelli infimi 4–4½ lin. longi. Bracteæ deltoideo-acuminatae, 2–3 lin. longæ. Perianthium 8–9 lin. longum, viridi-flavescens, segmentis æquilongis tubo 1½ lin. crasso subæquantibus, exterioribus linearì-ligulatis. Antheræ ad faucem tubi sessiles. Capsula sessilis. Cap. B. Spei, Modderfontyn, Namaqua-land, Rev. H. Whitehead!
- Var. β. READII, Baker. Gracilior; folia similiter setosa, vix ultra 1 lin. lata, 3–4 poll. longa; pedicelli 1½–2 lin. longi, bracteis lanceolatis breviores; perianthium 10 lin. longum, segmentis exterioribus magis convolutis, flore expanso falcatis. Cap. B. Spei, Fuller's Farm, R. W. Reade, 94! Verisimiliter species vera.
7. D. CILIARE, Baker.—*Uropetalum ciliare*, Ecklon et Zeyher, MSS.; Harv. *Thes. Cap.* ii. t. 170. Folia 6–8, carnosò-herbacea, 4–6 poll. longa, deorsum 2–3 lin. lata, valde circinato-convoluta, basin scapi arcte cingentia, præcipue deorsum ad marginem et dorsum setis firmis albidis vestita. Scapus 4–8-pollicaris. Racemus 4–8-florus. Pedicelli floriferi 1½–2 lin. longi. Bracteæ lanceolatae, 2–3 lin. longæ. Perianthium viride, 7–8 lin. longum, segmentis æquilongis anguste ligulatis tubo 1 lin. crasso subæquantibus, exterioribus linearì-subulatis. Filamenta infra medium tubi inserta, antheris breviora. Capsula sessilis, oblonga, seminibus in loculo 3–4. Cap. B. Spei, Zeyher, 48! Cooper, 474, 493! Bowker! ad ripas fluv. Aapages, Burke!
8. D. MONTANUM, Baker.—*Uropetalum montanum*, Dalzell, *Kew Journ.* ii. 152. Folia 5–6, carnosò-herbacea, glabra, linearì-subulata, subtereta, 4–6 poll. longa, basi vix ultra 1 lin. crassa. Scapus 6–9 pollicaris. Racemus laxe 6–12-florus. Pedicelli infimi 4–6 lin. longi. Bracteæ lanceolato-acuminatae, 3–4 lin. longæ. Perianthium albido-virescens, 7–8 lin. longum, segmentis æquilongis tubo 1 lin.

crasso subæquantibus, exterioribus ligulatis. Stamina ad faucem tubi inserta, filamentis antheris brevioribus. Capsula distincte stipitata, seminibus in loculo 5–6. India orientalis; Bombay, Dalzell!
Delhi, Vicary!

9. *D. CONCANENSE, Baker.*—*Uropetalum concanense, Dalzell, Kew Journ. ii. 142. Folia 3–4, carnosò-herbacea, glabra, linearì-subulata, subteretia, 6–9 poll. longa, vix ultra 1 lin. crassa. Scapus 6–12-pollicaris. Racemus 2–6-florus. Pedicelli floriferi 3–6 lin. longi. Bracteæ deltoideo-acuminatæ, 1½–2 lin. longæ. Perianthium albidum, 12–18 lin. longum, segmentis æquifloris tubo 1–2 lin. crasso 2–3-plo brevioribus, exterioribus ligulatis ecaudatis. Filamenta ad faucem inserta 1½ lin. longa. Capsula distincte stipitata, seminibus in loculo 6–8. India orientalis; Concan, Dalzell!*
10. *D. MINIMUM, Webb, Phyt. Can. iii. 341.*—*Uropetalum minimum, Steud. in Schimp. Pl. Abyss. 1168. Folia 2–3, filiformia, carnosò-herbacea, glabra, 2–3 poll. longa, ¼ lin. crassa. Scapus 12–18 lin. longus. Racemus 2–4-florus. Pedicelli 1–1½ lin. longi. Bracteæ lanceolato-acuminatæ, 2–3 lin. longæ. Perianthium viride, 5–6 lin. longum, segmentis exterioribus 1 lin. longioribus tubum 2–3-plo excedentibus. Antheræ ad faucem tubi subsessiles. Ovarium sessile. Abyssinia, Schimper, 1168!*
11. *D. RIGIDIFOLIUM, Baker.*—*Folia 4–5, coriacea, linearia, glabra, 6–8 poll. longa, deorsum 5–6 lin. lata, basin scapi arce cingentia, crebre lineato-nervosa. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus 5–6-florus. Pedicelli 1½–3 lin. longi. Bracteæ lanceolato-acuminatæ, 5–6 lin. longæ. Perianthium viride, 7–8 lin. longum, segmentis interioribus tubo 1 lin. crasso brevioribus, exterioribus 1 lin. longioribus caudatis falcatis. Stamina ad faucem inserts filamentis brevibus. Ovarium sessile. Cap. B. Spei, ad ripas fluv. Aapages, Burke!*
12. *D. CRISPUM, Baker.*—*Uropetalum crispum, Burch. Gawl. Bot. Reg. sub t. 156 (nomen solum). Folia 5–6, carnosò-herbacea, linearia, glabra, 5–6 poll. longa, deorsum 5–6 lin. lata, marginibus valde crispato-undulatis, in exemplis cultis pedalia vel ultra multo minus crispata. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus laxè 6–12-florus. Pedicelli 3–6 lin. longi. Bracteæ lanceolatae, 2–3 lin. longæ. Perianthium viride, 8–9 lin. longum, segmentis interioribus tubo 1 lin. crasso subæquantibus, exterioribus 1–1½ lin. longioribus caudatis falcatis. Antheræ ad faucem subsessiles. Ovarium sessile. Cap. B. Spei, Burchell, 2682!*
13. *D. UNIFOLIUM, Baker.*—*Uropetalum taccaceanum, var. angustifolium, Schweinf. Exsic. 23. Folium solitarium, basin scapi arce cingens, carnosò-herbaceum, glabrum, anguste lineare, 6–7 poll. longum, 2–2½ lin. latum. Scapus 4–5-pollicaris. Racemus laxè 4–6-*

- florus. Pedicelli 1–2 lin. longi. Bractæ pedicellis subæquantes. Perianthium viride, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longum, segmentis interioribus tubo $1\frac{1}{2}$ lin. crasso æquantibus, exterioribus caudatis 1 lin. longioribus. Antheræ ad faucem subsessiles. Ovarium sessile. *Callabat*, Schweinfurth, 23!
14. D. WELWITSCHII, Baker.—*Uropetalum Welwitschii*, Baker in Saund. Ref. Bot. t. 16. Bulbus globosus, 1 poll. crassus. Folia 2, carnosoherbacea, glabra, anguste linearia, 2 lin. lata. Scapus 6–8-pollicaris. Racemus laxe 4–6-florus. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ –3 lin. longi. Bractæ lanceolatæ, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longæ. Perianthium viride, 9–10 lin. longum, segmentis interioribus tubo $1\frac{1}{2}$ lin. crasso subæquantibus, exterioribus 3 lin. longioribus caudatis falcatis. Stamina ad faucem inserta, filamentis antheris subæquantibus. Ovarium oblongum sessile. *Angola*, Welwitsch! v. v. in Hort. Saund.—Cfr. U. fesoghense, H. G. Solms in Schwein. Beitr. Fl. Æthiop. 204; *Nubia*, Cienkowsky.
15. D. UMBONATUM, Baker.—*Uropetalum umbonatum*, Baker in Saund. Ref. Bot. t. 17. Bulbus parvus, ovoides. Folia 2–3, carnosoherbacea, glabra, pedalia vel ultra, deorsum 3 lin. lata. Scapus 1–2-pedalis. Racemus laxe 6–12-florus. Pedicelli 2–3 lin. longi. Bractæ lanceolato-acuminatæ, 4–6 lin. longæ. Perianthium viride vel viridi-flavescens, 7–8 lin. longum, segmentis interioribus tubo $1\frac{1}{2}$ –2 lin. crasso æquantibus, exterioribus $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longioribus caudatis falcatis. Stamina ad faucem inserta, filamentis brevissimis. Capsula breviter stipitata, seminibus in loculo 12–15. *Natal*, Hutton, Krauss, 437! Saunderson, 509!
16. D. TACCAZEEANUM, Baker.—*Uropetalum taccazeanum*, Hochst. in Schimp. Pl. Abyss. no. 1696; A. Rich. Fl. Abyss. ii 325. Folia 2–3, carnosoherbacea, anguste linearia, 3–4 poll. longa, $3\frac{1}{2}$ lin. lata, glabra. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus laxe 6–12-florus. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longi. Bractæ lanceolato-acuminatæ, 3–5 lin. longæ. Perianthium viride, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longum, segmentis interioribus tubo subæquantibus, exterioribus 1 lin. longioribus, breviter caudatis, deorsum complanatis. Antheræ ad faucem tubi sessiles. Capsula sessilis, obtuse angulata. *Abyssinia*, Schimper, 1696!—U.? depressum, A. Rich. loc. cit., planta altera Abyssinica, ob perianthium ignotum est omnino dubium; Ab D. taccazeano differt foliis 4–5 latioribus longioribus et capsula angulis acutioribus.
17. D. ERYTHRÆUM, Webb, Phyt. Can. iii. 341. Folia 3–4, carnosoherbacea, glabra, 9–18 poll. longa, anguste linearia, deorsum 2–3 lin. lata. Scapus 4–9-pollicaris. Racemus 6–12-florus. Pedicelli infimi 2–3 lin. longi. Bractæ lanceolato-acuminatæ, 5–6 lin. longæ. Perianthium viridi-flavescens, 7–8 lin. longum, segmentis interioribus tubo brevioribus, exterioribus $\frac{1}{2}$ –1 lin. longioribus caudatis falcatis.

Antheræ ad faucem sessiles. Capsula sessilis, 6 lin. longa et lata, seminibus in loculo 12–15. *Arabia*, Schimper, 405! Lieut.-Col. Pelly! *Egyptus*, Wiest, 659!

18. *D. VIRIDE*, *Mœnch. Meth. Suppl.* 267.—*Hyacinthus viridis*, *Linn.* *Sp.* 454; *Jacq. Ic.* t. 66; *Red. Lil.* t. 203.—*Lachenalia viridis*, *Thunb. Prodr.* 64.—*Zuccagnia viridis*, *Thunb. Fl. Cap.* 328.—*D. filamentorum*, *Medic. Ust. Ann.* ii. 13.—*Uropetalum viride*, *Gawl. Bot. Reg. sub t.* 156; *Kunth, Enum.* iv. 379. Folia 5–6, carnosò-herbacea, anguste linearia, glabra, sèpe pedalia, deorsum 1½–3 lin. lata. Scapus 1–2-pedalis. Racemus laxe 6–15-florus. Pedicelli infimi 2–3 lin. longi. Bractæ linearì-acuminatæ, 4–6 lin. longæ. Perianthium viride, 12–15 lin. longum, tubo 3–4 lin. longo 1 lin. crasso, segmentis interioribus tubo æquantibus, exterioribus 8–10 lin. longis filiformibus pergracilibus. Stamina ad faucem inserta, filamentis antheris brevioribus. Capsula sessilis, 6–7 lin. longa et lata, seminibus in loculo 15–18. *Cap. B. Spei*, Zeyher, 49! Burke! Harvey! Cooper, 1781! &c.

Var. β . *NATALENSE*, *Baker*. Robustior; folia firmiora, breviora, deorsum 5–6 lin. lata; perianthium 9–10 lin. longum, segmentis interioribus magis flavescentibus, tubo 1½ lin. crasso, segmentis exterioribus crassioribus 6–7 lin. longis. *Natal*, Saunderson, 430! Mrs. Fannin, 20! Ab typo ad *D. umbonatum* accedens.

19. *D. GLAUCUM*, *Baker*.—*Uropetalum glaucum*, *Burchell, Bot. Reg.* t. 156; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 619; *Kunth, Enum.* iv. 379. Folia 5–6, carnosò-herbacea, lorata, glauca, pedalia vel ultra, 2½–3 poll. lata. Scapus 2–3-pedalis. Racemus 30–40-florus, 15–18 poll. longus, 4–5 poll. latus. Pedicelli stricte horizontales vel paullulum deflexi, 18–24 lin. longi. Bractæ lineares, membranaceæ, evanescentes, 3 lin. longæ. Perianthium viridi-flavescens, 12–14 lin. longum, segmentis interioribus tubo subæquantibus, exterioribus 3 lin. longioribus caudatis falcatis. Stamina prope faucem tubi inserta, filamentis brevibus. Capsula breviter stipitata, 9 lin. longa et lata, seminibus in loculo 15–20. *Cap. B. Spei*, *Namaqua-land*, Burchell, 2066! Ab speciebus reliquis omnibus habitu et magnitudine valde differt.

17. LACHENALIA, *Jacq.*

Jacq. Ic. t. 383; *Endl. Gen.* 1124; *Kunth, Enum.* iv. 283; *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 394.—*Cœlanthus*, *Willd. MSS.*, *Kunth, Enum.* iv. 282.—*Himas*, *Platyestes*, *Monoeistes*, *Chloriza*, *Ochiops* et *Lachenalia*, *Salisb. Gen.* 21.

Perianthium campanulatum vel tubulosum, tubo campanulato, segmentis inæqualibus tubo multoties longioribus, 3 exteriori-

bus ligulatis valvatis dorso sub apice gibbosis, 3 interioribus plerumque longioribus imbricatis ligulato-spathulatis ore plus minus distincte patulis. *Stamina* ad faucem tubi subuniseriatim inserta, filamentis filiformibus declinatis saepe exsertis, antheris oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongum, trisulcatum, ovulis in loculis pluribus; *stylus* filiformis, cum filamentis declinatus; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, obovata, trisulcata, loculicide trivalvis, seminibus in loculis 6-12 lageniformibus parvis haud compressis. *Testa* nitida, nigra. *Herbae bulbosæ bulbis membranaceo-tunicatis, foliis synanthiis plerumque 2 oppositis carnosò-herbaceis, rarius 1 vel multis, floribus racemosis saepe speciosis, superioribus racemorum saepe parvis abortivis.*

§ EULACHENALIA. *Perianthium æqualiter tubulosum, quadruplo longius quam crassum, basi rotundatum.*

Segmenta exteriora interioribus subæquantia. 1. *pendula*.

Segmenta exteriora interioribus distincte breviora.

2. *rubida*.

Segmenta exteriora interioribus subduplo breviora.

3. *tricolor*.

§ CŒLANTHUS (Willd.). *Perianthium ventricoso-tubulosum, 3-plo longius quam crassum, basi valde obliquum.*

Species sola 4. *reflexa*.

§ ORCHIOPS (Salisb.). *Perianthium tubulosum, 2-3-plo longius quam crassum.*

Flores subspicati.

Folia plurima, subteretia 5. *orthopetala*.

Folia 2, raro 3, lanceolata.

Perianthium 4-5 lin. longum 6. *orchioides*.

Perianthium 6-7 lin. longum 7. *glaucina*.

Perianthium 7-10 lin. longum 8. *pallida*.

Flores racemosi.

Folium semper solitarium, lineare, basi dilatatum.

9. *unifolia*.

Folia 2, lanceolata.

Segmenta omnia subæqualia 10. *isopetala*.

Segmenta interiora distincte longiora.

Folia facie lævia 11. *patula*.

Folia facie dense pustulata 12. *liliiflora*.

§ CHLORIZA (Salisb. extens.). *Perianthium tubuloso-campanulatum vel campanulatum*, 0-2-plo longius quam crassum.

Flores subspicati.

Folia plurima, subteretia 13. *contaminata*.

Folia 2, lanceolata.

Bracteæ minutæ, deltoideæ 14. *pustulata*.

Bracteæ linearisubulatæ, 3-4 lin. longæ.

15. *carnosa*.

Flores racemosi.

Folium solitarium.

Folium linearisubulatum, semiteres .. 16. *Zeyheri*.

Folium lineare, deorsum 3-6 lin. latum.

Folium glabrum ; perianthium campanulatum.

17. *convallarioides*.

Folium setosum ; perianthium tubuloso-campanulatum.

18. *hirta*.

Folium lanceolatum, deorsum 1 poll. latum.

19. *anguinea*.

Folia 2 vel raro 3.

Stamina inclusa.

Folia facie lœvia.

Folia lorata, subpedalia 20. *mediana*.

Folia lanceolata, semipedalia 21. *lucida*.

Folia facie pustulata.

Segmenta subæquilonga 22. *racemosa*.

Segmenta exteriora distincte breviora.

23. *Cooperi*.

Stamina perianthio sesqui vel demum subdupo longiora.

Folia linearisubulata, semiteretia .. 24. *juncifolia*.

Folia lanceolata.

Perianthium campanulatum, segmentis interioribus falcato-patulis 25. *purpureo-cærulea*.

Perianthium tubuloso-campanulatum, segmentis interioribus leviter patulis.

Pedicelli 1½-2 lin. longi 26. *versicolor*.

Pedicelli 4-5 lin. longi..... 27. *violacea*.

Folia ovato-oblonga, subdupo longiora quam lata.

Folia lineato-nervosa 28. *nervosa*.

Venæ foliorum inconspicuae..... 29. *Bowieana*.

1. L. PENDULA, Ait. Kew. i. 461; Thunb. Fl. Cap. 328; Jacq. Ic.

- t. 400; *Red. Lil.* t. 52; *Bot. Mag.* t. 490; *Andr. Bot. Rep.* t. 62; *Kunth, Enum.* iv. 291; *Salisb. Gen.* 2. Folia 22, carnosο-herbacea, lorato-lanceolata, 6–9 poll. longa, deorsum $1\frac{1}{2}$ –2 poll. lata, interdum leviter maculata. Scapus 4–9 poll. longus. Racemus 2–4 poll. longus, 2– $2\frac{1}{2}$ poll. latus, 6–15-florus. Bracteæ deltoideæ. Pedicelli 2–3 lin. longi. Perianthium 12–15 lin. longum, 3– $3\frac{1}{2}$ lin. crassum, æqualiter tubulosum, saturate flavo-coccineo-purpureum, segmentis exterioribus ligulatis 8–9 lin. longis $2\frac{1}{2}$ –3 lin. latis obtusis, interioribus ligulato-spathulatis 9–10 lin. longis. Stamina segmentis subæquantia. *Cap. B. Spei*, Burchell, 8573! Zeyher! Harvey, 111! Dr. Prior, &c. Species maxima et speciosissima omnium.
2. *L. RUBIDA*, *Jacq. Ic.* t. 398; *Tratt. Tab.* t. 145; *Bot. Mag.* t. 993; *Kunth, Enum.* iv. 291; *Salisb. Gen.* 22. Folia 2, carnosο-herbacea, lanceolata, 5–6 longa, 1 poll. lata, acuta, basi angustata, plus minus distincte maculata. Scapus 6–8 poll. longus, maculatus. Racemus 2–3 poll. longus, 2 poll. latus, 6–15-florus. Bracteæ deltoideæ. Pedicelli $\frac{1}{2}$ –1 lin. longi. Perianthium 12–13 lin. longum, 3 lin. crassum, æqualiter tubulosum, rubidum, segmentis exterioribus 7–8 lin., interioribus 9–10 lin. longis. Stamina segmentis longioribus subæquantia. *Cap. B. Spei*, Drège! Zeyher! *Namaqua-land*, Rev. H. Whitehead!
- Var. β . *TIGRINA*, *Gawl. Bot. Mag. sub* t. 993.—*L. tigrina*, *Jacq. Ic.* t. 399; *Kunth, Enum.* iv. 291. Sepala exteriora pallida, lineis dorsalibus et punctis densissimis rubris maculata. *Cap. B. Spei*.
- Var. γ . *PUNCTATA*, *Gawl. loc. cit.*—*L. punctata*, *Jacq. Ic.* t. 397; *Kunth, loc. cit.* Sepala exteriora incarnata, maculis densis sanguineis notata. *Cap. B. Spei*, Zeyher, 1697!
3. *L. TRICOLOR*, *Thunb. Prodr.* 64. *Fl. Cap.* 327; *Bot. Mag.* t. 82; *Red. Lil.* t. 2; *Kunth, Enum.* iv. 290.—*Phormium alooides*, *Linn. Suppl.* 205. Folia 2, carnosο-herbacea, lorato-lanceolata, 6–9 poll. longa, 6–18 lin. lata, sursum sensim angustata, interdum maculata. Scapus 3–12 poll. longus. Racemus 2–4 poll. longus, 21–24 lin. latus, 6–18-florus. Bracteæ deltoideæ. Pedicelli inferiores 2–3 lin. longi. Perianthium 9–12 lin. longum, $2\frac{1}{2}$ –3 lin. crassum, æqualiter tubulosum, saturate flavo-coccineo-viride, segmentis exterioribus lanceolatis 4– $4\frac{1}{2}$ lin. longis, 2 lin. latis, interioribus ligulato-spathulatis 7–9 lin. longis, 3 lin. latis. Stamina segmentis longioribus subæquantia. *Cap. B. Spei*, Masson! Zeyher, 1696! Burchell! Drège, 8624!—*L. quadricolor*, *Jacq. Ic.* t. 396; *Andr. Bot. Reg.* t. 148; vix differt nisi perianthio magis varie colorato.—*L. luteola*, *Jacq. Ic.* t. 395; *Red. Lil.* t. 297 (*L. quadricolor*, var. *lutea*, *Bot. Mag.* t. 1704); est forma perianthio omnino luteo.
4. *L. REFLEXA*, *Thunb. Prodr.* 64, *Fl. Cap.* 327; *Roem. et Schult.*

Syst. vii. 612, *non Andrews*.—*Cœlanthus complicatus*, *Willd. Herb. Roem. et Schult. Syst.* vii. xlvi, in adnot.; *Kunth, Enum.* iv. 282. Folia 2, carnosο-herbacea, lanceolata, 3–4 poll. longa, falcata, scapi basin arcte cingentia. Scapus 1–3 poll. longus. Flores 3–6, subsessiles, vel breviter pedicellati ascendentes. Bractæ lanceolatae, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longæ. Perianthium flavidum, 9–12 lin. longum, medio 3 lin. crassum, ventricoso-tubulosum, basi valde obliquum, segmentis exterioribus lanceolatis, $2\frac{1}{2}$ –3 lin. latis, interioribus paulo brevioribus. Stamina inclusa. *Cap. B. Spei*, Drège! Harvey, 112! Zeyher, 4292! &c.

5. L. *ORTHOPETALA*, *Jacq. Ic.* t. 3856; *Tratt. Tab.* t. 164; *Kunth, Enum.* iv. 286. Folia 4–5, carnosο-herbacea, linearι-subulata, subteretia, 3–6 poll. longa, basi 3–4 lin. lata. Scapus 4–6-pollicaris. Flores 20–30 dense subspicati, erecto-patentes. Pedicelli brevissimi vel subnulli. Bractæ minutæ, deltoideæ. Perianthium tubulosum, $4\frac{1}{2}$ lin. longum, $1\frac{1}{2}$ lin. crassum, albidum, segmentis exterioribus 1 lin. latis, dorso rubro tinctis, interioribus subrectis paulo brevioribus. Stamina petalis interioribus subæquantia. *Cap. B. Spei*, Drège!
6. L. *ORCHIOIDES*, *Ait. Kew.* i. 460; *Jacq. Ic.* t. 390; *Bot. Mag.* t. 854, 1269; *Kunth, Enum.* iv. 284; *Baker, in Saund. Ref. Bot.* t. 171.—L. *pulchella*, *Kunth, Enum. loc. cit.*—L. *mutabilis*, *Sweet, Flow. Gard. ser. ii. t. 129*; *Lodd. Bot. Cab.* t. 1076. Folia 2, raro 3, carnosο-herbacea, lanceolata, 3–8 poll. longa, deorsum 12–18 lin. lata, sæpe maculata, margine cartilaginea. Scapus 3–9-pollicaris, sæpe maculatus. Flores 12–50, subspicati. Spica 2–6 poll. longa, expansa 9–12 lin. lata. Perianthium albidum vel flavidum vel plus minus rubro vel cæruleo tinctum, breviter tubulosum, 4–5 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis exterioribus brevioribus. Stamina inclusa vel demum leviter exserta. *Cap. B. Spei*, Masson! Drège, 8628! Burchell, 1534! 7478! Zeyher, 4286! 4289! &c.; *Namaqua-land*, Rev. H. Whitehead!
7. L. *GLAUCINA*, *Jacq. Ic.* t. 391; *Willd. Sp. Plant.* ii. 171; *Hook. in Bot. Mag.* t. 3552; *Kunth, Enum.* iv. 284.—L. *sessilifolia*, *Andr. Bot. Rep.* t. 460. Folia 2, raro 3, carnosο-herbacea, lanceolata, 3–6 poll. longa, 9–12 lin. lata, margine cartilaginea, sæpe maculata. Scapus 3–6-pollicaris. Flores 6–20, subspicati. Spica $1\frac{1}{2}$ –3 poll. longa, expansa 12–15 lin. lata. Perianthium albidum vel plus minus flavo vel rubro tinctum, tubulosum, 6–7 lin. longum, $2\frac{1}{2}$ lin. crassum, segmentis exterioribus distincte brevioribus. Stamina inclusa vel demum leviter exserta. *Cap. B. Spei*, Masson! Niven! Drège, 1492 b! Zeyher, 4287–8! &c. Ad præcedentem arcte affinis.
8. L. *PALLIDA*, *Ait. Kew.* i. 640; *Thunb. Fl. Cap.* 327; *Willd. Sp.* ii. 172; *Lindl. Bot. Reg.* t. 1350 et 1945; *Kunth, Enum.* iv. 284; *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 170, *non Bot. Reg.* t. 287, *nec Red.*

- Lil. t. 22.* Folia 2, carnosæ-herbacea, lanceolata, 6–12 poll. longa, margine cartilaginea. Scapus 6–9-pollicaris. Flores 6–20, subspicati. Spica 1½–3 poll. longa, expansa 15–18 lin. lata. Perianthium albidum vel plus minus rubro tinctum, tubulosum, 8–10 lin. longum, 2–2½ lin. crassum, segmentis exterioribus 4–4½, interioribus 6 lin. longis. Stamina inclusa. *Cap. B. Spei*, Drège, 1192 a! Villette! Vix aliud quam varietas major præcedentis.
9. L. UNIFOLIA, Jacq. Schænbr. i. 43, t. 83; Bot. Mag. t. 766; Willd. Sp. Plant. ii. 178; Kunth, Enum. iv. 289.—Monoestes unifolia, Salisb. Gen. 21. Folium semper solitarium, carnosæ-herbaceum, lineare, 6–12 poll. longum, deorsum dilatatum, sanguineo-saturatum vel maculatum, basin scapi arcte amplectens. Scapus 4–15 poll. longus. Racemus 2–5 poll. longus, 15–18 lin. latus, 12–20-florus. Pedicelli 2–3 lin. longi. Bractæ lanceolato-deltoidæ, 1 lin. longæ. Perianthium tubulosum, 6–7 lin. longum, 2 lin. crassum, albidum, segmentis exterioribus 2 lin. latis, interioribus paulo brevioribus. Stamina segmentis interioribus subæquantia. Stylus demum exsertus. *Cap. B. Spei*, Masson! Niven! Drège, 477! Zeyher! &c.
10. L. ISOPETALA, Jacq. Ic. t. 401; Willd. Sp. Plant. ii. 179; Kunth, Enum. iv. 286.—L. rosea, Andr. Rep. t. 296; Kunth, loc. cit.—L. bifolia, Gawl. Bot. Mag. t. 1611; Kunth, l. c. Folia 2, carnosæ-herbacea, lorato-lanceolata, acuta, 6–9 poll. longa, deorsum 6–9 lin. lata, immaculata. Scapus 4–8-pollicaris. Racemus 2–5 poll. longus, 12–30-florus. Bractæ deltoideæ. Pedicelli inferiores 1–1½ lin. longi. Perianthium campanulato-tubulosum, albidum vel plus minus rubro tinctum, 4–4½ lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis omnibus subæquilongis. Stamina inclusa. Stylus demum exsertus. *Cap. B. Spei*, Zeyher! Thom! Harvey! Burchell, 6188! &c.
11. L. PATULA, Jacq. Ic. t. 384; Willd. Sp. Plant. ii. 175; Tratt. Tab. t. 156; Kunth, Enum. iv. 288. Folia 2, carnosæ-herbacea, anguste lanceolata, 4–6 poll. longa, immaculata. Scapus foliis excedens. Racemus sublaxe 15–20-florus, 2–3 poll. longus, expansus circiter 2 poll. latus. Pedicelli erecto-patentes, infimi 3–4 lin. longi. Perianthium 8–10 lin. longum, 2½ lin. crassum, albido-rubrum, segmentis exterioribus distincte brevioribus. Stamina inclusa. *Cap. B. Spei*.
12. L. LILIIFLORA, Jacq. Ic. t. 387; Tratt. Tab. t. 137; Willd. Sp. ii. 126; Kunth, Enum. iv. 286. Folia 2, carnosæ-herbacea, lanceolata, 4–6 poll. longa, 9–12 lin. lata, facie dense pustulata. Scapus foliis subæquans. Racemus 12–20-florus, 3–4 poll. longus, 18–21 lin. latus. Pedicelli 1–1½ lin. longi. Perianthium albidum, tubulosum, 8–9 lin. longum, 2–2½ lin. crassum, segmentis exterioribus distincte brevioribus. Stamina segmentis interioribus subæquantia. *Cap. B. Spei*.
13. L. CONTAMINATA, Ait. Kew. i. 460; Thunb. Prodr. 64; Bot. Mag. t. 1401.—L. hyacinthoides, Jacq. Ic. t. 382; Willd. Sp. ii.

- 173; *Kunth*, *Enum.* iv. 285.—*L. angustifolia*, *Jacq. Ic.* t. 381; *Bot. Mag.* t. 735; *Red. Lil.* t. 162.—*L. albida*, *Tratt. Tab.* t. 162.—*Himas angustifolia* et *hyacinthoides*, *Salisb. Gen.* 21. Folia 6–10, semiteretia, 3–8 poll. longa, basi 1½–2 lin. crassa, facie canaliculata, sœpe maculata. Scapus 2–6-pollicaris. Flores 20–40 dense subspicati. Spica 1–3 poll. longa, expansa 6–7 lin. crassa. Perianthium campanulatum, albidum, sœpe plus minus rubro tinctum, 2½–3 lin. longum, 1½ lin. crassum, segmentis exterioribus vix brevioribus. Stamina segmentis exterioribus subæquantia. *Cap. B. Spei*, Burchell! Zeyher, 4296! Cooper! Admiral Sir F. Grey! &c.
14. *L. PUSTULATA*, *Jacq. Ic.* t. 386; *Bot. Mag.* t. 817; *Willd. Sp.* ii. 176; *Andr. Bot. Rep.* t. 350; *Kunth*, *Enum.* iv. 287.—*L. declinata*, *Dietr. Lex.* iv. 292.—*Chloriza pustulata*, *Salisb. Gen.* 21. Folia 2, carnosæ-herbacea, lanceolata, 6–9 poll. longa, 8–12 lin. lata, facie pustulata. Scapus foliis subæquans. Flores 12–20 subspicati. Spica densa, 1½–2 poll. longa, 7–8 lin. crassa. Bracteæ minutæ, deltoideæ. Perianthium albidum, 3 lin. longum, 1½ lin. crassum, segmentis omnibus subæquilongis. Stamina haud vel vix exserta. *Cap. B. Spei*, Burchell!
15. *L. CARNOSA*, *Baker*. Folia 2, carnosæ-coriacea, ovato-oblonga, margine cartilaginea, 3–4 poll. longa, 12–15 lin. lata, obtusa, lævia, scapum arcte cingentia. Scapus pollicaris. Flores 30–40, dense subspicati. Spica 2–2½ poll. longa, 1 poll. crassa. Bracteæ linearisubulatæ, membranaceæ, roseæ, 3–4 lin. longæ, ante anthesin albastro longiores. Perianthium tubulosæ-campanulatum, 3½–4 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis exterioribus paulo brevioribus. Stamina inclusa. *Cap. B. Spei*, Drège, 2689a!
16. *L. ZEHYERI*, *Baker*. Folium semper solitarium, firmum, semiteres, 6–9 poll. longum, 1 lin. crassum. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus 12–20-florus, 12–18 lin. longus, expansus 7–8 lin. latus. Bracteæ perminutæ, deltoideæ. Pedicelli 1 lin. longi. Perianthium campanulatum, albidum, rubro-tinctum, 2 lin. longum et crassum, segmentis omnibus subæquilongis. Stamina distincte inclusa. *Cap. B. Spei*, Zeyher, 1694!
17. *L. CONVALLARIOIDES*, *Baker*. Folium semper solitarium, carnosæ-herbaceum, anguste lineare, 3–4 poll. longum, 2–2½ lin. latum, deorsum scapum arcte cingens. Scapus 4–5-pollicaris. Racemus 6–12-florus, 9–12 lin. longus, expansus 8–9 lin. latus. Bracteæ perminutæ, deltoideæ. Pedicelli 2 lin. longi. Perianthium campanulatum, albidum, plus minus rubro tinctum, 2 lin. longum, 1½ lin. crassum, segmentis omnibus subæqualibus. Stamina inclusa. *Kaffraria*, Bowker, 444!
- Var. β . *ROBUSTA*, *Baker*. Robustior, foliis 4–7 poll. longis, deorsum 5–6 lin. latis, raro geminatis, floribus 20–30 cum bracteis paulo majoribus. *Albany*, Williamson!

18. *L. HIRTA*, Thunb. *Prodr.* 64; *Fl. Cap.* 327; *Willd. Sp. Plant.* ii. 178; *Kunth, Enum.* iv. 289. Folium semper solitarium, lineare, 7-8 poll. longum, deorsum dilatatum et basin scapi arete cingens, facie setis firmis brunneis dense vestitum. Scapus 8-10-pollicaris maculatus. Racemus 12-20-florus, 2-3 poll. longus, 1 poll. latus. Bracteæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli infimi 3-4 lin. longi. Perianthium tubuloso-campanulatum, albidum, rubro tinctum, 4 lin. longum, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, segmentis exterioribus distinete brevioribus. Stamina inclusa. *Cap. B. Spei*, Masson!
19. *L. ANGUINEA*, Sweet, *Hort. Brit.* 420; *Flow. Gard.* ii. t. 179; *Kunth, Enum.* iv. 289. Folium semper solitarium, lanceolatum, carnososo-herbaceum, 6-7 poll. longum, 1 poll. latum, maculatum, basin scapi arete cingens. Scapus 5-6-pollicaris, maculatus. Racemus circiter 20-florus, $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longus, 2 poll. latus. Pedicelli infimi 5-6 lin. longi. Perianthium tubuloso-campanulatum, albidum, 4- $4\frac{1}{2}$ lin. longum, $2\frac{1}{3}$ -3 lin. crassum, segmentis subæquilongis viridi apiculatis. Stamina et stylus perianthio sesqui longiora. *Cap. B. Spei*.
20. *L. MEDIANA*, Jacq. *Ic.* t. 392; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 604; *Kunth, Enum.* iv. 287.—*Chloriza mediana*, Salisb. *Gen.* 21. Folia 2, carnososo-herbacea, subpedalia, lorato-lanceolata, 1 poll. lata, facie lucida. Scapus gracilis, foliis subæquans. Racemus 20-30-florus, 2-3 poll. longus. Pedicelli infimi 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longi. Bracteæ deltoideæ, 1 lin. longæ. Perianthium albidum, plus minus viridi tinctum, 4 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis interioribus paulo longioribus. Stamina perianthio æquantia. *Cap. B. Spei* (*v. s. in Herb. Mus. Brit. ex Hort. Kew. anno 1784*).
21. *L. LUCIDA*, Gawl. *Bot. Mag.* t. 1372; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 605; *Kunth, Enum.* iv. 287.—*L. pallida*, Redouté, *Lil.* t. 22; *Bot. Reg.* t. 287.—*L. fragrans*, Andr. *Rep.* t. 302, non Jacq.—*L. latifolia*, Tratt. *Tab.* t. 142.—*Chloriza lucida*, Salisb. *Gen.* 21. Folia 2, carnososo-herbacea, lanceolata, 5-6 poll. longa, 1 poll. lata, facie lævia. Scapus 4-6-pollicaris. Racemus 10-15-florus, $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longus, 9-10 lin. latus. Bracteæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli infimi $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longi. Perianthium albidum, flavo vel rubro tinctum, 4 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis exterioribus paulo brevioribus. Stamina segmentis interioribus æquantia. *Cap. B. Spei*, Drège, 8628!
22. *L. RACEMOSA*, Gawl. *Bot. Mag.* t. 1517; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 608; *Kunth, Enum.* iv. 287.—*Platyestes racemosa*, Salisb. *Gen.* 21. Folia 2, raro 3, carnososo-herbacea, lanceolata, 5-6 lin. longa, 10-12 lin. lata, facie dense pustulata. Scapus 3-4-pollicaris, vix maculatus. Racemus 12-20-florus, 2-3 poll. longus, 1 poll. latus. Bracteæ deltoideæ, 1 lin. longæ. Pedicelli infimi $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longi. Perianthium albidum, vix rubro tinctum, 3- $3\frac{1}{2}$ lin. longum, 2 lin. crassum,

- segmentis interioribus vix longioribus. Stamina demum distincte exserta. *Cap. B. Spei* (*v. v. cult. in Hort. Saundersii*).
23. **L. COOPERI, Baker.** Folia 2, carnosö-herbacea, lanceolata, 5–6 poll. longa, 9–10 lin. lata, faciei triente exteriore pustulato. Scapus 3–4-pollicaris. Racemus 20–30-florus, 3–4 poll. longus, 15 lin. latus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli infimi 3–4 lin. longi. Perianthium albido-rubrum, 4 lin. longum, 2–2½ lin. crassum, segmentis exterioribus distincte brevioribus. Stamina segmentis exterioribus æquantia. *Cap. B. Spei* (*v. v. cult. in hort. Saundersii*).
24. **L. JUNCIFOLIA, Baker.** Folia 2, semiteretia, carnosö-herbacea, lœvia, 4–8 poll. longa, deorsum 1½–2 lin. crassa. Scapus 3–4-pollicaris. Racemus 6–12-florus, 9–18 lin. longus, 9–10 lin. crassus. Bractæ minute, deltoideæ. Pedicelli 1½–2 lin. longi. Perianthium albidum, rubro tinctum, tubulosö-campanulatum, 2½ lin. longum, 1½ lin. crassum, segmentis æquilongis. Stamina perianthio sesqui longiora. *Cap. B. Spei*, Ecklon et Zeyher, Asphod. 51 !
25. **L. PURPUREO-CÆRULEA, Jacq. Ic. t. 388; Bot. Mag. t. 745; Andr. Bot. Rep. t. 251; Kunth, Enum. iv. 288.—L. botryoides, Tratt. Tab. t. 140.—Platyestes purpureo-cærulea, Salisb. Gen. 21. Folia 2, raro 3, carnosö-herbacea, lanceolata, pustulata, 6–8 poll. longa, 8–9 lin. lata. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus 30–40-florus, 4–5 poll. longus, 12–15 lin. crassus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli 1½–2 lin. longi. Perianthium campanulatum, purpureo-cæruleum, 3½–4 lin. longum, segmentis interioribus falcato-patulis paulo longioribus. Stamina perianthio sesqui longiora, divergentia. *Cap. B. Spei*.**
26. **L. VERSICOLOR, Baker.**
- a. UNICOLOR, Baker.*—*L. unicolor, Jacq. Ic. t. 389; Roem. et Schult. Syst. vii. 607; Kunth, Enum. iv. 288.* Folia 2, carnosö-herbacea, lanceolata, 3–5 poll. longa, 12–24 lin. lata, lœvia vel raro paulo pustulata. Scapus 4–8-pollicaris. Racemus 2–4 poll. longus, 12–15 lin. latus, 30–60-florus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli 1½–2 lin. longi. Perianthium tubulosö-campanulatum, 3–3½ lin. longum, 2 lin. crassum, saturate rubrum, segmentis interioribus leviter patulis paulo longioribus. Stamina subrecta, perianthio demum sesqui longiora. *Cap. B. Spei*, Mundt ! Burchell, 6346 ! Thom ! Ecklon et Zeyther, Lach. 43 ! &c.
- b. PURPUREA, Baker.*—*L. purpurea, Jacq. t. 393; Willd. Sp. ii. 177; Kunth, Enum. iv. 289.* Segmenta exteriora albida; interiora purpurea. *Cap. B. Spei*.
- y. FRAGRANS, Baker.*—*L. fragrans, Jacq. Schœn. t. 82; Willd. Sp. ii. 176; Kunth, Enum. iv. 287.* Gracilior, perianthio albido, leviter rubro tincto. *Cap. B. Spei*.

27. *L. VIOLENCEA*, *Jacq. Ic.* t. 394; *Willd. Sp.* ii. 177; *Kunth, Enum.* iv. 289.—*L. bicolor*, *Lodd. Bot. Cab.* t. 1129; *Kunth, loc. cit.* Folia 2, carnosæ-herbacea, lorata, 8–9 poll. longa, 18–21 lin. lata, lævia, maculata. Scapus ultrapedalis. Racemus 4–5 poll. longus, 18–21 lin. latus, 30–50-florus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli infimi 4–5 lin. longi. Perianthium tubuloso-campanulatum, 4–4½ lin. longum, 2–2½ lin. crassum, albidum violaceo et viridi tinctum, segmentis exterioribus paulo brevioribus. Stamina subrecta, perianthio sesqui longiora. *Cap. B. Spei.*
28. *L. NERVOSA*, *Gawl. Bot. Mag.* 1497; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 607; *Kunth, Enum.* iv. 288.—*Platyestes nervosa*, *Salisb. Gen.* 21. Folia 2, carnosæ-herbacea, ovato-oblonga patula, immerse nervosa, obtusiuscula, 3–4 poll. longa, 2–2½ poll. lata, lævia vel rarius paulo pustulata. Scapus 3–6-pollicaris. Racemus 30–50-florus, 4–6 poll. longus, 15–18 lin. latus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli 1–1½ lin. longi. Perianthium tubuloso-campanulatum, albidum, viridi et rubro tinctum, 3½–4 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis exterioribus paulo brevioribus. Stamina perianthio sesqui vel demum sub-duplo longiora. *Cap. B. Spei* (*v. tab. ex exemplo in Hort. Kew. cult. a Bowie lecto*).
29. *L. BOWIEANA*, *Baker*.—Folia 2, carnosæ-herbacea, ovato-oblonga, patula, vix lineata, 2–2½ poll. longa, 12–15 lin. lata, lævia, rubro maculata. Scapus 5–6-pollicaris. Racemus 20–30-florus, 3–4 poll. longus, 15–18 lin. latus. Bractæ minutæ, deltoideæ. Pedicelli 1½ lin. longi. Perianthium tubuloso-campanulatum, rubro tinctum, 3½–4 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis exterioribus paulo brevioribus. Stamina perianthio sesqui longiora. *Cap. B. Spei* (*v. tab. ex exemplo in Hort. Kew. cult. a Bowie lecto*).

18. VELTHEIMIA, *Gleditsch.*

Gleditsch, *Act. Berol.* 1769, p. 66; *Endl. Gen.* 1121; *Kunth, Enum.* iv. 281; *Salisb. Gen.* 22; *Harv. Cape Gen.* 2nd edit. 394.—*Aletris*, sp., *Linn. &c.*

Perianthium longe tubuloso-gamophyllum, segmentis perparvis deltoideis æqualibus erectis. *Stamina* ad medium tubi, uniseriata, filamentis filiformibus, antheris parvis oblongis inclusis versatilibus. *Ovarium* oblongo-cylindricum, sessile, ovoidis in loculis 2–3; *stylus* elongatus, filiformis; *stigma* trisulcatum. *Capsula* sessilis, magna, membranacea, obovoidea, acute trisulcata, loculicide trivalvis, seminibus solitariis turbinatis haud compressis. *Testa* nigra. *Herbeæ bulbosæ, foliis pluribus rotatis carnosæ-herbaceis synanthiis, floribus speciosis dense rase-mosis.*

- Bracteæ floribus æquantes 1. *bracteata*.
 Bracteæ floribus 2–3-plo breviores.
 Folia viridia. Perianthium 15–18 lin. longum. 2. *viridifolia*.
 Folia glauca. Perianthium 9–12 lin. longum. 3. *glaуca*.
1. V. BRACTEATA, Harv. MSS. Folia non vidi. Racemus primum conicus, demum 2 poll. latus. Pedicelli subnulli. Perianthium flavescens, 10–13 lin. longum, exsiccatum 2½–3 lin. crassum. Bracteæ lineares, longe acuminatæ, 9–12 lin. longæ. *Kaffraria*, Cooper, 320 !
2. V. VIRIDIFOLIA, Jacq. Schoen. t. 78; Willd. Sp. ii. 181; Lodd. Bot. Cab. t. 1245.—V. capensis, Red. Lil. t. 193.—Aletris capensis, Linn. Sp. 456; Bot. Mag. t. 501. Folia 10–12, lorata, 8–12 poll. longa, 2½–3 poll. lata, viridia, margine undulata. Scapus 12–18 poll. longus. Racemus 3–4 poll. longus, 3 poll. crassus, 40–60-florus. Perianthium rubidum vel flavescens, maculatum, 15–18 lin. longum, exsiccatum 3–3½ lin. crassum. Pedicelli 2–3 lin. longi. Bracteæ lanceolatæ, 4–6 lin. longæ. Cap. B. Spei.
3. V. GLAУCA, Jacq. Schoen. t. 77; Willd. Sp. Plant. ii. 182; Bot. Mag. t. 1091 et 3456; Red. Lil. t. 440; Kunth, Enum. iv. 282. Folia angustiora, glauca, valde undulata. Scapus pedalis vel ultra. Racemus 2–6 poll. longus, 18–24 lin. latus. Pedicelli vix ultra 1 lin. longi. Bracteæ lineares, 3–4 lin. longæ. Perianthium 9–12 lin. longum, rubro maculatum, vel flavescens, exsiccatum 1½ lin. crassum. Cap. B. Spei, Pappe ! Zeyher, 1719 ! Harvey ! &c.; Namqua-land, Rev. H. Whitehead !

19. MUSCARI, Tourn.

Tourn. Inst. 347, t. 180; Mill. Dict.; Endl. Gen. 1118; Kunth, Enum. iv. 313.—Botryanthus, Kunth, Enum. iv. 310.—Leopoldia, Parlatore, Fl. Palerm. i. 438; Webb. Phyt. Can. iii. 341.—Moscharia et Botryophile, Salisb. Gen. 25.—Hyacinthus, Linn. ex parte.

Perianthium urceolato-tubulosum, sub ore distincte constrictum, dentibus parvis deltoideis plerumque reflexis. *Stamina* in tubo biseriata, filamentis filiformibus vel deorsum complanatis, vix antheris parvis versatilibus oblongo-rotundatis longioribus. *Ovarium* sessile, globoso-trigonum, ovlulis in loculis 2 superpositis; *stylus* filiformis; *stigma* capitatum. *Capsula* sessilis, globosa, acute trigona, seminibus in loculo 1–2, parvis haud

compressis. *Testa nigra, nitida. Herbae bulbosæ, bulbis membranaceo-tunicatis, foliis semper synanthiis, floribus racemosis parvis saturate-cæruleis vel albis vel viridescenti-cæruleis, super premis sæpiissime abortivis.*

§ MOSCHARIA (Salisb.). *Perianthium tubuloso-urceolatum, segmentis rotundatis crassis brevissimis stellatim patentibus.*

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Folia subpedalia | 1. <i>moschatum.</i> |
| Folia 2-3-pollicaria | 2. <i>alpinum.</i> |

§ LEOPOLDIA (Parlatore). *Perianthium obovoideo-urceolatum, sursum sulcatum, 3-4 lin. longum, segmentis deltoideis reflexis. Racemus laxus elongatus. Coma florium sterilium conspicua.*

Pedicelli infimi brevissimi 3. *Cupanianum.*

Pedicelli infimi demum 2-4 lin. longi.

Racemus expansus 2-4 poll. longus.

Perianthium 3 lin. longum 4. *caucasicum.*

Perianthium 4-4½ lin. longum 5. *bootanense.*

Racemus expansus 6-12 poll. longus.

Coma corymbosa, pedicellis infimis florum sterilium 6-12 lin. longis 6. *comosum.*

Coma racemosa, pedicellis infimis florum sterilium 1-2 lin. longis 7. *Pinardi.*

Pedicelli infimi demum 2 poll. longi 8. *longipes.*

§ BOTRYANTHUS (Kunth). *Perianthium globoso- vel obovoideo-tubuloso-urceolatum, sursum teres vel sulcatum, 1-2 vel raro 3 lin. longum, segmentis deltoideis plerumque reflexis. Racemus 1-2 poll. longus. Coma florium sterilium inconspicua vel subnulla.*

Perianthium obovoideo-tubuloso-urceolatum, sursum sulcatum, duplo longius quam latum.

Flores laxe subspicati. Folia filiformia subteretia.

9. *Gussonii.*

Flores distincte racemosi.

Folium loratum, solitarium 10. *latifolium.*

Folia plura.

Racemus laxus; folia planiuscula, 2-4 lin. lata.

Flores abortivi subnulli 11. *Bourgæi.*

Flores abortivi pauci laxi 12. *maritimum.*

Racemus densus; folia linearifiliformia, profunde canaliculata vel subteretia.

Odori, segmentis limbi deltoideis reflexis.

Folia 5–6 poll. longa, 1–1½ lin. crassa. 13. *racemosum*.

Folia 9–12 poll. longa, 1½–2 lin. crassa. 14. *neglectum*.

Inodorum, segmentis limbi brevissimis haud reflexis.

15. *commutatum*.

Perianthium globoso- vel obovoideo-urceolatum vix sulcatum, haud duplo longius quam latum.

Folia lineariflorata, plura, planiuscula, 3–6 lin. lata.

Folia 15–18 poll. longa, 5–6 lin. lata 16. *grandifolium*.

Folia 6–12 poll. longa, 3–5 lin. lata 17. *botryoides*.

Folia 2, lineariflingulata, 2–3 poll. longa . . . 18. *Aucherii*.

Folia plura, linearifiliformia, semiteretia.

Perianthium vix urceolatum 19. *pallens*.

Perianthium distincte urceolatum.

Racemus laxus; perianthium 1½–2 lin. longum.

20. *parviflorum*.

Racemus densus; perianthium 2½–3 lin. longum.

21. *Heldreichii*.

1. M. MOSCHATUM, *Willd. Enum.* 378; *Bot. Mag.* t. 734; *Kunth, Enum.* iv. 313.—*Hyacinthus Muscari*, *Linn. Sp.* 454.—M. ambrosiacum, *Mænch, Meth.* 633; *Red. Lil.* t. 132. Folia 5–6, carnosoherbacea, planiuscula, subglauca, lineariflorata, subpedalia, 6–9 lin. lata. Scapus 4–8-pollicaris. Racemus subdense 20–50-florus, expansus 1–3 poll. longus, 9–10 lin. crassus, floribus omnibus subsessilibus vel infimis brevissime pedicellatis. Perianthium fertile tubuloso-urceolatum, 3½–4 lin. longum, 1½ lin. crassum, flavescens-viride, segmentis brevissimis carnosis stellatim patentibus. Flores steriles graciliores, cœrulei, sessiles vel breviter pedicellati. Capsula 8–9 lin. longa et lata. *Asia minor*, *Forbes!* *Caucasus*, *Lebedour, Kurdistan*, *Olgum!*—*Botryanthus Saulii*, *Jaub. et Spach, Ill. Pl. Orient.* t. 329, est forma minor floribus pedicellatis.

Var. β , FLAVUM, *Lam. Ency.* iii. 193; *Bot. Mag.* t. 1565.—M. macrocarpum, *Sweet, Flow. Gard.* t. 210; *Parl. Fl. Ital.* ii. 508. Racemus laxior, 2–3 poll. longus, 1 poll. vel ultra crassus, perianthum fertile flavescens, 5–6 lin. longum, magis oblongum, dentibus purpureis. *Sicilia* (*an spontanea?*), *Oriens*.

2. M. ALPINUM, *Gay, MS.* Folia 4–5, carnosoherbacea, linearia, 2–3 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapus 1½–2-pollicaris. Racemus sublaxe 12–20-florus, 12–18 lin. longus, 5–6 lin. crassus, floribus infimis bre-

LINN. PROC.—BOTANY, VOL. XI.

vissime petiolatis. Perianthium fertile viridescens, tubuloso-urceolatum, $2\frac{1}{2}$ lin. longum. Flores abortivi cœrulei, pedicellis 2–3 lin. longis. *Cilicia; Taurus, in regione alpina*, Balansa, 151.

3. M. CUPANIANUM, *Gerb. et Tarant. Cat.* 18; *Guss. Fl. Sic.* ii. 814; —*Leopoldia, Parl. Fl. Ital.* ii. 497. Folia late linearia, flaccida, canaliculata, scapo longiora. Racemus elongatus, densiusculus, floribus fertilibus laxiusculis, subsessilibus, superioribus abortivis sessilibus, omnibus erectis, subadpressis. *Sicilia* (non vidi).
4. M. CAUCASICUM, *Baker*.—*Bellevallia caucasica*, *Griseb. Fl. Rumel.* ii. 387.—M. pallens, *Hohen. Exsic. non Besser*.—M. *tubiflorum*, *Stev. Taur.* 336? Folia 2–4, carnosæ-herbacea, linear-lorata, 6–9 poll. longa, 4–6 lin. lata, falcata. Scapus 6–8-pollicaris. Racemus laxe 20–40-florus, floriferus expansus 3–4 poll. longus, 1 poll. latus. Pedicelli floriferi infimi subpatentes, $1\frac{1}{2}$ –3 lin. longi. Perianthium fertile oboviedo-urceolatum, livido-cœruleum, 3 lin. longum. Flores abortivi multi, parvi, conferti, breviter pedicellati. *Georgia caucasica in montosis aridis ditionis Elisabethpol*, Hohenacker!
5. M. BOOTANENSE, *Griff. Ic. t.* 280. Folia 5–6, carnosæ-herbacea, linearia, dorso valde convexa, 5–6 poll. longa, 3–4 lin. lata. Scapus 5–6-pollicaris. Racemus 12–20-florus, expansus 2–2 $\frac{1}{2}$ poll. longus, 12–15 lin. latus. Pedicelli fructiferi patentes, 3–4 lin. longi. Perianthium oblongo-urceolatum, 4–4 $\frac{1}{2}$ lin. longum, 2 lin. crassum. Flores steriles pauci, breviter petiolati, decidui. *Booran*, Griffith.
6. M. COMOSUM, *Mill. Dict. No. 2*; *Red. Lil. t.* 231; *Koch, Synops.* 834; *Gren. Fl. Franc.* iii. 219; *Lebed. Fl. Ross.* iv. 153.—*Bellevallia comosa*, *Kunth, Enum.* iv. 306.—*Hyacinthus comosus*, *Linn. Sp.* 455; *Red. Lil. t.* 231; *Bot. Mag. t.* 133.—*Leopoldia comosa*, *Parlat. Fl. Palerm.* i. 438. Folia 3–4, carnosæ-herbacea, pallide viridia, linear-lorata, 12–18 poll. longa, 6–12 lin. lata, e medio utrinque sensim angustata. Scapus pedalis vel ultra, fusco-maculatus. Racemus laxe 40–100-florus, floriferus expansus 6–12 poll. longus, 15–18 lin. latus. Pedicelli infimi horizontales, demum 3–5 lin. longi. Perianthium fertile oboviedo-urceolatum, olivaceo-amethystinum, 3–4 lin. longum, sursum $1\frac{1}{2}$ –2 lin. latum. Flores steriles cœrulei, 20–30, corymbosi, pedicellis elongatis arcuatæ coloratis, infinis 6–12 lin. longis. Capsula 3–4 lin. longa et lata, haud emarginata. *Ex insulis Fortunatis*, Bourgeau 1004! Mann! et *Algeria per Europam meridianalem ad Tauriam*, Pallas! et *Euphratem*, Chesney 162!—*Hyacinthus monstrosus*, *Linn. Sp.* 454 (H. paniculatus, *Lam. Encyc.* iii. 193.—*Muscaria monstrosum*, *Mill. Dict. No. 4*) est monstrositas sœpe in hortis culta racemo ramosissimo floribus lilacinis exiguis omnibus abortivis profunde partitis.—M. *Courtillieri*, *Bureau, Fl. Centre*, edit. 3, ii. 621, est

varietas gracilis foliis magis serotinis primum cylindricis floribus brevioribus sterilibus laxioribus.—*Leopoldia Calandriniana*, *Parl. Fl. Ital.* ii. 496, est *varietas gracilis* floribus densioribus abortivis magis approximatis.—*M. tenuiflorum*, *Tausch, Flora*, 1841, p. 234 (*M. comosum*, *Jacq. Austr.* t. 126) est forma foliis angustioribus floribus abortivis angustioribus pedicellis brevioribus.—*M. Clusianum*, *C. Koch, Linnaea*, xxii. 253 (*Led. Ross.* iv. 154; *Bellevallia*, *Griseb. Spic. Rumel.* ii. 387) est verisimiliter *varietas floribus abortivis paucioribus confertioribus*.

7. M. PINARDI, *Boiss. Diagn.* vii. 110.—*Bellevallia Pinnardi*, *Boiss. Diagn.* v. 62.—*Leopoldia Pinardi*, *Parl. Fl. Palerm.* i. 440. Folia 4–6, carnosso-herbacea, linearia, 6–9 poll. longa, 3–4 lin. lata. Scapus 6–8-pollicaris. Racemus laxe 50–80-florus, floriferus expansus 4–8 poll. longus, 1 poll. latus. Pedicelli infimi fructiferi horizontales, 2 lin. longi. Perianthium fertile cylindraceo-urceolatum, $3\frac{1}{2}$ –4 lin. longum, sursum vix $1\frac{1}{2}$ lin. crassum. Flores steriles 12–20, haud corymbosi, pedicellis inferiorum 1–2 lin. longis. Capsula globosa. *Caria*, Pinard! *Cappadocia*, Balansa 1114!
8. M. LONGIPES, *Boiss. Diagn.* xii.; *Walpers, Ann.* vi. 113. Folia linear-lorata, 4–11 lin. lata, scabrido-denticulata, scapo breviora. Perianthium saturate cæruleum, $3\frac{1}{2}$ –4 lin. longum. Flores steriles pauci, brevissime petiolati. Racemus fructiferus pyramidalis, pedicellis infimis saepe 2 poll. longis. Capsula oblonga. *Philistia*, Boissier (non vidi). Habitu ad *Hyacin. ciliatum* accedit, sed floribus generis.
9. M. GUSSONII, *Baker*.—*Leopoldia Gussonii*, *Parlatore, Fl. Ital.* ii. 498.—*Muscaria maritimum*, *Guss. Fl. Sic.* 426, *non Desf.* Folia 3–4, linear-filiformia, subteretia, 5–6 poll. longa. Scapus 3–4-pollicaris. Racemus sublaxe 20–30-florus, demum 2–2½ poll. longus, 6 lin. latus. Pedicelli nulli vel brevissimi. Perianthium obovoideo-urceolatum, 2 lin. longum. Flores abortivi pauci, sessiles, decidui. *Sicilia*, E. & A. Huet du Pavillon 263!
10. M. LATIFOLIUM, *Kirk, Edin. New Phil. Journ.* April 1858.—*Bellevallia monophylla*, *Gay in Balansa, Pl. Orient. Exsic.* 1857.—B. muscarioides, *Masters, Linn. Journ.* iii. 113.—Folium semper solitarium, loratum, carnosso-herbaceum, 9–12 poll. longum, 9–12 lin. latus, cito acutum, infra medium ad basin angustam sensim angustatum. Scapus gracilis, pedalis vel ultra. Racemus modice densus, 20–30-florus, floriferus expansus $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longus, 9–10 lin. latus. Pedicelli infimi fructiferi 2–2½ lin. longi, horizontales vel leviter deflexi. Perianthium fertile obovoideo-urceolatum, $2\frac{1}{2}$ lin. longum, ore 1 lin. crassum. Flores abortivi 6–10 multo pallidiores, sublaxi, superiores sessiles, infimi breviter petiolati. Capsula globosa, 4

lin. longa, apice emarginata. *Phrygia, ad montem Mourad-Dagh, in pinetis, Balansa!* *Mysia, Mt. Ida, Dr. Armitage!*

11. M. *BOURGAEI*, Baker. Folia 3-4, carnosso-herbacea, falcata, linearilobata, 2-3 poll. longa, 2-3 lin. lata, dimidio inferiore sensim angustata. Scapus 1½-2-pollicaris. Racemus sublaxe 6-10-florus, expansus 6-9 lin. longus, 6-7 lin. latus. Pedicelli infimi 1 lin. longi, patentes vel leviter ascendentibus. Perianthium saturate cæruleum, oblongo-tubuloso-urceolatum, 2 lin. longum, dentibus brevissimis. Flores abortivi subnulli. *Lycia, ad nives deliquescentes montis Ak-dagh, Bourgeau* 262 !
12. M. *MARITIMUM*, Desf. *Atl.* i. 308, *non Guss.*—*Bellevallia maritima, Kunth, Enum. iv. 307, ex parte.*—*Leopoldia maritima, Parl. Fl. Ital. ii. 498.* Folia 3-4, carnosso-herbacea, linearia, 6-9 poll. longa, 3-4 lin. lata. Scapus 3-6-pollicaris. Racemus laxo 12-20-florus, demum 2-2½ poll. longus, 7-8 lin. latus. Pedicelli infimi 1 lin. longi, plus minus ascendentibus. Perianthium obovoideo-urceolatum, 2½ lin. longum. Flores superiores steriles pauci, distincte pedicellati. *Algeria, Bove!* *Balansa* 167 ! *Creta, in arenosis maritimis, Von Heldreich !*
13. M. *RACEMOSUM*, Mill. *Dict.* No. 3; *Red. Lil.* t. 232; *DC. Fl. Franc.* iii. 208; *Bureau, Fl. Cent.* 3rd edit. ii. 620; *Eng. Bot. edit.* iii. t. 1529.—*Hyacinthus racemosus, Linn. Sp.* 455; *Jacq. Austr. t. 187; Bot. Mag. t. 122.*—H. *juncifolius, Lam. Encyc.* iii. 194.—*Botryanthus odoratus, Kunth, Enum. iv. 311; Parl. Ital. ii.* Folia 5-6, junciformia, viridia, semiteretia, 5-6 poll. longa, 1-1½ lin. crassa. Scapus 4-6-pollicaris. Racemus dense 12-30-florus, expansus vix ultra 1 poll. longus, 8-9 lin. latus. Pedicelli 1-1½ lin. longi, inferiores cernui. Flores odori. Perianthium saturate cæruleum, oblongo-tubuloso-urceolatum, 2-2½ lin. longum, superne leviter sulcatum, dentibus albidis deltoideis reflexis. Flores abortivi pauci, pallidiores, breviter petiolati. Capsula 3-3½ lin. longa, apice haud emarginata. *Ex Anglia et Lusitania per Europam meridionalem et centralem ad Afghanistan, Griffith* 357 ! 441 ! *Kurdistan, Olgum!* *Persiam, Stocks!*—M. *pulchellum, Held. et Sart. in Boiss. Diagn.* ser. 2, iv. 109; *Regel. Gartenfl.* t. 377, e Parnasso, dicitur differre foliis minus junciformibus, perianthii dentibus majoribus magis revolutis, M. *Strangwaysii, Ten. Ind. Sem. Hort. Petr.* 1837, p. 5 (*Botryanthus, Kunth, Enum. iv. 679*).—*Byzantium, racemo laxo paucifloro et foliis erectis. M. atlanticum, Boiss. et Reut. Pug.* 114, *Willk. et Lange, Fl. Hisp.* i. 206, *Hispania et Algeria, ex exemplis authenticatis exsiccatis non potui distinguere.*
14. M. *NEGLECTUM*, Gussone, *Fl. Sic.* i. 411; *Gren. Fl. France*, iii. 218; *Bureau, Fl. Cent.* 3rd edit. ii. 621.—*Botryanthus neglectus, Kunth, Enum. iv. 679; Parl. Fl. Ital. ii. 502.* Folia plura, carnosso-herbacea,

9–12 poll. longa, lineari-filiformia, profunde canaliculata, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. crassa. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus dense 30–40-florus, expansus $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longus, 9–10 lin. latus. Pedicelli 1– $1\frac{1}{2}$ lin. longi, inferiores cernui. Flores odori. Perianthium saturate cæruleum, $2\frac{1}{2}$ –3 lin. longum, obovideo-tubuloso-urceolatum, leviter sulcatum, dentibus albidis deltoideis reflexis. Flores abortivi pauci, breviter petiolati. Capsula 4 lin. longa et paulo latior. *Gallia, Germania, Italia.* Vix aliud quam var. major præcedentis.

15. **M. COMMUTATUM**, Guss. *Prodr. Fl. Sic.* i. 426; Sweet, *Flow. Gard.* ser. ii. t. 369.—*Hyacinthus commutatus*, Ten. *Syll.* 176.—*Botryanthus commutatus*, Kunth, *Enum.* iv. 311; *Parl. Fl. Ital.* ii. 503. Folia 5–6, carnosæ-herbacea, anguste linearia, canaliculata, flaccida, viridia, 5–6 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. lata. Scapus 4–6-pollicaris. Racemus dense 12–20-florus, expansus 9–12 lin. longus, 6–7 lin. latus. Pedicelli infimi 1 lin. longi, deflexi. Flores subinodori. Perianthium saturate cæruleum, $2\frac{1}{2}$ lin. longum, tubuloso-turbinato-urceolatum, sursum distincte sulcatum, dentibus brevissimis vix recurvatis. Flores abortivi subnulli. *Hispania*, Lange! *Italia*, Tenore! *Sicilia*, Jan! Parlatore! *Tineo*! *Græcia*, Zuccarini! Von Heldreich! Palestina, Roth! Armenia, Huet du Pavillon! (albiflora ut “M. Aucheri”). *In montibus KassanOghlu*, Kotschy, “Iter Cilicico-Kurdicum,” 73! (“M. Strangwaisii”.)—M. Lafarinie, *Tineo in Huet. du Pavillon, Pl. Sicil. Exsic.*, vix differt.—*Botryanthus albo-virens*, Todaro, *Ann. Sc. Nat. ser. iv. xx. 304*, est verisimiliter forma albiflora.
16. **M. GRANDIFOLIUM**, Baker in *Saund. Ref. Bot.* t. 173. Folia 5–6, carnosæ-herbacea, glaucescentia, 15–18 poll. longa, 5–6 lin. lata, lineari-lorata, flaccida. Scapus 5–6-pollicaris. Racemus dense 15–20-florus, expansus 15–18 lin. longus, 7–8 lin. latus. Pedicelli infimi cernui, 1– $1\frac{1}{2}$ lin. longi. Perianthium oblongo-urceolatum, livide cæruleum, haud sulcatum, 3 lin. longum, 2 lin. crassum, segmentis deltoideis albidis reflexis. Flores superiores pauci, subsessiles, abortivi. Capsula 4 lin. longa. *Patria ignota*: v. v. in *Hort. Kew.*
17. **M. BOTRYOIDES**, Mill. *Dict.* No. 1; Red. *Lil.* t. 361; Sweet, *Flow. Gard.* t. 15.—*Hyacinthus botryoides*, Linn. *Sp.* 455; *Bot. Mag.* t. 157.—*Botryanthus vulgaris*, Kunth, *Enum.* iv. 311; *Parl. Fl. Ital.* ii. 499.—*M. transilvanicum*, Schur, *Transyl.* 676. Folia 3–4, carnosæ-herbacea, lineari-lorata, flaccida, subglauca, 6–12 poll. longa, 3–4 lin. lata, planiuscula, deorsum angustata. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus dense 12–20-florus, expansus 12–18 lin. longus, 6 lin. latus. Pedicelli infimi deflexi, 1 lin. longi, floribus cernuis. Perianthium globoso- vel oblongo-urceolatum, 1– $1\frac{1}{2}$ lin. longum, pallide cæruleum, haud sulcatum, inodorum. Flores abortivi 6–9, sessiles vel breviter pedicellati. Capsula globosa, 3–4 lin. longa. *A Lusitania et Sicilia ad Bosniam et Germaniam et Galliam septentrionalem.*

- Var. β . LELIEVRII, Baker.**—M. Lelievrii, *Bureau, Flor. Cent.* edit. 3, ii. 621; *Gren. Fl. France*, iii. 219. Racemus densior, expansus 7–8 lin. latus. Perianthium crassior, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longum. Pedicelli inferiores minus deflexi. Floratio præcocior (ad finem Februarii in loco natali). *Gallia occidentalis*, Bureau!
- 18. M. AUCHERI, Baker.**—*Botryanthus Aucheri, Boiss. Diagn.* v. 63. Folia 2, carnosso-herbacea, linearis-lingulata, 2–3 poll. longa, sursum 2–3 lin. lata, dimidio inferiore sensim angustata. Scapus gracilis, 2–4-pollicaris. Flores 6–10, dense subspicati, inferiores brevissime pedicellati. Perianthium turbinato-urceolatum, vix 1 lin. longum. *Asia Minor*, Nikisar, Aucher Eloy, 5399!
- 19. M. PALLENS, Fisch. Cat. Gorenk.** 1812, 9; *Sweet, Flow. Gard.* t. 259; *Steenen, Taur.* 337, non *Besser*.—*Hyacinthus pallens, M. Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 283. Folia plura, filiformia, semiteretia, 6–8 poll. longa, 1 lin. lata, facie glauca, dorso rotundata, viridia. Scapus 3–5-pollicaris. Racemus dense 12–20-florus, expansus 8–10 lin. longus, 6–7 lin. latus. Pedicelli infimi vix 1 lin. longi. Perianthium oblongum, minus urceolatum quam in speciebus reliquis, album, 2 lin. longum, $1\frac{1}{2}$ lin. latum, dentibus lanceolato-deltoides recurvatis. Flores abortivi 3–4, subsessiles. *Caucasus et Iberia* (v. v. in *Hort. Kew.*).
- 20. M. PARVIFLORUM, Desf. Atl.** i. 309; *Guss. Prodr.* i. 427; *Bert. Fl. Ital.* iv. 167.—*Hyacinthus parviflorus, Pers. Syn.* i. 375.—*Botryanthus parviflorus, Kunth, Enum.* iv. 312. *Parl. Fl. Ital.* ii. 505.—*Muscari filifolium, Wahl. Isis*, xxi. fasc. x. 971. Folia 6–8, linearis-filiformia, flaccida, subteretia, 4–5 poll. longa, 1 lin. lata, basi angustata. Scapus filiformis, flexuosus, 4–8-pollicaris. Racemus laxe 6–12-florus, demum 9–15 lin. longus, 8–9 lin. latus. Pedicelli infimi fructiferi, patentes, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. longi. Perianthium pallide cœruleum, oblongo-vel ovoido-urceolatum, 1–2 lin. longum. Flores abortivi pauci, congesti, sessiles, decidui. *Ex Hispania*, Rambur! *Algeria et Sicilia*, Gussone! Tineo! Parlatores! *ad Ægyptum, teste Schweinfurth, et Syriam*, C. Martens! Hooker et Hanbury!
- 21. M. HELDREICHII, Boiss. Diagn.** ser. 2, iv. 109; *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 172.—M. hymenophorum, *Held. Herb. Norm. Græc.* 662. Folia 5–6, junciformia, erecto-falcata, viridia, semiteretia, 8–12 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. crassa. Scapus flexuosus, 4–6-pollicaris. Racemus subdense 8–12-florus, expansus 12–15 lin. longus, 10–12 lin. latus. Pedicelli infimi patentes, 1 lin. longi. Perianthium obovooideo-urceolatum, amethystinum, ore leviter constrictum, $2\frac{1}{2}$ –3 lin. longum, dentibus albis recurvatis. Flores abortivi, pauci, subsessiles. *Græcia, Parnassus*, Von Heldreich! (v. v. in *Hort. Kew.*).

20. *LITANTHUS*, *Harv.*

Harv. Hook. Journ. 1844, p. 315, t. 9; *Cape Gen.* 2 edit. 399.

Perianthium minutum, tubulosum, segmentis ovato-deltoides æqualibus erectis tubo cylindrico fundo demum ventricoso 6–8-plo brevioribus. *Stamina* ad faucem tubi uniseriata, filamentis brevissimis filiformibus, antheris sagittatis versatilibus. *Ovarium* ovoideum, sessile, leviter trisulcatum, ovlis in loculis pluribus; *stylus* rectus, filiformis, ad faucem attingens; *stigma* trisulcatum. *Capsula* ignota. *Herba bulbosa, perpusilla, foliis filiformibus synanthiis, scapo unifloro bracteis duabus oppositis medio affixa.*

1. *L. PUSILLUS*, *Harv. loc. cit.* Bulbus membranaceo-tunicatus, 2–3 lin. crassus. Folia 2–3, setacea, 6–12 lin. longa. Scapus filiformis, 9–18 lin. longus. *Perianthium* albo-viride, membranaceum, 2 lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. crassum. *Cap. B. Spei*, Drège, 8514a! Zeyher; *Kaffraria britannica in graminosis inundatis*, H. Bowker and Mrs. Barber, 767!

21. *DRIMIA*, *Jacq.*

Jacq. Ic. t. 373–377; *Endl. Gen.* 1125; *Salisb. Gen.* 37; *Baker in Saund. Ref. Bot.* iii. *App.* 2, non *Kunth* nec *Harvey*.—*Idothea*, *Kunth*, *Enum.* iv. 341; *Harv. Cap. Gen.* 2nd edit. 397.

Perianthium companulato-gamophyllum, segmentis ligulatis culiculatis æqualibus mox irregulariter reflexis tubo 2–3-plo excedentibus. *Stamina* ex fauce tubi subuniseriata, filamentis elongatis, deorsum complanatis, segmentis subæquantibus, interdum leviter declinatis, antheris oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, ovoideum, ovlis in loculis pluribus (6–20); *stylus* filiformis, interdum leviter declinatus; *stigma* capitatum. *Capsula* sessilis, ovoidea, membranacea, profunde trisulcata, loculicide trivalvis, seminibus in loculis paucis vel pluribus discoideis uniseriatis. *Testa nigra*. *Herba bulbosa, floribus numerosis racemosis, foliis synanthiis vel hysteranthiis.*

Species capenses, foliis synanthiis.

Folia dura, angustissima.

Bractæ 1–1½ lin. longæ 1. *media*.

Bractæ 3–4 lin. longæ 2. *rigidifolia*.

Folia lorata carnosò-herbacea.

Racemus 9–12 lin. latus; pedicelli 2–3 lin. longi.

3. *Burchellii*.

Racemus $2\frac{1}{2}$ poll. latus; pedicelli 6–8 lin. longi.

4. robusta.

Racemus 3 poll. latus; pedicelli 9–12 lin. longi.

5. altissima.

Species capenses, foliis hysteranthiis.

Folia dura angustissima 6. *purpurascens.*

Folia linearia ciliata, 3–4 lin. lata.

Pedicelli subpatentes, 3–4 lin. longi 7. *ciliaris.*

Pedicelli erecto-patentes, 1–1 $\frac{1}{2}$ lin. longi... 8. *pusilla.*

Folia lorato-lanceolata, 6–9 lin. lata.

Folia undique villosa 9. *villosa.*

Folia glabra.

Racemus 2 poll. latus 10. *elata.*

Racemus 3 poll. latus 11. *concolor.*

Species tropicales, foliis ignotis, verisimiliter hysteranthiis.

Perianthium 4–4 $\frac{1}{2}$ lin. longum, segmentis margine convolutis.

12. laxiflora.

Perianthium 2 lin. longum, segmentis lanceolato-spathulatis,
complanatis 13. *Barteri.*

1. D. *MEDIA*, *Jacq. Ic.* t. 375; *Willd. Sp.* ii. 166; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 596.—*Hyacinthus*, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 120.—*Idothea*, *Kunth, Enum.* iv. 342. Bulbus ovoideus, membranaceo-tunicatus, 18–24 lin. crassus. Folia plura, synanthia, dura, nervosa, pedalia vel ultra, subtriquetra, 1–1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine scabrida. Scapus gracilis, fragilis, 1 $\frac{1}{2}$ –2-pedalis. Racemus 20–60-florus, 2–5 poll. longus, expansus 16–18 lin. latus. Pedicelli erecto-patentes vel subpatentes, 3–5 lin. longi. Bracteæ lanceolatæ, pedicellis 3–4-plo breviores. Perianthium 6 lin. longum, segmentis tubum 3–4-plo excedentibus. *Cap. B. Spei*, Drège, 1496! Burchell, 4593! 8322! Zeyher, 4250! Harvey! &c.

2. D. *RIGIDIFOLIA*, *Baker.* Folia plura, synanthia, dura, nervosa, sesquipedalia, subtriquetra, deorsum 1 $\frac{1}{2}$ –2 lin. lata. Scapus ultra-pedalis. Racemus 4–6 poll. longus, modice densus, 30–40-florus, expansus 2 poll. latus. Pedicelli stricti, patentes, 5–6 lin. longi. Bracteæ lineari-acuminatæ, 3–4 lin. longæ. Perianthium 7–7 $\frac{1}{2}$ lin. longum, segmentis tubo 3–4-plo excedentibus. *Cap. B. Spei*, Harvey ex hort. Baronis Ludwigii! *Somerset*, Bowker, 225! Ad præcedentem affinis.

3. D. *BURCHELLII*, *Baker in Saund. Ref. Bot.* ii. App. 2. Folia 3–4, synanthia, carnosò-herbacea, lorato-lanceolata, in exemplis nostris 7–8 poll. longa, deorsum 12–14 lin. lata, acuta. Scapus 3–4 lin. crassus, pedalis vel ultra. Racemus 8–9 poll. longus, 9–12 lin.

latus, modice densus. Pedicelli erecto-patentes, 2–3 lin. longi, bracteis subæquantes. Perianthium 5–6 lin. longum, segmentis tubo 3–4-plo excedentibus. Capsula 4½ lin. longa, seminibus in loculo circiter 3. *Cap. B. Spei*, Burchell, 4769! Zeyher, 954!

4. D. ROBUSTA, *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 190. Bulbus ovoideus, 3–4 poll. crassus. Folia 6–8, synanthia, carnosæ-herbacea, viridia, lorata, 2 pedes longa, 2 poll. lata. Scapus firmus, tripedalis, deorsum 8–9 lin. crassus. Racemus modice densus, 8–12 poll. longus, expansus 2½ poll. latus. Pedicelli 6–8 lin. longi, subpatentes, pedicellis linearibus subæquantes. Perianthium 7–8 lin. longum, segmentis tubum 3–4-plo superantibus. Stamina distincte declinata, segmentis paulo breviora. *Cap. B. Spei*, v. v. in *Hort. Saundersii*.
5. D. ALTISSIMA, *Hook. Bot. Mag.* 5522, non *Gawl. Bot. Mag.* 1074, quæ est Urginea species. Bulbus ovoideus, 3–4 poll. crassus, triente superiore emerso squamoso. Folia 8–10, synanthia, carnosæ-herbacea, lorata, 12–18 poll. longa, 18–24 lin. lata, acuta, subglauca. Scapus firmus, 3–4-pedalis. Racemus modice densus, 8–12 poll. longus, expansus 3 poll. latus. Pedicelli 9–12 lin. longi, subpatentes vel leviter deflexi. Bractæ lineares, pedicellis subæquantes. Perianthium 9–10 lin. longum, laciiniis tubum quadruplo superantibus. Stamina distincte declinata, 4–4½ lin. longa. *Cap. B. Spei*, v. s. ex *hort. Saundersii*.
6. D. PURPURASCENS, *Jacq. fil. Eclog.* t. 30; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 598.—*Idothea purpurascens*, *Kunth, Enum.* iv. 342. Bulbus tunicatus. Folia 9–10, hysteranthia (post racemum productæ) anguste linearia, semipedalia, 2 lin. lata, glaucescentia, subscarioisa. Scapus subpedalis. Racemus circiter 30-florus. Pedicelli patentes, perianthiæ æquantes, bracteis linear-i-lanceolatis duplo longiores. *Cap. B. Spei* (non vidi).
7. D. CILIARIS, *Jacq. Ic.* t. 377; *Willd. Sp.* ii. 165; *Bot. Mag.* t. 1444.—*Hyacinthus*, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 120.—*Idothea*, *Kunth, Enum.* iv. 343. Bulbus globosus, 2–3 poll. crassus, dimidio superiore emerso squamoso. Folia post scapum, 4–5, linearia, ciliata, 6–8 poll. longa, 3–4 lin. lata, pruinata. Scapus sesquipedalis. Racemus laxè 20–25-florus, 8–10 poll. longus, expansus 2 poll. latus. Pedicelli subpatentes, 3–4 lin. longi. Bractæ minutæ, lanceolatæ. Perianthium 8–9 lin. longum, segmentis tubo triplo longioribus. *Cap. B. Spei*.
8. D. PUSILLA, *Jacq. Ic.* t. 374; *Willd. Sp.* ii. 165; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 598.—*Hyacinthus*, *Poir. Encyc. Suppl.* iii. 120.—*Idothea*, *Kunth, Enum.* iv. 344.—*I. humilis*, *Kunth, loc. cit.*? Bulbus subglobosus, sursum squamosus. Folia post scapum, 4–6, linearia, 3–4 poll. longa, 3–4 lin. lata, glauca, ciliata. Scapus 2–3-pollicaris.

Racemus 1-1½ poll. longus, expansus 1 poll. latus, 10-20-florus. Pedicelli erecto-patentes, 1-1½ lin. longi. Bracteæ deltoideoe, 1 lin. longæ. Perianthium 6-7 lin. longum, segmentis tubum triplo excedentibus. Stamina segmentis paulo breviora. *Cap. B. Spei*, Sir J. Banks !

Var. β . *SETOSA*, Baker. Perianthium 4-4½ lin. longum. Scapus setis albidis dense vestitus. Folia non vidi. *Cap. B. Spei*, Ecklon et Zeyher, Asphod. 28 !

9. D. *VILLOSA*, Lindl. Bot. Reg. t. 1346.—*Idothea villosa*, Kunth, Enum. iv. 343. Folia hysteranthia, post scapum, lorata, 6-8 poll. longa, 8-9 lin. lata, acuta, glauca, valde undulata, undique villosa. Racemus modice densus, 4-5 poll. longus, expansus 2 poll. latus. Pedicelli floriferi patentes, 6-7 lin. longi. Bracteæ linear-lanceolatae, 2-3 lin. longæ. Perianthium 7-8 lin. longum, segmentis tubo 3-4-plo longioribus. Stamina distincte declinata. *Cap. B. Spei* (*non vidi*).

10. D. *ELATA*, Jacq. Ic. t. 373; Willd. Sp. ii. 165; Red. Lil. t. 430; Bot. Mag. t. 822.—*Hyacinthus*, Poir. Encyc. Suppl. iii. 120.—*Idothea elata*, Kunth, Enum. iv. 343. Bulbus subrotundus, magnitudine pugni, squamosus. Folia hysteranthia (post scapum) linear-lanceolata, glabra, pedalia vel ultra, 6-9 lin. lata. Scapus 1½-2-pedalis. Racemus modice densus, 30-100-florus, 6-12 poll. longus, 2 poll. latus. Pedicelli ascendentes, 5-6 lin. longi. Bracteæ lineares 3-4 lin. longi. Perianthium 7-8 lin. longum, segmentis tubo 3-4-plo longioribus. Stamina leviter declinata. *Cap. B. Spei*, Sir J. Banks! Zeyher, 1713! Burke! Natal, Sanderson, 464 !

Var. β . *COOPERI*, Baker. Folia ignota. Scapus tripedalis. Flores racemi multo pauciores et laxiores, pedicellis erecto-patentibus inferioribus 12-15 lin. longis. Perianthium 6 lin. longum. *Kaffraria britannica*, Cooper, 387 ! Verisimiliter species distincta.

11. D. *CONCOLOR*, Baker. Bulbus 3 poll. crassus, sursum squamosus. Folia post scapum, anguste lanceolata, glabra, acuta (*in statu juniore solum vidi*). Scapus 2½-pedalis. Racemus modice densus, 18 poll. longus, expansus 3 poll. crassus. Pedicelli floriferi subpatentes, 4-6 lin. longi, bracteis linearibus subæquantes. Perianthium viride, 8-9 lin. longum, segmentis tubo 2-3-plo longioribus. Stamina declinata. *Cap. B. Spei* (*e tab. ex exemplo in Hort. Kew. anno 1823 culto depicta descripta*).

12. D. *LAXIFLORA*, Baker. Folia non vidi. Scapus 15-18-pollicaris, gracilis. Racemus 6-8 poll. longus, 15-18 lin. latus (*deorsum laxissime*), 10-15-florus. Pedicelli ascendentes, infimi 5-6 lin. longi. Bracteæ minutæ, lineares. Perianthium 4-4½ lin. longum, segmentis

tubum 2-3-plo excedentibus. Filamenta 2½ lin. longa, cum stylo leviter declinata. *Zambesi-land prope Quillimane*, Dr. Kirk!

13. D. BARTERI, Baker. Folia non vidi. Scapus 15-18-pollicaris, gracilis. Racemus laxus, ultra 2 pedes longus, 18-21 lin. latus. Pedicelli stricti, horizontales, 6-8 lin. longi. Bracteæ perminutæ, deltoidæ. Perianthium tubuloso-campanulatum, segmentis erectis lanceolato-spathulatis tubum duplo excedentibus. Filamenta complanata, segmentis subdupo breviora. Capsula 5 lin. lata, 3 lin. longa, seminibus in loculo 8-9. *Guinea*; *in ditione nigritana prope Nupe*, Barter, 1183! Ab speciebus reliquis recedit floribus multo minoribus, segmentis complanatis, staminibus segmentis duplo brevioribus.

22. HYACINTHUS, Linn.

Linn. Gen. 1427, ex parte; Endl. Gen. 1120; Kunth, Enum. iv. 303.—Bellevallia, Lapeyr. Journ. Phys. 67, 425, t. 1; Endl. Gen. 1119; Kunth, Enum. iv. 306.—Peribœa, Kunth, Enum. iv. 293; Harv. Cap. Gen. 2nd edit. 394.—Strangweia, Bertol. Mem. Soc. Ital. t. xxi.—Foxia, Parlat. Nuov. Gen. 18.—Busbequia, Salisb. Gen. 25.—Hyacinthella, Schur, Oest. bot. Wochenschr. 1856, 227.

Perianthium tubuloso-gamophyllum, ore nullo modo constrictum, segmentis lanceolatis complanatis falcatis vel subrectis tubo aquantibus vel brevioribus. *Stamina* uniseriata vel plus minus distincte biseriata, in tubo vel ad faucem inserta, filamentis plerisque filiformibus raro cuneatis, antheris oblongis vel linearibus versatilibus. *Ovarium* sessile, ovoideum, ovulis in loculis paucis vel pluribus; *stylus* erectus, filiformis; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, loculicide trivalvis, sessilis, oblonga vel rotundata, obtuse vel acute trigona, seminibus rotundatis vel triquetris numerosis vel paucis. *Testa* nigra. *Herbae* bulbosæ, bulbis semper membranaceo-tunicatis, foliis semper synanthiis, floribus racemosis vel subspicatis, bracteis sæpissime minutis.

§ EUHYACINTHUS. *Segmenta tubo subæquantia, vel excedentia, flore expanso falcata vel suberecta. Capsula magna, obtuse trigona, seminibus in loculo 6-30. Stamina insertione varia.*

Elatæ, foliis loratis bipedalibus.

Segmenta erecto-patentia, tubo duplo longiora, filamentis longiora 1. *candidans*.

Segmenta patula, tubo subæquantia, filamentis breviora.

2. *princeps*.

- Mediocris, foliis 8–12 poll. longis, 4–6 lin. latis, segmentis limbi patentibus 3. *orientalis*.
 Parvæ, foliis 2–4 poll. longis, 1 lin. latis, segmentis limbi erecto-patentibus.
 Racemus confertus, pedicellis erecto-patentibus.
 4. *corymbosus*.
 Racemus laxus, pedicellis cernuis 5. *brevifolius*.
 § HYACINTHELLA (Schur., extens.). Segmenta tubo 2–3-plo breviora, flore expanso suberecta. Loculi ovarii 2–4-ovulati. Capsula parva, obtuse trigona. Stamina in tubo inserta.
 Stamina subsessilia.
 Bractæ 4–6 lin. longæ. Perianthium 4–5 lin. longum, segmentis ovatis 6. *amethystinus*.
 Bractæ minutissimæ. Perianthium 2–2½ lin. longum, segmentis lanceolatis cucullatis 7. *ledebourioides*.
 Filamenta distincte obvia.
 Stamina prope basin tubi inserta 8. *azureus*.
 Stamina prope medium tubi biseriata 9. *pseudo-muscari*.
 Stamina supra medium tubi subuniseriata.
 Folia coriacea, 1½–2 lin. lata, lineato-nervosa.
 10. *leucophæus*.
 Folia coriaceo-herbacea, 2–3 lin. lata, vix lineato-nervosa.
 11. *dalmaticus*.
 § STRANGWEIA (Parlat.). Segmenta tubum paulo excedentia, flore expanso falcata. Stamina ex fauce tubi, uniseriata, filamentis brevibus cuneatis bifidis, basi breviter connatis. Semina in loculo 5–6.
 Species sola 12. *spicatus*.
 § BELLEVALLIA (Lapeyr.). Segmenta tubo sæpiissime 2–3-plo breviora, raro subæquantia, flore expanso suberecta, filamentis brevibus ex fauce uniseriatis. Loculi 2–4-ovulati. Capsula parva, globosa, obtuse trigona, vel major acute trigona. Semina in loculo 1–2.
 Folia rigide coriacea, venis primariis distincte exsculptis.
 Flores spicati 13. *sessiliflorus*.
 Flores racemosi.
 Folia margine primum minute ciliata .. 14. *lineatus*.
 Folia margine diutine distincte ciliata. 15. *hispidus*.
 Folia carnosæ-herbacea, filiformia, subteretia. 16. *fastigiatus*.
 Folia carnosæ-herbacea, planiuscula, linearia vel lorata.

- Pedicelli infimi capsulis subæquantes vel breviores.
- Minores ; perianthium 1-2½ lin. longum.
- Flores dense spicati 17. *micranthus*.
 - Flores dense subspicati 18. *nivalis*.
 - Flores laxe racemosi 19. *pycnanthus*.
- Majores ; perianthium 4-7 lin. longum.
- Segmenta tubo subæquantia 20. *romanus*.
 - Segmenta tubo 2-4-plo breviora.
 - Perianthium 6-7 lin. longum.
 - Racemus laxus ; segmenta tubo 3-4-plo breviora.
 - 21. *trifoliatus*. - Racemus densus ; segmenta tubo duplo breviora.
 - 22. *Aucherii*.
- Perianthium 3½-5 lin. longum.
- Folia 2-3 lin. lata ; racemus expansus densus.
 - 23. *densiflorus*. - Folia 3-6 lin. lata ; racemus expansus laxus.
 - Folia margine ciliata ; perianthium viridescentia.
 - 24. *paradoxus*. - Folia margine glabra ; perianthium livide caruleum.
 - 25. *dubius*.
- Pedicelli infimi stricti, capsulis 3-8-plo excedentes.
- Pedicelli infimi demum 3-4 poll. longi ; folia margine ciliata.
 - Perianthium 4½-5 lin. longum 26. *ciliatus*.
 - Perianthium 2½-3 lin. longum 27. *Pallasianus*. - Pedicelli infimi demum 9-18 lin. longi ; folia margine haud ciliata.
 - Folia glauca ; pedicelli demum 15-18 lin. longi.
 - 28. *glaucus*. - Folia viridia ; pedicelli demum 9 lin. longi. 29. *macrobotrys*.
1. H. CANDICANS, *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 174. Folia 4-5, lorata, carnosò-herbacea, planiuscula, glaucescentia, 2-2½ pedes longa, 18-21 lin. lata. Scapus firmus, 3-3½-pedalis. Racemus subpedalis, 12-20-florus, deorsum 5-6 poll. latus. Pedicelli cernui, infimi 15-18 lin. longi. Bracteæ lanceolatæ, 12-18 lin. longæ. Perianthium album, 18 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis flore expanso erecto-patentibus tubo duplo longioribus. Stamina prope faucem tubi subuniseriata, filamentis 5-6 lin. longis. Capsula oblonga, sessilis, obtuse angulata, seminibus confertis triquetris. Cap. B. Spei, Drège, 3529 ! Natalia, ad fontem fluv. Fugela, In ditione Zulu, Gerrard et M^cKen, 2146 ! v. v. in hort. Saundersonii.

2. *H. PRINCEPS*, *Baker in Saund. Ref. Bot.* t. 175. Folia 4–6, lorate, carnosο-herbacea, planiuscula, viridia, 2 pedes longa, 15–18 lin. lata. Racemus 12–18-florus, 6–8 poll. longus, 5–6 poll. latus. Pedicelli erecto-patentes, infimi 1½–2 poll. longi. Bracteæ lanceolatæ, 12–15 lin. longæ. Perianthium album, fundo extrorsum viride, 14–15 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis, flore expanso subpatulis tubo subæquantibus, interioribus brevioribus, latioribus, obtusioribus. Stamina prope basin tubi leviter biseriata, filamentis 8–9 lin. longis, basi cuneatis. Capsula oblonga, substipitata, obtuse angulata. *Kaffraria, in locis inundatis*, Mrs. Barber, 884!
3. *H. ORIENTALIS*, *L. Sp.* 454; *Willd. Sp.* ii. 167; *Bot. Mag.* t. 937; *Bot. Reg.* t. 995; *Red. Lil.* t. 465; *Kunth, Enum.* iv. 303. Folia 4–6, carnosο-herbacea, viridia, 8–12 poll. longa, 4–6 lin. lata. Scapus 5–8-pollicaris. Racemus 6–12-florus, 3–4 poll. longus, expansus 2 poll. latus. Pedicelli floriferi cernui, 1–3 lin. longi. Bracteæ minutæ, deltoideæ. Perianthium 10–12 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis 2 lin. latis, flore expanso subpatentibus tubo infundibuliformi demum ventricoso paulo brevioribus. Stamina infra medium tubi, uniseriata, filamentis vix 1 lin. longis. Capsula depresso-globosa, obtuse trigona, seminibus in loculo 8–12. *Oriens; Syria, Libanus, Gaillardot!* Miss Osborne! *Asia Minor*, Kotschy, &c. *Grecia, Barbaria, Dalmatia*.
- Var. β . *PROVINCIALIS*, *Baker*.—*H. provincialis*, *Jord. Pug.* 39; *Icones*, t. 219.—*H. orientalis*, *Reich. Ic.* t. 1005, et *auct. multi*. Gracilior, foliis viridiорibus magis canaliculatis, floribus laxioribus paucioribus paulo minoribus, tubo demum ventricoso, segmentis ligulatis 1½ lin. latis. *Gallia meridionalis, Helvetia, Italia*.
- Var. γ . *ALBULUS*, *Baker*.—*H. albulus*, *Jord. Pug.* 140; *Icones*, t. 217; *Gren. Fl. France*, iii. 216. Gracilior, foliis erectioribus, floribus paucioribus albidis, tubo cylindrico haud ventricoso, segmentis oblongis. *Gallia meridionalis*, *Jordan*.—*H. præcox*, *Jord. Pug.* 141; *Icones*, t. 216, *H. modestus*, *Jord. et Four. Icones*, t. 218, et *H. rigidulus*, *Jord. et Four. Icones*, t. 220, sunt etiam varietates hujus speciei in sensu latiore.
4. *H. CORYMBOSUS*, *Linn. Mant.* 223; *Thunb. Fl. Cap.* 325; *Jacq. Coll.* iii. 230, t. 19. fig. 2; *Andr. Rep.* t. 345.—*Scilla corymbosa*, *Bot. Mag.* t. 1885.—*Massonia corymbosa*, *Bot. Mag.* t. 991.—*Pे-ribœa corymbosa*, *Kunth, Enum.* iv. 293. Folia 5–6, carnosο-herbacea, semiteretia, 2–4 poll. longa, 1 lin. lata, pallide viridia. Scapus 2–3-pollicaris. Racemus confertus, 4–9-florus, pedicellis erecto-patentibus, infimis 2–6 lin. longis. Bracteæ perminutæ, deltoideæ. Perianthium lilacino-roseum, 6–7 lin. longum, segmentis erecto-patentibus ligulatis tubo subæquantibus. Stamina distincte bise-riata, superiora e fauce, inferiora e medio tubi, filamentis filiformibus

$\frac{1}{2}$ lin. longis. Ovarium sessile, obtuse trigonum, loculis 6–8 ovulatis. Cap. B. Spei, Masson! Nelson! Drège! Ecklon, 111! Zeyher, 1715! &c.

5. H. **BREVIFOLIUS**, Thunb. *Prodr.* 63; *Flor. Cap.* 325.—*Scilla brevifolia* et *brachiphylla*, Roem. et Schult. *Syst.* vii. 574.—S. brevifolia, Gawl. *Bot. Mag.* t. 1468.—*Periboea* Gawleri et brevifolia, Kunth, *Enum.* iv. 293–94. Folia 4–5, carnosο-herbacea, semiteretia, 2–3 poll. longa, 1 lin. lata. Scapus folia superans. Racemus laxus, subsecundus, 6–8-florus, 1½–2 poll. longus. Pedicelli cernui, infimi 5–6 lin. longi. Bracteæ perminutæ. Perianthium 6–7 lin. longum, segmentis ligulatis erecto-patentibus tubum paulo superantibus. Stamina prope faucem tubi leviter biseriata, filamentis filiformibus antheras 4–6-plo excedentibus. Cap. B. Spei (*non vidi*).
6. H. **AMETHYSTINUS**, L. *Sp.* 454; Willd. *Sp.* ii. 167; *Red. Lil.* t. 14; Sweet, *Flow. Gard.* t. 135; *Bot. Reg.* t. 398; *Bot. Mag.* t. 2425; Kunth, *Enum.* iv. 304.—*Brimeura amethystina*, Salisb. *Gen.* 26.—H. hispanicus, Lam. *Encyc.* iii. 191. Folia 6–8, erecta, carnosο-herbacea, viridia, anguste linearia, 4–8 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapus 4–12-pollicaris. Racemus laxe 4–12-florus, expansus, 1–3 poll. longus, 12–15 lin. latus. Pedicelli floriferi erecto-patentes, apice cernui, infimi 3–6 lin. longi. Bracteæ lineares, violaceæ, 4–6 lin. longi. Perianthium saturate azureum, 4½–5 lin. longum, segmentis ovatis suberectis tubo ore 1–1½ lin. crasso triplo brevioribus. Antheræ prope medium tubi biseriatim subsessiles. Ovarium sessile, loculis 3–4-ovulatis. Capsula globosa, sessilis, 3–4 lin. longa et lata. *Hispania*, *Gallia meridionalis*, *Croatia*, *Bosnia*.
7. H. **LEDEBOURIOIDES**, Baker. Folia 3–4, carnosο-herbacea, lámina linear-lanceolata 3–6 lin. lata, 12–18 lin. longa, in petiolum subæquilongum angustata. Scapus gracillimus, 2–3 poll. longus. Racemus laxus, 12–20-florus, 12–18 lin. longus, 6–8 lin. latus. Pedicelli 1 lin. longi, floriferi ascendentæ. Bracteæ minutissimæ, deltoideæ. Perianthium 2–2½ lin. longum, albidum, membranaceum, segmentis lanceolatis cucullatis erecto-patentibus tubo anguste infundibuliformi subduplo brevioribus. Stamina supra medium tubi, distincte biseriata, subsessilia. Capsula sessilis, depresso-globosa, profunde obtuse trisulcata, vix 1 lin. longa, seminibus in loculo solitariis. *Africa austro-tropicalis orientalis*, *in ditione fluv. Zambezi*, Dr. Meller! Dr. Kirk! Ab speciebus reliquis recedit segmentis limbi, more *Drimiæ*, cucullatis.
8. H. **AZUREUS**, Baker.—*Muscaria azureum*, Fenzl, *Delect. Sem. Vind.* 1858, *Tchih. As. Minor*, *Bot.* ii. 539. Folia 2–5, carnosο-herbacea, incurvo-patula, late linearia, navicularia, triente superiore sensim oblongo-dilatata, apice obtusissima, callose subfornicata. Scapus digi-

- talis vel subpalmaris. Racemus densus, 4–12 lin. longus. Pedicelli sub anthesi cernui, fructiferi erecti. Perianthium campanulatum, azureum, fauce ampliatum, segmentis late ovatis porrectis concoloribus tubo dimidio brevioribus. Stamina prope basin perianthii inserta, dimidio tubi vix longiora. *Cilicia*, Kotschy.—*Leucophæo* af-finis, teste Tchih. loc. cit.
9. H. PSEUDO-MUSCARI, Baker.—*Bellevallia pseudo-muscari*, Bois. *Diag. ser. ii. iv.* 110. Folia linearia, canaliculata, scapo longiora. Racemus densus, ovatus. Pedicelli cernui, floribus dimidio breviores. Perianthium cœruleum, campanulatum, apice haud constrictum, segmentis ovato-oblongis tubo subtriplo brevioribus. Stamina prope medium tubi biserratim inserta, filamentis antheris subæquantibus. Capsula globosa, apice retusa. Habitu et magnitudine florum ad *Muscari neglectum* accedit. *Persia*, Buhse, teste Boissier (non vidi).
10. H. LEUCOPHÆUS, Steven in *Led. Ross.* iv. 156; Reich. *Ic. Crit.* iv. p. 27, t. 511.—*Muscari leucophæum*, C. Koch, *Linnæa*, xxii. 254; Steven, *Taur.* 337.—*Hyacinthella leucophæa*, Schur, *Oest. bot. Wochenschr.* 1856, p. 227.—*Botryanthus stereophyllus*, Herbich, *Oest. bot. Wochenschr.* 1855, p. 152; Walp. *Ann. vi.* 113.—*Muscari pallens*, Besser, non aliorum. Folia 2, anguste linearia, basin scapi cingentia, 4–6 poll. longa, 1½–2 lin. lata, striato-nervosa, in dimidio inferiore angustata. Scapus gracilis, 4–6-pollicaris. Racemus subdense 20–30-florus, 9–24 lin. longus, 6–8 lin. latus. Pedicelli erecto-patentes, infimi 1–1½ lin. longi. Bractæ deltoideæ, perparvæ. Perianthium 1 lin. latum, 2 lin. longum, album vel pallide cœruleum, segmentis erectis tubo duplo brevioribus. Stamina supra medium tubi, subuniseriata, filamentis filiformibus antheris æquilongis. Capsula depresso-globosa, 1 lin. longa, profunde obtuse trisulcata. Semina in loculo 2. *Rossia meridionalis* (*Odessa*, *Podolia*, *Volvynia*), Besser, &c! *Georgia*, Pallas! *Transylvania*, teste Schur.
11. H. DALMATICUS, Baker.—H. pallens, Vis. *Fl. Dalm.* i. 150, non M. Bieb. Folia 2, carnosæ-coriacea, glabra, lineari-lanceolata, vix lineato-nervosa, 2–3 poll. longa, 2–3 lin. lata, falcata. Scapus erectus, gracilis, 2–3-pollicaris. Racemus subdense 12–18-florus, expansus 1 poll. longus, 6–7 lin. latus. Pedicelli erecto-patentes, infimi ½–1 lin. longi. Bractæ subobsoletæ. Perianthium pallide cœruleum, 2½ lin. longum, segmentis ovato-deltoides erectis tubo demum ventricoso 1½ lin. crasso triplo brevioribus. Stamina supra medium tubi, subuniseriata, filamentis filiformibus antheris æquilongis. Capsula immatura globosa, 1 lin. longa, loculis biovulatis. *Dalmatia in subalpinis*, Petter, Exsic. 338! sub nomine *Scille bifoliae*. Ad præcedentem arcte affinis.
12. H. SPICATUS, Smith, *Prodr. Fl. Græc.* 237; Lindl. *Bot. Reg.*

- t. 1869.—*Bellevallia spicata*, *Boiss. Diagn.* vii. 110.—*Foxia spicata*, *Parl. Nuov. Gen.* 18.—*Strangevia hyacinthoides*, *Bertol. Mem. Soc. Ital.* t. 21.—*Puschkinia ? dubia*, *Kunth, Enum.* iv. 338.—*Folia* 6–8, linearia, carnosæ-herbacea, 3–6 poll. longa, 2–3 lin. lata, basi angustata, subtiliter ciliata. Scapi 1–3-pollicares. Flores 6–12, dense subspicati. Bractæ medio affixa, lanceolatae vel deltoidæ, 1–1½ lin. longæ. Perianthium obscure cæruleum, 3–4 lin. longum, segmentis oblongis subacutis flore expanso falcatis tubum excedentibus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis deltoideis petaloideis bifidis basi breviter connatis antheris æquantibus haud ½ lin. longis. Capsula globosa, parva. Semina in loculo 5–6. *Græcia, Creta, Insulae Ionicæ.*
13. H. **SESSILIFLORUS**, *Viv. Fl. Libyc.* 21, t. 7. fig. 5.—*Bellevallia sessiliflora*, *Kunth, Enum.* iv. 311.—*Muscaria sessiliflorum*, *Spreng. Syst.* ii. 66.—H. *nervosus*, *Bert. Misc.* i. p. 2.—B. *aleppica*, *Boiss. Diagn.* ser. 2, iv. 11. Folia 2, basin scapi cingentia, coriacea, lanceolata, acuta, lineari-nervosa, 2–4 poll. longa, 3–5 lin. lata, margine minute ciliata. Scapus flexuosus, 2–6-pollicaris. Flores 6–20, dense spicati. Spica 6–21 lin. longa, expansa 6–8 lin. lata. Bractæ minutissimæ. Perianthium pallide cæruleum, 2½–3 lin. longum, segmentis erecto-patentibus lanceolatis tubo ore 1 lin. crasso triplo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis complanatis, ut antheris, vix ultra ½ lin. longis. Loculi biovulati.—*Libya*, *Viviani*; *Egyptus*, *Olivier*, teste *Kunth*; *Aleppo*, *Kotschy*, *Pl. Alep. Kurd.* 15 (*sub nom. Muscaria ciliati*)! *ad ripas fluv. Euphrate*, *prope Port William*, *Chesney*!
14. H. **LINEATUS**, *Steud. in Roem. et Schult. Syst.* vii. 584.—*Bellevallia lineata*, *Kunth, Enum.* iv. 309.—B. *Heldreichii*, *Boiss. Diagn.* ser. 2, iv. 111. Folia 2, raro 3, basin scapi cingentia, coriacea, lanceolata, acuta, falcata, lineato-nervosa, 3–4 poll. longa, 3–6 lin. lata, primum minute ciliata. Scapi 2–4-pollicares. Racemus 6–12-florus, expansus 1 poll. longus, 6–8 lin. latus. Pedicelli infimi erecto-patentes, 1–1½ lin. longi. Bractæ minutissimæ. Perianthium saturate violaceum, 1½–2 lin. longum, segmentis deltoideis erectis tubo 1 lin. crasso demum ventricoso 3–4-plo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis complanatis antheris subæquantibus. Loculi 2-ovulati.—*Smyrna*, *Fleischer* (*Unio Itin.* 1827, *sub nomine falso H. ciliati*)! *Adalia*, *Heldreich*! *Cappadocia*, *Montbret*! *Taurus*, *Aucher Eloy*, 2116!
15. H. **HISPIDUS**, *Baker*.—*Bellevallia hispida*, *J. Gay, Bull. Soc. Bot. France*, iii. 240, ex parte. Folia 2 vel 3, basin scapi 2–3 poll. arcte cingentia, parte libera lanceolata, 2–3 poll. longa, 3–7 lin. lata, coriacea, acuta, lineato-nervosa, margine conspicue ciliata, facie utrinque glabra, deorsum dorso subtiliter purpureo maculata. Scapi firmi,

erecti, 6–12 poll. longi, interdum geminati. Perianthium pallide cæruleum, 1–1½ lin. longum, segmentis tubo triplo brevioribus. Racemus 10–20-florus, fructiferus 1–2 poll. longus, deorsum 1 poll. latus pedicellis erecto-patentibus, infimis 3–4 lin. longis. Capsula globosa, 1 lin. longa, obtuse trigona. Semina in loculo 1–2. *Phrygia, prope Ouchak, Balansa!*

Var. β . *PLATYPHYLLUS*, Gay, Herb. Pars libera foliorum ovata, 2 poll. longa, medio 9–12 lin. lata, venis distincte exsculptis utrinque costam circiter 10. *Phrygia, ad montem Mourad-Dagh*, Balansa! Planta Cilicica Balansana sub No. 815 in Exsic. ejus, sub nomine Gayano *Scilla hispida* divulgata, est species alia, in statu fructifero tantum nota, ex vestigiis perianthii obviis verisimiliter ad *Scillam* referenda.

16. H. *FASTIGIATUS*, Bert. *Ann. Stor. Nat.* iv. 62; *Fl. Ital.* iv. 157; *Gren. et Godr. Fl. Franc.* iii. 217.—H. Pouzolzii, Gay in *Lois. Not.* 15; *Parl. Fl. Ital.* ii. 484.—*Scilla fastigata*, Viv. *App. Cors.* 1. Folia 2–3, carnosæ-herbacea, filiformia, subteretia, 3–4 poll. longa, 1 lin. lata, saepe inferne bulbifera. Scapus flaccidus, 1–2-pollicaris. Racemus dense subcorymbosus, 3–6-florus. Pedicelli erecto-patentes, infimi 3–6 lin. longi. Bractæ ovatæ, cuspidatæ, 2–3 lin. longæ. Perianthium lilacinum, 3½–4 lin. longum, segmentis oblongo-lanceolatis barbulatis tubo turbinato subæquantibus. Stamina e fauce, uniseriata, filamentis deorsum complanatis antheris æquilongis. Loculi 2–3-ovulati. *Corsica*, Pouzols! Kralik 802! Requier! Soleiro! &c. Habitum ad *Scillam vernam* arête accedit.
17. H. *MICRANTHUS*, Baker.—*Bellevallia micrantha*, Boiss. *Diagn.* v. 63. Folia 2, basin scapi longe cingentia, carnosæ-herbacea, glabra, falcata, linearia, 2–2½ poll. longa, 1–1½ lin. lata, obtusa. Scapus gracilis, 2–3 poll. longus. Flores 6–12, dense spicati. Spica 3–6 lin. longa, 2–3 lin. lata. Perianthium pallidum, 1 lin. longum, late infundibuliforme, segmentis deltoideis erectis tubo 4-plo brevioribus. Antheræ e fauce tubi, uniseriatae, subsessiles. *Asia Minor*, Aucher Eloy, 2115!
18. H. *NIVALIS*, Baker.—*Bellevallia nivalis*, Boiss. et Kotschy, *Diag.* ser. 2, iv. 110. Folia 3–4, carnosæ-coriacea, anguste linearia, 3–4 poll. longa, 2–3 lin. lata, margine glabra. Scapus 1½–2-pollicaris. Racemus subdense 8–12-florus, expansus vix 1 poll. longus. Pedicelli brevissimi, infimi vix ultra ½ lin. longi. Bractæ minutissimæ. Perianthium pallide cæruleum, 2½ lin. longum, segmentis lanceolatis tubo triplo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis brevibus complanatis. Capsula globosa, 1 lin. longa, obtuse trigona. *Syria prope Damascum*, Kotschy, *Iter Syriacum*, 1855, No. 58! *Cyprus*, Kotschy, 411.
19. H. *PYCNANTHUS*, Baker.—*Muscari pycnanthum*, C. Koch, *Linnæa*,

- xxii. 253; *Led. Fl. Ross.* iv. 154. Folia 2-3, carnosò-herbacea, linearia, 4-6 poll. longa, 4-6 lin. lata, utrinque angustata, margine glabra. Scapus gracilis, 4-6-pollicaris. Racemus 8-12-florus, expansus 1 poll. longus, 6-8 lin. latus. Pedicelli cœrulei, infimi $1\frac{1}{2}$ lin. longi, patentes vel cernui. Bractæ minutæ, lanceolatæ. Perianthium saturate diutine cœruleum, 2 lin. longum, segmentis deltoideis erectis tubo 3-4-plo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis antheris æquilongis. *Caucasus*, C. Koch. *Armenia*, Calvert 1366!
20. H. ROMANUS, *Linn. Mant.* 224; *Willd. Sp.* ii. 169; *Red. Lil.* t. 334; *Sibth. et Sm. Fl. Græc.* 340.—*Bellevallia romana*, *Reich. Fl. Germ.* 105; *Ic. t.* 1002; *Parl. Ital.* ii. 486; *Kunth, Enum.* iv. 307.—*Scilla romana*, *Gawl. Bot. Mag. t.* 939.—*Bellevallia appendiculata et operculata*, *Lap.* Folia 4-5, erecto-patentia, viridia, glabra, carnosò-herbacea, 12-18 poll. longa, 4-6 lin. lata, e medio utrinque sensim angustata. Scapus 6-12-pollicaris. Racemus 20-30-florus, expansus 2-3 poll. longus, 1-2 poll. latus. Pedicelli floriferi erecto-patentes, infimi 3-6 lin. longi. Bractæ parvæ, deltoidea. Perianthium album vel pallide cœruleum, 4-4½ lin. longum, segmentis lanceolatis subacutis tubo æquilongis. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis complanatis 1 lin. longis. Capsula globosa, 6 lin. longa et lata, obtuse trigona. Semina in loculo 1-2. *E Barbaria et Gallia meridionali ad Cyprum, Græciam, et Ægyptum.*
21. H. TRIFOLIATUS, *Ten. Neap.* iii. 376, t. 136.—*Bellevallia trifoliata*, *Kunth, Enum.* iv. 308; *Gren. et Godr. Fl. France*, iii. 217; *Parl. Fl. Ital.* ii. 492.—*H. abortivus*, *Cavalier, Notes*, 14, t. 1. fig. A. Folia 3, lorata, carnosò-herbacea, basin scapi cingentia, 1½-2 pedes longa, 6-9 lin. lata, margine minutissime ciliata. Scapus pedalis vel ultra. Racemus 10-30-florus, expansus 2-3 poll. longus, 16-18 lin. latus. Pedicelli floriferi infimi patentes vel cernui, 2-3 lin. longi. Bractæ parvæ, deltoidea. Perianthium 6-7 lin. longum, tubo infundibuliformi violaceo ore 1½-2 lin. crasso, segmentis oblongis obtusis viridibus tubo 3-4-plo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis complanatis 1 lin. longis. Capsula late elliptica, utrinque subtruncata. Semina in loculo 1-2. *Gallia meridionalis, Italia, Rhodus, Algeria, Græcia, Cyprus.*
22. H. AUCHERI, *Baker.* Folia 3, basin scapi cingentia, carnosò-co-riacea, linearia, 6-8 poll. longa, 4-6 lin. lata, margine glabra. Scapus firmus, 3-4-pollicaris. Racemus dense 20-25-florus, expansus 1½ poll. longus, 14-15 lin. latus. Pedicelli infimi floriferi cernui, 2½-3 lin. longi. Perianthium 6 lin. longum, segmentis ovato-lanceolatis suberectis tubo ore 2 lin. crasso duplo brevioribus. Bractæ minutæ, deltoidea. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis basi cuneatis anthers paulo excedentibus. *Persia, prope Ispahan*, Aucher Eloy, 5396!

23. *H. DENSIFLORUS*, *Baker*.—*Bellevallia densiflora*, *Boiss. Diagn.* vii. 109. *Folia* 2-3, linearia, carnosæ-herbacea, glabra, 5-6 poll. longa, 2-3 lin. lata. *Scapus* 3-4-pollicaris. *Racemus* dense 20-30-florus, expansus 15-18 lin. longus, 1 poll. latus. *Pedicelli* infimi floriferi 3-4 lin. longi. *Bractæ* minutæ, deltoideæ. *Perianthium* pallidum, 4½-5 lin. longum, segmentis lanceolatis tubo ore 1 lin. crasso triplo brevioribus. *Stamina* ex fauce, uniseriata, filamentis complanatis vix ultra ¼ lin. longus. *Syria orientalis*, *Aucher Eloy*, 2121 !
24. *H. PARADOXUS*, *Fisch. et Meyer*, *Ind. Sem.* i. 30 (*ex descriptione brevi*).—*Muscaria paradoxum et montanum*, *C. Koch*, *Linnæa*, xxii. 253; *Led. Fl. Ross.* iv. 153.—*Bellevallia flexuosa*, *Boiss. Diagn.* xiii. 36! *Folia* 3-4, basin scapi cingentia, carnosæ-herbacea, lorata, 6-12 poll. longa, 3-6 lin. lata, margine primum minute ciliata. *Scapus* firmus, 3-12-pollicaris. *Racemus* sublaxe 6-20-florus, expansus 1-3 poll. longus, 12-18 lin. latus. *Pedicelli* infimi patentes vel ascendentes 3-4 lin. longi. *Bractæ* minutæ, deltoideæ. *Perianthium* 4-4½ lin. longum, obscure coloratum, segmentis ovato-lanceolatis erectis tubo ore 1½ lin. crasso 2-3-plo brevioribus. *Stamina* ex fauce, uniseriata, filamentis antheris subæquilongis. *Capsula* subglobosa, 4-4½ lin. longa, acute angulata. *Semina* in loculo solitaria in exemplis nostris. *Syria*, *Blanche* 94! *Magdala*, *Lowne*! *Hierosolyma*, *Dr. Roth*! *Miss Osborne* 178! *Caucasus*, *C. Koch* (*an eadem? non vidi*).
- Var. β . *CONFERTUS*, *Baker*. *Scapi* 2-3 poll. longi. *Racemi* densiores, floribus superioribus sessilibus, inferioribus pedicellis erecto-patentibus vix ultra ½ lin. longis instructis. *In Palestina, prope Jericho, Lowne*!
25. *H. DUBIUS*, *Guss. Cat.* 1821, p. 32; *Prodr.* 424.—*Bellevallia dubia*, *Reich. Excurs.* i. 105; *Kunth*, *Enum.* iv. 308; *Parl. Fl. Ital.* ii. 488. *B. Gussoneana*, *Griseb. Fl. Rumel.* ii. 387.—*B. Webbiana*, *Parl. Nuov. Gen.* 19; *Fl. Ital.* ii. 489. *Folia* 3-5, anguste lorata, glaucescentia, carnosæ-herbacea, glabra, 9-15 poll. longa, 3-6 lin. lata, e medio utrinque angustata. *Scapus* 9-15-pollicaris. *Racemus* laxe 12-30-florus, expansus 2-3 poll. longus, 1 poll. latus. *Pedicelli* infimi floriferi patentes, 2-3 lin. longi, fructiferi erecto-patentes, 3-5 lin. longi. *Bractæ* minutæ, deltoideæ. *Perianthium* cæruleum, 3½-4 lin. longum, segmentis ovato-deltoideis tubo ore 1½ lin. crasso triplo brevioribus. *Stamina* ex fauce, uniseriata, filamentis deorsum complanatis antheris æquantibus. *Capsula* obovoidea, 4 lin. longa, acute trigona, semibus in loculo 1-2. *Italia*, *Webb*! *Sicilia*, *Parlatore*! *Huet de Pavilion*! *Gussone*! &c. *Creta*, *Zuccarini*! *Dalmatia*.
26. *H. CILIATUS*, *Cyrill. Neap.* ii. 22, t. 10; *M. Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 284; *Ten. Neap.* iii. 376, t. 135.—*Bellevallia ciliata*, *Nees*, *Gen.* iv. t. 8. fig. 4, 5, 22; *Kunth*, *Enum.* iv. 308; *Parl. Fl. Ital.* ii. 491.—

- Muscaria ciliatum*, *Gawl. Bot. Reg.* t. 394; *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 153.
 —*H. sarmanticus*, *Pallas, Nov. Act. Petr.* x. 309. Folia 4–6, lorata, carnosso-herbacea, 8–15 poll. longa, 6–12 lin. lata, margine primum distincte ciliata. Scapus firmus, 6–12-pollicaris vel ultra. Racemus laxe 30–60-florus, floriferus 4–8 poll. longus. Pedicelli floriferi flexuosi, infimi 1–3 poll. longi, fructiferi stricti, horizontaliter patentes, infimi 3–4 poll. longi. Bractæ minutæ, deltoideæ. Perianthium lividum, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longum, segmentis erectis ovato-lanceolatis tubo ore $1\frac{1}{2}$ lin. crasso triplo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis basi cuneatis 1 lin. longis. Capsula obovato-oblonga, 6 lin. longa. Semina in loculo 1–2. *Eæ Algeria, Bové! et Italia ad Tauriam, Iberiam, Kurdistan, Chesney, 88! 106! Brant! et Beloochistan, Stocks!*
27. *H. PALLASIANUS*, *Stev. Taur.* 337.—*H. amethystinus*, *Pallas, Iter.* iii. 589, *non Linnæus*.—*H. patentissimus*, *Pallas, MSS.* Folia 4–5, carnosso-herbacea, lorata, 6–9 poll. longa, 6–8 lin. lata, margine primum ciliata. Scapus 6–9-pollicaris. Racemus laxe 20–40-florus, floriferus 2–4 poll. longus. Pedicelli floriferi flexuosi, infimi 6–24 lin. longi, fructiferi stricti, subpatentes, infimi 3–4 poll. longi. Perianthium $2\frac{1}{2}$ –3 lin. longum, purpureo-lividum, segmentis deltoideis tubo ore 1 lin. crasso subduplo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis antheris subæquilongis. Capsula oblonga, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longa, acute trigona. Semina in loculo 1–2. *Odessa et Caucasus, Pallas!*
28. *H. GLAUCUS*, *Baker*.—*Muscaria glaucum*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1085; *Roem. et Schult. Syst.* vii. 1709.—*Bellevallia glauca*, *Kunth, Enum.* iv. 309.—*M. Wilhelmsii*, *Stev. Taur.* 336? Folia 5–6, carnosso-herbacea, glauca, linear-lorata, 6–12 poll. longa, 4–8 lin. lata, margine haud ciliata. Scapus firmus, 6–12-pollicaris. Racemus laxe 30–50-florus, floriferus 3–4 poll. longus. Pedicelli floriferi flexuosi, infimi 6–18 lin. longi, fructiferi stricti, subpatentes, infimi 15–18 lin. longi. Bractæ minutæ, deltoideæ. Perianthium 4 lin. longum, purpureo-viride, segmentis erectis ovato-lanceolatis tubo ore $1\frac{1}{2}$ lin. crasso 2–3-plo brevioribus. Stamina ex fauce, uniseriata, filamentis basi cuneatis antheris subæquilongis. Capsula ovoidea, 5–6 lin. longa, acute trigona. Semina in loculo 1–2. *Persia australis*, *Kotschy* 23! *Afghanistan*, *Griffith*, 5798! *Beloochistan, Stocks!*
29. *H. MACROBOTRYS*, *Baker*.—*Bellevallia macrobotrys*, *Boiss. Diagn.* xiii. 35. Folia lorata, viridia, scapo elato subæquilonga, margine primum minute serrulata. Racemus laxus fructiferus pedalis vel ultra. Pedicelli floriferi floribus æquilongi, fructiferi eis triplo longiores, tunc arcuato-patentes. Perianthium 3 lin. longum, cæruleum, demum lividum, segmentis tubo subtriplo brevioribus. Filamenta basi dilatata, antheris rubello-ferrugineis. *Palestina*, *Boissier (non vidi)*.

23. RHADAMANTHUS, *Salisb.*

Salisb. Gen. 37.—*Hyacinthi*, sp., *Linn.*

Perianthium campanulatum, segmentis ovatis obtusis æqualibus erectis tubo subæquantibus. *Stamina* ad medium tubi, subuni-seriata, inclusa, filamentis brevibus erectis deorsum complanatis, antheris lineari-oblongis adnatis superne foramine obtuse cuneato dehiscentibus. *Ovarium* ovoidem, sessile, leviter trisulcatum, ovulis in loculis 9–10; *stylus* brevis, rectus; *stigma* capitatum. *Capsula* membranacea, sessilis, ovoidea, loculicide trivalvis, seminibus discideis uniseriatis alatis 6–8 in loculo. *Testa nigra*. *Herba bulbosa*, *floribus laxè racemosis*, *foliis subteretibus hystanthis carnosò-herbaceis*.

1. R. CONVALLARIOIDES, *Salisb.* Gen. 37.—*Hyacinthus convallarioides*, *Linn.* Suppl. 204; *Thunb.* Fl. Cap. 326; *Jacq.* *Schoen.* t. 81; *Kunth*, *Enum.* iv. 305. Folia 9–10, 2½–3 poll. longa, lineari-subulata, facie canaliculata. Scapus ante folia productus, 3–6 poll. longus. Racemus 6–20-florus. Pedicelli 3–4 lin. longi. Bracteæ minutæ, deltoideæ. *Perianthium* 3–3½ lin. longum, albido, viridi-purpureo vittatum. Cap. B. Spei, Masson!

24. PUSCHKINIA, *Adams.*

Adams, Nov. Act. Petr. xiv. 164, t. B; Endl. Gen. 1135; *Kunth*, *Enum.* iv. 387; *Salisb.* Gen. 27.—*Adamsia*, Willd. Berl. Mag. ii. 16.

Perianthium rotatum, campanulato- vel infundibuliformi-gamophyllum, segmentis ligulatis æqualibus flore expanso horizontaliter patentibus tubo longioribus. *Corona* membranacea, ad faucem tubi imposita, profunde 6-fida, dentibus emarginatis vel integris. *Stamina* intra prope basin coronæ imposita, filamentis brevibus, antheris lineari-oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, oblongum, obtuse trigonum, ovulis in loculo 5–6; *stylus* filiformis, brevis; *stigma* capitatum. *Capsula* sessilis, membranacea, loculicide trivalvis, seminibus in loculo paucis, parvis, haud compressis. *Testa nigra*. *Herba parvæ bulbosæ foliis planiusculis geminatis synanthiis*, *floribus paucis laxè racemosis raro solitariis*.

Tubus campanulatus, segmentis 2–3-plo brevior.

1. *scilloides*.

Tubus infundibuliformis, segmentis paulo brevior.

2. *hyacinthoides*.

1. *P. SCILLOIDES*, Adams, *Nov. Acta Petrop.* xix. 164; *Bieb. Pl. Ross.* ii. t. 91; *Bot. Mag.* t. 2244. *Kunth, Enum.* iv. 338.—*Adamsia scilloides*, Willd. *Enum. Suppl.* 16.—*P. libanotica*, Zucc. *Kunth, Enum.* iv. 680. Folia 2, carnosæ-herbacea, linear-lorata, basin scapi longe cingentia, scapo subæquantia, viridia, 3–6 lin. lata. Scapus gracilis, 6–9-pollicaris. Racemus 1–6-florus. Pedicelli erecto-patentes, infimi 3–4 lin. longi. Perianthium 5–6 lin. longum, albido-cæruleum, segmentis obtusis $1\frac{1}{2}$ lin. latis, tubum campanulatum 2–3-plo excedentibus. Corona segmentis 3–4-plo brevior, dentibus integris vel emarginatis. *Caucasus*, Klustine! Hohenacker! Karabagh, Fischer! Szovitz! Armenia, Aucher Eloy, 5392! *Kurdistan*, Capt. Garden! *Libanus*, Erdl!
2. *P. HYACINTHOIDES*, Baker. Folia 2, carnosæ-herbacea, linear-lorata, basin scapi longe cingentia, scapum excedentia, 3–4 lin. lata. Scapus gracilis, 3–4-pollicaris. Racemi conferti, secundi, 4–6-flori, pedicellis infimis 1– $1\frac{1}{2}$ lin. longis. Perianthium album, 4 lin. longum, segmentis 1 lin. latis tubum infundibuliformem paulo excedentibus. Corona 1 lin. longa, dentibus truncatis emarginatis. *Kurdistan*, Oroomah, Capt. Garden!

25. CHIONODOXA, Boiss.

Boiss. Diagn. v. 61; *Jaub. et Spach, Ill.* t. 443.—*Hyacinthi sp.*
Auct.

Perianthium rotatum, campanulato- vel infundibuliformi-gamophyllum, segmentis ligulatis æqualibus flore expanso patentibus tubum 2–3-plo excedentibus. *Stamina* ad faucem tubi, uniseriata, filamentis cuneatis petaloideis, antheris linearibus bifidis versatilibus. *Ovarium* globosum, obtuse trigonum, ovulis in loculo pluribus; *stylus* subnnullus; *stigma* capitatum. *Capsula* sessilis, membranacea, loculicide trivalvis, seminibus in loculo paucis, parvis, haud compressis. *Testa nigra*. *Herbæ parvæ bulbosaæ foliis planiusculis geminatis, floribus paucis laxe racemosis vel sœpe solitariis.*

Scapi uni- vel raro biflori.

Filamenta æqualia.

Perianthium 5–6 lin. longum, segmentis tubum 2–3-plo excedentibus..... 1. *nana*.

Perianthium 7–8 lin. longum, segmentis tubum paulo excedentibus..... 2. *cretica*.

Filamenta alterna longiora et angustiora 3. *Lucilieæ*.

Scapi 1–4-flori 4. *Forbesii*.

1. *C. NANA*, Boiss. et Held. in Boiss. *Diagn.* xiii. 24.—*Hyacinthus nanus*, Roem. et Schult. *Syst.* vii. 581; *Kunth, Enum.* iv. 304.—*Puschkinia scilloides*, Sieber, *Crete*, ii. 319, t. 7, non Adams. Folia 3–4 poll. longa, 1– $1\frac{1}{2}$ lin. lata. Scapus filiformis, foliis subæquans,

uniflorus. Perianthium 5–6 lin. longum, segmentis 1 lin. latis tubum 2–3-plo excedentibus. Filimenta $\frac{3}{4}$ lin. longa, deorsum $\frac{1}{4}$ lin. lata. *Creta, in regione subalpina*, Von Heldreich !

2. C. CRETICA, Boiss. et Held. in Boiss. *Diagn.* xiii. 24; Jaub. et Spach, *Ill.* t. 433. Folia 6–9 vel demum 12 poll. longa, 3–6 lin. lata. Scapus gracilis, 6–10-pollicaris, uni- vel raro biflorus. Perianthium 7–8 lin. longum, segmentis ligulato-spathulatis $1\frac{1}{2}$ –2 lin. latis tubo infundibuliformi vix ultra 1 lin. crasso paulo longioribus. Filamenta 1 lin. longa, $\frac{3}{4}$ – $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Creta in regione subalpina*, Von Heldreich !
 3. C. LUCILIAE, Boiss. *Diagn.* v. 61. Folia 3–4 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. lata. Scapus gracilis, foliis subæquans, uni- vel raro biflorus. Perianthium 7–8 lin. longum, segmentis ligulato-spathulatis, $1\frac{1}{2}$ –2 lin. latis, tubo 2–3-plo longioribus. Filamenta inæqualia, alterna 1 $\frac{1}{2}$ lin. longa et $\frac{1}{2}$ lin. lata, et 1 lin. longa et $\frac{3}{4}$ lin. lata. *Asia Minor; Tmolus ad nives deliquescentes*, Boissier !
 4. C. FORBESII, Baker. Folia 6–8 poll. longa, 2–3 lin. lata. Scapus gracilis, foliis subæquans uni- vel sæpe laxe 2–4-flori. Pedicelli erecto-patentes, infimi 9–21 lin. longi. Perianthium 6 lin. longum, saturate cæruleum, segmentis $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{1}{2}$ lin. latis tubum turbinatum pallidum triplo excedentibus. Filamenta æqualia, oblongo-ligulata, 1 lin. longa. *Lycia*, Prof. E. Forbes 625 !
- Var. β . IDÆA, Baker. Perianthium albidum, vix ultra 4–5 lin. longum. Pedicelli breviores, infimi 6–9 lin. longi. *Creta, ad verticem montis Idæ*, Lieut. Spratt !

26. ODONTOSTEMUM, Torrey.

Torrey, Bot. Whipple, 94, t. 24.

Perianthium tubuloso-gamophyllum, segmentis æqualibus lanceolatis demum reflexis tubo subæquantibus. *Stamina* fertilia 6, ex fauce tubi, uniseriata, filamentis brevibus basi connatis cum staminodiis 6 linearibus alternantibus, antheris oblongis versatilibus. *Ovarium* sessile, globosum, obtuse trigonum, ovulis in loculo geminatis, collateralibus; *stylus* elongatus, filiformis; *stigma* stipitatum. *Capsula* sessilis, globosa, loculicide trivalvis, seminibus in loculo 1–2. *Herba* bulbosa, caule divaricatum ramoso deorsum foliato, foliis gramoideis, ramis floriferis racemosis.

1. O. HARTWEGII, Torrey, *loc. cit.*; Wood, *Proc. Acad. Phil.* 1867, p. 174. Folia anguste linearia, 6–9 poll. longa, 3–5 lin. lata, subcoriacea, acuta, persistentia. Caulis $1\frac{1}{2}$ –2-pedalis. Racemi laxe 10–30-flori, 3–6 poll. longi, 10–12 lin. lati. Bractæ lineares, inferiores 2–3 lin. longæ. Pedicelli stricti, erecto-patentes, 3–6 lin. longi. Perianthium albidum, 5–6 lin. longum. Stamina segmentis 6–8-plo breviora. *California*, Hartweg, 2008 ! Lobb 165 ! Whipple !