

Troodos;  
Lindberg

*Iter Cyprium*

- Erythræa pulchella* (Swartz) Fries \**ramosissima* Pers. — In salinis prope opp. Limassol. In ripa salina lacus prope opp. Larnaca. In salsis inter Prastio et Kouklia.
- E. spicata* (L.) Pers. — Akhelia, loco humido. Skoulli prope pag. Polis, in ripa fluminis. In salinis prope opp. Limassol. In salinis prope opp. Larnaca. In salinis juxta opp. Famagusta. In salsis inter Prastio et Kouklia. — Not mentioned by HOLMBOE.
- f. albiflora*. — In litore prope opp. Limassol. In salinis prope opp. Larnaca. In salinis juxta opp. Famagusta.
- E. tenuiflora* Hoffm. et Link. — Akhelia, loco humido. Ayios Neophytos, in valle infra monasterium. Kolossi, loco humido. In salinis prope opp. Limassol. In ripa fluminis Pedieos in opp. Nicosia. In ripa salina lacus prope opp. Larnaca.

APOCYNACEÆ

- Apocynum venetum* L. — In litore arenoso inter opp. Famagusta et Salamis. — Not mentioned by HOLMBOE.
- Nerium oleander* L. — Athalassa prope opp. Nicosia, in ripa rivuli. Ayia Napa, juxta mare (f. floribus pallide roseis).

CONVOLVULACEÆ

- Convolvulus athæoides* L. — Loco humidiusculo in cultis prope opp. Limassol.
- C. arvensis* L. — M. Troodos, in campo sicco juxta «Olympus Camp Hotel». In cultis juxta opp. Larnaca. var. *Cheveri* (Ag.) Halacsy. — Akhelia, in cultis.
- C. cyprius* Boiss. — In rupe juxta rivulum prope monasterium Ayios Neophytos. Athalassa prope opp. Nicosia, in fissuris rupium siccissimis. Ayios Theodoros, in rupestribus juxta mare.
- C. doryenium* L. — Athalassa prope opp. Nicosia, loco aridissimo juxta viam.
- C. hirsutus* Stev. — Akhelia, in cultis.
- C. pentapetaloides* L. — In cultis prope opp. Limassol.
- Cressa cretica* L. — In litore prope opp. Paphos. In salinis prope opp. Limassol. In ripa salina lacus prope opp. Larnaca. Ayia Napa, in litore arenoso maris. In litore arenoso prope opp. Famagusta. Locis salsis inter Prastio et Kouklia.
- Cuscuta epithymum* L. — Boghazi, in rupe in valle rivuli supra opp. Kyrenia.
- Ipomoea litoralis* (L.) Boiss. — In arena mobili in litore maris inter opp. Famagusta et Salamis. — Not mentioned by HOLMBOE.

BORRAGINACEÆ

- Anchusa ægyptiaca* (L.) DC. — Boghazi, loco sterili juxta viam ad opp. Kyrenia.
- A. aggregata* Lehm. — Perivolvia, in litore arenoso. Salamis, in litore arenoso. Trikomo, in litore arenoso.
- A. hybrida* Ten. — Ayios Hilarion, in rupestribus siccis.
- A. italica* Retz. — Kolossi, in ruderalis. Ayios Hilarion, in rupestribus siccis. Athalassa prope opp. Nicosia, in campo siccissimo.
- A. strigosa* Lab. — In margine vie inter Ambelikou et Kampos.
- Cynoglossum creticum* Mill. — M. Troodos, in ruderalis juxta «Olympus Camp Hotel». Ayios Hilarion, in rupestribus siccis. Boghazi, loco sicco juxta viam ad opp. Kyrenia.
- C. Troodi* n. sp. (*Paracaryum myosotoides* Holmboe, Veg. Cypr. p. 147, *P. myosotoides* Boiss. Fl. or., IV, p. 257, quoad plant. cypr., *Mattiasstrum lithospermifolium* Brand, Das Pflanzenreich, 78. Heft. p. 63, quoad plant. cypr., *Cynoglossum montanum* collect. cypr. in sched., non. Lam.). Fig. 19.
- Bienne, caules erecti vel arcuati, solitarii vel vulgo complures, vulgo 15—25 cm alti (in specimenibus in ruderalis crescentibus usque ad 30—50 cm alti), densissime patule vel subpatule albo-hirsuti, rami erectopatentes, adpresse densissime pilosi; folia utrinque densissime patule pilosa, inferiora longe petiolata, linguata, obtusa, superiora sessilia, semiamplexicaulia, ± acutiuscula; cincinni ebracteati, terminales, multiflori, demum 5—12 cm longi, dense fructiferi; pedicelli fructiferi torti, subpatuli, calyce æquilongi; sepalâ obtusa, linearia, subadpresse pilosa, in statu fructifero 2—3 mm longa, 1 mm lata; corolla calyce 1/3 longior, in vivo rubiginosa, in sicco obscure coerulea, 3 mm diametro; stylus post anthesin longus, 3—4 mm, exsertus; nuculae immarginate, facie exteriori convexa, aculeis glochidiatis dense æqualiter munitæ. — Vidi specimen in Herb. Lund a P. STENTENIS lecta («D. 828 auf dem Gipfel des Troodos, 18. 6. 1880», sub nom. «Para-

X

*caryum myosotoides* Boiss. et a E. W. KENNEDY (n. 695 Chionistra, 28. 5. 37, sub nom. «*Cynoglossum montanum* L.») et in Herb. Helsingfors a E. W. KENNEDY lecta (n. 694 Kryos Potamos, 24. 5. 37). Vidi etiam specimina *Paracaryi myosotoidis* Boiss. (planta vera) «e Libano, Labillardière» in Herb. Steven in Herb. Helsingfors.

M. Troodos, in glareosis in declivi montis Chionistra. In pineto (*P. Pallasiana*) et in ruderatis juxta «Olympus Camp Hotel» et in pineto juxta «Military Camp».

*Echium italicum* L. — Ayios Neophytos, loco sterili in margine viæ. Lapithos, in margine viæ.

*E. sericeum* Vahl «*elegans* Lehm. — Kannaviou, in margine viæ. In litore arenoso prope opp. Limassol. In campo siccissimo in opp. Nicosia. Loco lapidoso, aridissimo juxta monasterium Staurovouni. In colle arenoso juxta opp. Larnaca. In litore arenoso prope opp. Famagusta.

*Heliotropium europæum* L. — Kakopetria ad viam ad m. Troodos, in cultis. In horto in opp. Nicosia. Perivolia, in cultis.

*H. villosum* Willd. — Akhelia, in cultis. Ayios Neophytos, in siccis in margine viæ juxta monasterium. Bellapais, in margine viæ. In margine viæ juxta opp. Kyrenia.

*Lithospermum arvense* L. «*Sibthorpiatum* (Griseb.). — M. Troodos, in glareosis subhumidis in declivi cacuminis Chionistra. In terra nuda et in cultis juxta «Olympus Camp Hotel».

*L. hispidulum* Sibth. et Smith. — M. Troodos, Platania, in lapidosis siccis juxta viam. In pineto (*P. halepensis*) prope Akrotiri. Ayios Hilarion, in rupestribus siccis. Boghazi, in rupestribus siccis in valle supra opp. Kyrenia. Pentadactylos, «Armenian Monastery», in colle siccissimo.

*L. incrassatum* Guss. — Kouklia, in cultis.

*Myosotis collina* Hoffm. — M. Troodos, in terra nuda juxta fontem Kannoures Spring.

*M. cretica* Boiss. et Heldr. — M. Troodos, loco humidiusculo in declivi in cacumine Chionistra.

*Onosma cæspitosum* Kotschy. — Ayios Hilarion, in rupestribus siccis.

*O. frutescens* Sibth. et Smith. — In pineto (*P. halepensis*) prope Akrotiri. Athalassa prope opp. Nicosia, in declivibus siccissimis.

*O. giganteum* Lam. var. *hispidum* Boiss. — In colle aridissimo ad viam juxta pag. Stroumbi.

*O. Troodi* Kotschy. — M. Troodos, in glareosis in cacumine Chionistra. In pineto (*P. Pallasiana*) juxta viam inter «Olympus Camp Hotel» et cacumen Chionistra.

#### VERBENACEÆ

*Lippia nodiflora* (L.) Rich. — In salinis prope opp. Limassol. Loco humidiusculo in horto in opp. Nicosia. — Not mentioned by HOLMBOE.

*Verbena officinalis* L. — Bellapais, in margine viæ. Opp. Nicosia, in ruderatis juxta flum. Pedieos.

*V. supina* L. — In arenosis juxta opp. Larnaca. — Not mentioned by HOLMBOE.

f. *petiolulata* n. forma.

Lobi foliorum (magna ex parte), præsertim lobus terminalis longe (c. 3 mm.) et anguste petiolata. In arenosis juxta opp. Larnaca.

*Vitex agnus castus* L. — Simboulas tis Dillergas inter Polis et Pomos, loco humidiusculo juxta mare. Loco humido juxta opp. Kyrenia.

#### LABIATÆ

*Ajuga iva* (L.) Schreb. «*pseudo-iva* Rob. et Cast. — Pentadactylos, Haleuka, loco lapidoso siccissimo. In cultis juxta viam inter Athalassa et opp. Nicosia. In siccis prope opp. Larnaca. In arenosis juxta mare prope opp. Famagusta.

*A. orientalis* L. — M. Troodos, Prodhromos, loco humidiusculo. In pineto (*P. Pallasiana*) juxta «Military Camp».

*Ballota integrifolia* Benth. — Boghazi, loco lapidoso siccissimo in valle rivuli supra opp. Kyrenia.

*B. nigra* L. «*foetida* Lam. — M. Troodos, Milikouri prope monasterium Kykko, in umbrosis. Kambos, in umbrosis. Kolossi, in ruderatis. Kythrea, loco umbroso in horto.

*Brunella vulgaris* L. — M. Troodos, Platania, in margine viæ, loco umbroso.

*Lavandula spica* L. — Lapithos, in cultis.

*L. stoechas* L. — In rupe aridissima juxta viam ad monasterium Staurovouni.

*Marrubium vulgare* L. «*apulum* (Ten.). — M. Troodos, Kykko, in margine viæ juxta Vrysi. Opp. Nicosia, in margine viæ juxta flum. Pedieos.