

picti missum a plerisque, et ab hoc diversissimum. *Cynoglossum pictum* genuinum nostrum a Cl. Thouin nomine *Cynoglossi apennini* accepimus.

193. — *CYNOGLOSSUM montanum* Smith, Pers. syn. n. 2., quod a *Cynoglosso sylvatico* Hænke quidquam diversum videtur. Folia inferiora in caule per petiolum bi - triplicarem decurrentia, hinc spathulato-lanceolata, lucida quidem, virentia, attamen pilis superne aspersa, inferne pubescentia, supra magis, quam subtus, scabra, basi præcipue ciliata pilis longis. Avenia, ut Villars dicit, non sunt, sed basi fere trinervia, ut in *C. virginianum* Syst. veg. ed. 3. nec Sp. pl. Folia omnino remota, ut in *C. sylvatico*, at inferiora tantum, per petiolum longum decurrentia, subsessilia, superiora vero et suprema basi cordata, fere amplexicaulia. Pedunculi quoque remoti in spica longa, laxa, floribus secundis purpurascensibus albisve, forniciibus saturate purpureis. Calyx corolla brevior.

194. pag. 762. *CYNOGLOSSUM cheirifolium*. Gouani definitio optima. An non hujus potius loci *C. lanatum* Tourn. Cor. 7.

195. pag. 766. *CYNOGLOSSUM omphalodes*. Corolla non infundibuliformis, sed rotata.

196. — Nomine *Cynoglossi umbellati* a L. B. de Matt plantam obtinui, quæ *Cynoglossi* generis characteres æque male, quam alia quædam *Cynoglossa*, refert: est enim:

CAL. *Perianthium* quinquepartitum, patens, persistens, laciniis linearis - lanceolatis obtusis.

COR. monopetala, infundibuliformis, calyce longior. *Tubus* cylindraceus, prismatico - pentagonus, limbo longior, calyce brevior. *Limbus* fere quinquepartitus, laciniis linearibus obtusis. *Faux clausa* squamulis quinque compressis, emarginatis, brevibus, conniventibus, tubum vix excedentibus.

STAM. *Filamenta* quinque antherarum longitudine, in fauce corollæ, illamque superantia. *Antheræ* oblongæ, exsertæ, connientes.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* subulatus tetragonus, calyce duplo longior, ideoque stamina multoties excedens, persistens. *Stigma* simplex, subobliquum.

PER. nullum, sed *Arilli* seminum quatuor, alæ instar semen singuli obvestientes, rotundato - subemarginati, extus concavi, lævissimi, nitidissimi, alâ diaphanâ latâ, non dehiscentes, subtus longitudinaliter basi styli affixi.

SEM. quatuor ovato - acuminata, compressa, alata.

Differit ergo a *Cynoglosso*: corolla, filamentis styloque longioribus et seminibus, iisdemque characteribus ab *Anchusa*, *Onosmate* et affinibus. *Character essentialis*: Corollæ tubus prismatico - pentagonus, limbi laciniæ lineares. Squamulæ compressæ emarginatæ ad faucem. Filamenta antheræque exsertæ. Semina alata.

Quum genus *Rinderæ*, a Pallas propositum, ad quod planta nostra pertineret structurâ seminum, non receperissent Botanici ob specierum fors defectum, licet nunc, numero specierum aucto, genus ididem proponere ut dissimillima demum *Cynoglossa* disjungantur, nomenque novum eidem petere ab indefessa cultore scientiarum (*Botanices in primis et Astronomiae*) et pulclarum artium (*picturæ præcipue*), L. Baronissa de Matt, quæ plantam hanc horto nostro dono dederat. Nobis faltem Mattia erat et hæc, et *Cynoglossum*, *lævigatum*, *lanatum* etc.

*Radix* fibrosa, ut videtur biennis; priore anno sata planta hoc anno 1808 floruit.

*Caulis* pedalis, foliis radicalibus ovato - lanceolatis, superioribus linearis - lanceolatis, supremis linearibus, omnibus longe petiolatis et per petiolum decurrentibus, integerrimis, incanis, villoso - pubescentibus. *Caulis* superne foliis linearibus imbricatis tectus dilatatur apice, unde umbella nascitur e racemis multifloris, pedunculis simplicibus circa circum cernuis purpurascensibus, lanugine alba, qua et calyx obtigitur, involutis. Inde capitulum umbellatum terminale floribus nutantibus centro concavo, elegantissimum, tum planta floret: at deflorati pedunculi eriguntur sensim sensimque, et fructigeri demum corymbum fistunt racemosum, ut umbellæ species depereat.

*Calyx* descriptus. Corollæ limbus primum laterius, soli diutius expositus flavescens, siccatus virescens. Antheræ virides, effoetæ, fuscæ. Pollen sulphureo - albus. *Stylus* rufobadius, in violaceum vergens, superne cum stigmate flavescens.