

3. Стебель при основании и черешки прикорневых листьев с густой синей окраской.

1. Ксерофильные виды. Прикорневые листья узкие, продолговато-ланцетные или ланцетные, постепенно оттянуты в черешок.

2. Тычинки прикреплены между лопастями его отгиба. Венчик желтый. Неразделенная часть отгиба очень коротка, так что тычинки кажутся прикрепленными непосредственно между линейными лопастями. (Секц. *Kuschakeviczia*).

Стебель приподнимающийся, угловатый, как и листья, оттопыренно-шерстистый, на конце коротко-зонтиковидно-разветвленный, отчего соцветие головчатое; позднее ветви удлиняются. Листья ланцетовидные, верхние стеблевые—сидячие, нижние и прикорневые оттянуты в б. м. длинный черешок. Корень толстый, деревянистый. Чешуйки в зеве венчика маленькие, волосистые.

*S. turkestanicus* (Rgl. et Smirn.) Kusn.

Т. туркестанский.

Син. *S. Kuschakeviczi* Lipsky, *Kuschakeviczia turkestanica* Rgl. et Smirn. Самарканд: оазис и предгорья. На сухой лессовой почве.

2. Неразделенная часть отгиба ясно заметна. Тычинки прикреплены далеко ниже лопастей отгиба. Венчик голубой, фиолетово-голубой, не желтый. (Секц. *Hirsuti* Zak.).

3. Растение с мягким, серым, бархатистым опушением. Стебель до верхушки олиственный. Корневище и корень очень мощные, несколько см. в поперечнике, дают по несколько стеблей. Стебли, как и листья, серо-беловатые, ребристые. Листья длинные, линейно-ланцетные, верхние стеблевые—мельче и сидячие, нижние и прикорневые оттянуты в длинный черешок, до 20 иногда и больше см. дл., 25 мм. шир. Венчик синевато-фиолетовый. Лопастни отгиба короткие, 3-угольные, очень острые. Чешуйки расположены как бы в 2 круга: один в середине трубки венчика, другой, как правило, в зеве, но каждая пленчатая чешуя слипшаяся с нитью тычинки. Пыльники коротко-линейные.

*S. kokanicus* Lipsky. Т. кокандский.

3. Растение грубо-шерстистое, без бархатистого опушения. Стебель до середины олиственный. Корневище нетолстое около 1 см в поперечнике. Корень нитевидный. Стебель, как и листья, грубо шерстистый, круглый, не ребристый. Листья линейно-ланцетные, стеблевые—сидячие, прикорневые—на длинных черешках до 15 см дл. и 2 см шир. Соцветие метельчатое из длинных кистей. Венчик красный, сине-фиолетовый, около 3 мм дл., лопасти отгиба на верхушке раздвоенные. Чешуйки в зеве маленькие, тупые. *S. hirsutus* Rgl. Т. грубошерстистый.

Кухистан: бассейн р. Фон, Пасруд.

9. *Trachelanthus* Kunze. Трахелант.

У нас один вид: *T. hissaricus* Lipsky. Т. гиссарский. Горы: около кишлака Шут.