

Син. *Cynoglossum anchusoides* Link. Всюду в полулу-
стинной и полустепной части нашего района.

1. Венчик фиолетовый или темно-фиолетовый.

2. Доли отгиба широкие, почти круглые, не удлиненные, чешуики в зеве очень длинные, почти равные тычинкам. Венчик темно-фиолетовый, 14-15 мм дл., трубочка его равна отгибу или длиннее его на 1 мм; чашелистики линейные, острые. Цветение—верхушечный завиток. Стебель гладкий, ребристый, 15-30 см выс. Листья узко-ланцетные, стеблевые—сидячие до 4 см дл. и 12 мм шир., прикорневые—на черешках, до 12 см дл. и 2 см шир., зеленые, шероховато-мелковолосистые.

L. Olgae (Rgl. et Smirn.) Zak. Л. Ольга.

Син. *Solenanthus Olgae* Rgl. et Smirn. Кухистан: бассейн р. Фон: Пасруд, перевал Лаудан (Кули-Колон), Турзуль, Чап-Дара. Мягкие склоны в полосе лугостепи выше арчевника.

2. Доли отгиба удлиненные, некруглые; чешуики в зеве венчика очень короткие, не длиннее нити тычинки. Венчик фиолетовой окраски, но не темный, 9-11 мм дл., трубочка его едва длиннее и отгиба и чашечки. Чашелистики густо-шерстисто-волосатые. Стебли и листья серые от мягко-бархатистого опушения. *L. stylosa* (K. et K.) Zak. Л. длинностолбиковая.

Син. *Solenanthus stylosus* Lipsky, *Cynoglossum stylosum* K. et K. Кухистан: бассейн р. Фон, Пасруд, Чап-Дара. В полосе лугостепи выше арчевника.

8. *Solenanthus* Ledb. Трубкоцвет.

1. Мезофильные виды. Стебель высокий, 40-100 см. Прикорневые и нижние стеблевые листья с яйцевидной крупной омброподобной пластинкой, основание которой сердцевидно и с резко обособленным черешком. (Секция *Petiolares* Zak.). Стебель бороздчатый, до 1 см в диам., ветвистый.

Листья сверху прижато-щетинистые, снизу мягко-шерстистые, верхние, стеблевые—сидячие, продолговатые. Венчик голубой, около 5 мм дл., доли отгиба короткие, широко 3-угольные. Чешуики в зеве короткие, кверху языковидно-суженные. Тычинки выставляются далеко из венчика, пыльники мелкие, окруженные или коротко-эллиптические. Краевые шипики орешков с расширенными основаниями образуют вид чаши (блудца) орешка.

S. coronatus Rgl. Т. корончатый.
Горы: Агалык, Аман-Кутан, Санги-Джуман. Кухистан: бассейн р. Фон. В скалах, на осыпях—в тени.

У нас встречаются следующие разновидности:

1. Стебель покрыт мелким шерстистым опушением. *v. lanata* tus Zak.

2. Стебель с блеском, гладкий, с единичными незаметными *v. nitidus* Zak.