

**XVIII. Generis *Albucae* species novae Capenses a J. G. Baker descriptae.**

(Aus: Records of the Albany Museum, I [1904], pp. 89—94.)

(Schluss.)

**13. *Albuca affinis* Baker, l. c., p. 93.**

Bulbus globosus, 9—12 lin. diam., tunicis membranaceis. Folia 3 lanceolata erecta breviter glabra 3 lin. lata. Pedunculus 1,5—2 poll. longus. Racemus pauciflorus, pedicellis adscendentibus, inferioribus 15—18 lin. longis, bracteis erecto-lanceolatis. Perianthium 6 lin. longum, segmentis lineari-oblongis albis brunneo-viridis carinatis. Antherae omnes fertiles, 3 minores. Stylus subulatus 4 lin. longus.

C. B. Spei, regio occidentalis: Steinkopf, in collibus, alt. 2800 pedes. R. Schlechter, no. 11501, Nov. 1897.

Ad *A. micrantham* Baker arcte affinis an varietas?

**14. *Albuca concordiana* Baker, l. c., p. 93.**

Bulbus parvus globosus, tunicis membranaceis albis supra collum productis. Folia pauca linearia glabra 2—3 poll. longa 1,5—2 lin. lata. Racemus laxis 8—10-floris 3 poll. longus, pedicellis inferioribus erecto-patentibus vel cernuis 4—6 lin. longis, bracteis ovato-lanceolatis. Perianthium 6 lin. longum, segmentis oblongo-spathulatis albis brunneo-carinatis. Stamina omnia fertilia. Stylus subulatus 3—4 lin. longus.

C. B. Spei, regio occidentalis: Concordia, in collibus, alt. 3100 pedes. R. Schlechter, no. 11320, Sept. 1897.

**XIX. *Urobotrya* gen. nov. *Olacacearum* O. Stapf.**

(Contributions to the Flora of Liberia in Journ. Linn. Soc., XXXVII [1905], p. 89.)

Affinis *Opiliae* Roxb., sed toto habitu, racemis longissimis, disco annulari indiviso, filamentis quam petalis duplo longioribus distincta.

Calyx ad marginem obscurum redactus. Petala 4—5, valvata tandem libera et reflexa. Stamina petalis opposita, hypogyna, filamentis capillaribus longissimis; antherae ovoideae, basi affixae. Discus annularis, crassus, undulatus vel truncatus. Ovarium 1-loculare; stigma stylo brevi imposito vel sessile, parvum; ovulum 1, e placenta ascendente ex apice loculi pendulum.

Fructus mihi ignotus; a *Dryandro* bacca descripta.

Frutices glabri, nisi interdum racemorum rhachides pubescentes. Folia subcoriacea vel membranacea. Racemi longi, penduli; bractae nullae vel hyalinae. Flores fasciculati, pedicellati.

**1. *U. angustifolia* Stapf, l. c., p. 89.**

Frutex glaberrimus. Folia lineari-lanceolata vel oblonga, acuminata,