

Note Sur Un Podanthum Nouveau De La Flore D'Algérie

M.M. Battandier & Trabut

To cite this article: M.M. Battandier & Trabut (1892) Note Sur Un Podanthum Nouveau De La Flore D'Algérie, Bulletin de la Société Botanique de France, 39:10, LX-LXI, DOI: [10.1080/00378941.1892.10828707](https://doi.org/10.1080/00378941.1892.10828707)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1892.10828707>



Published online: 08 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 8



View related articles [↗](#)

Les quelques plantes que nous avons pu cueillir, dans une course rapide faite à cheval et à une saison trop avancée (octobre), sont :

A Foum Reddad :

Deverra scoparia.		Olea europæa.
Rhanterium adpressum.		Traganum nudatum.
Anvillea radiata.		Osyris lanceolata.
Artemisia atlantica.		

Au-dessus du ksar ruiné d'el Ahmar, dans un ruisseau :

Typha angustifolia.

Puis en continuant jusqu'à Tadjerouna :

Fagonia glutinosa.		Datura Stramonium.
Asteriscus pygmæus.		Salsola oppositifolia.

Bien des plantes de cette liste, critiques, rares ou nouvelles, mériteraient une étude spéciale. Je me propose d'y revenir plus tard. Dans cette Note je n'ai eu qu'un but : poser quelques jalons qui puissent servir de guide à des herborisations dans cette partie si pittoresque et si riche, comme flore, du djebel Amour dont Aflou est le centre.

Les indications de distances que j'ai données sont par à peu près, et il serait imprudent de s'y fier d'une façon absolue.

M. Battandier, au nom de M. Trabut et au sien, fait à la Société la communication suivante :

NOTE SUR UN *PODANTHUM* NOUVEAU DE LA FLORE D'ALGÉRIE;
par MM. BATTANDIER et TRABUT.

Podanthum auraslacum nov. spec. — Perennis, caudice crasso, pluricipiti; caulibus numerosis, virgatis, firmis, sesquipedalibus bipedalibusve, parce pilosis pilis reflexis. Foliis glabrescentibus, pallidis, lanceolatis, serratis, ab infimis cito evanidis et in petiolum ciliatum attenuatis ad bracteas sensim diminutis. Bracteis lanceolato-linearibus subulatisve, subintegris, infimis flore longioribus, supremis brevioribus. Floribus subsessilibus, in axillis bractearum 4-3 glomeratis; glomerulis in spicam laxam dispositis. Calycis sub lente dense papilloso tubo obconico laciniis longiori; laciniis subulatis, corolla triplo brevioribus. Corolla cærulea, quinquepartita laciniis linearibus, liberis, antheris longioribus. Filamentis liberis, basi dilatata ciliatis, apice curvatis, an-

thera lineari triplo brevioribus. Stylo piloso, apice trifido. Capsula erecta, oblonga, poris tribus apice dehiscenti.

Lectum quatuor decimo die Julii apud djebel Sgag, in montibus Aurasiis.

Cette plante appartient à la section *Eupodanthum* Boissier, Flore d'Orient. Le seul *Podanthum* algérien antérieurement connu en Algérie était le *P. trichocalycinum* des Babors qui appartient à la section *Clinocarpum*. Notre plante est voisine du *P. lanceolatum* Boissier; *Campanula lanceolata* Willd.; *C. tauricola* Boissier, *Diagnoses* § II, fasc. 3, p. 116, mais elle s'en distingue par ses feuilles fermes, fortement dentées, son port plus robuste, sa glabrescence, son calice à dents plus courtes, etc.

Explication des figures de la planche IV de ce volume.

PODANTHUM AURASIACUM Batt. et Trab.

FIG. 1. — Rameau en fleurs.

FIG. 2. — Feuille inférieure.

FIG. 3. — Bouton floral.

FIG. 4. — Fleur épanouie.


FIG. 5. — Fleur épanouie dont on a enlevé les pétales et la moitié de l'anthère antérieure.

FIG. 6. — Étamine.

FIG. 7. — Coupe de l'ovaire.

FIG. 8. — Calice fructifère.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée, avant de se séparer, vote des remerciements unanimes à M. le Président et aux autres membres du Bureau de la session.



PODANTHUM AURASIACUM BATT. ET TRAB.