

Vorkommen in 2 verschiedenen Regionen des Gebietes: 1. Region der niedrigsten Flussthäler mit ihren angrenzenden Auen (250—500' Meereshöhe). 2. Region der Hügellandschaft und Vorberge (500—1500' M. H.).  
M. Pflhoda.

## Correspondenz.

Mühlau, am 26 Februar 1883.

Zur Berichtigung meiner neulichen Correspondenz Seite 101. Die rosablühende *Potentilla* ist nicht *P. Fragariastrum*, sondern *P. micrantha*, und die grösserblüthigen fleischfarbenen mit zum Theil mehrgezweigtem und daher auch mehrsaftigem Rhizom ein Bastard zwischen *P. micrantha* und *P. Fragariastrum*, wie mein Freund, Herr Prof. P. Gremblich O. S. F. mir gezeigt hat. Evers.

Pola, am 3. März 1883.

In meinem Aufsätze in Nr. 3 der Oest. bot. Zeitschr. kommen zwei Fehler vor, um deren Berichtigung ich ersuche. Auf Seite 83 soll es statt *Tetragonolobus uliginosus* heissen *Tetrag. siliculosus* Roth. und auf Seite 84 Zeile 5 statt „und vorläufig als *phylloclada*“, und vorläufig als var. *phylloclada*. Heute erst ist mir in den Nachträgen zur Fl. v. Fiume von Hirc der Passus: „*Asplenium viride* Huds. wird sonderbarer Weise in der Fl. v. Fiume nur für den Monte Maggiore und Mt. Berloznik angegeben und ist doch auf Mauern und Felsen im ganzen Gebiete gemein“ aufgefallen. Was Hirc für *Asplenium viride* hält, weiss ich nicht, thatsächlich kommt aber dieser Farn in der näheren Umgebung von Fiume gar nicht und auf dem Monte Maggiore nur sehr selten vor. K. Untchj.

Linz, am 6. März 1883.

Die Wiesen um Linz sind seit 23. Februar mit *Galanthus nivalis*, die Auen an der Traun seit 28. Februar mit *Leucojum vernum* wie besäet. *Daphnae Mezereum* blüht seit 2. März. Am 3. März färbte *Tussilago Farfara* die Haltestelle Windegg gelb, während die Leithen bei Banglmayr und die Puckinger Leithen reichliche Mengen von *Hepatica triloba* boten. Am Fusse der letzteren erglänzten am 4. März viele *Caltha palustis*, an einem Bächlein bei Berg blühte *Primula elatior*, an der Traun eine *Ficaria ranunculoides*. Auf den Pleschinger Höhen ist *Anemone Pulsatilla* zum Oeffnen der Blüthe bereit. Staare sind seit 19. Februar um Linz. Franz Strobl.

Budapest, am 12. März 1883.

Freund Freyn erwähnt in seiner Fl. v. Südistr. *Orchis Morio* nicht, sondern die hier als vicarirende Species erscheinende *O. picta* Lois. Ich gebe zu, dass in der Gegend des österreich-ungarischen Litorale die südlicheren Formen der *O. Morio* etwas von den nördlichen