

Borbás Vincze: Floristikai jegyzetek (Floristische Notizen).

In der März-Nummer der „Termesztet“ (pag. 79—80) proponirt der Verfasser für *Thalictrum medium* Reichb. Iconogr. den Namen *Th. apiculatum*, *Potentilla Beniczkyi* Friv. (*P. rupestris* var. *grandiflora* Heuff.) kommt bei Mehadia vor, *Rosa Ilseana* Crép., bisher bloss von Hradek bekannt, fand Verfasser auf dem Mathias-Berge bei Ofen, *Hieracium macranthum* Ten. (*H. leucocephalum* Vukot.) ist um Budapest ziemlich häufig. *Inula litoralis* am Vratnik bei Zengg ist = *I. squarrosa* × *ensifolia*. K.

Janka Victor v.: Descriptiones plantarum novarum. Separatabdruck aus den Termesztet rajzi füzetek (Naturgeschichtliche Hefte). Bd. II. Quartal I. (Budapest 1878) 8°. 4 pag. mit 1 Tafel.

Der Verf. beschreibt hier zuerst *Silene rhodopea* (Thracien), *Seseli purpurascens* (Ebend.), *Onopordon Illex* (Macedonien) und *Podanthum anthericoides* (Thracien und Serbien). Mit Ausnahme der letztgenannten werden die übrigen auf der beigegebenen Tafel abgebildet. K.

Correspondenz.

Budapest, 28. März 1878.

Im Recinathale fand ich *Geranium molle*. L. var. *grandiflorum* (*G. villosum* Rehb. icon! non Pen.), die typische Form ist bei Helsingör in Dänemark (17. Mai 1875) häufig. — *Erodium pimpinellifolium* Sm., welches durch den glandulösen Kelch ausgezeichnet ist, und *Galium elongatum* Presl wächst auch am Rákos bei Pest. Letzteres verhält sich durch die grösseren Blüten zu *G. palustre* L. etwa so wie *G. rubioides* L. zu *G. boreale* — *Festuca rubra* L. fand Simkovics bei Gödöllő früher, als ich bei Hidegkút. — Bei Ipoly-Litke wächst *Rumex aquaticus*, *R. stenophyllus* Led. auch bei Vésztő. — *Potentilla rupestris* var. *grandiflora* Heuff. ist = *P. Beniczkyi* Friv. — *Pleurospermum austriacum* kommt im Klopotivaer Thale unter dem Retyezát als var. *pubescens* vor. Borbás.

Seitenstetten 6. April 1878.

Ich theile Ihnen mit, dass Dr. Kerner durch ein mir übersandtes Original Exemplar seiner *Ficaria nudicaulis* mir die Identität derselben mit *calthaefolia* (Rehb.) bewies, dass somit *F. nudicaulis* Richter exsicc. und *nudicaulis* Kerner zwei verschiedene Formen sind. Diess zur Berichtigung meiner auf Seite 110 ausgesprochenen Meinung. P. G. Strobl.

St. Ilgen in Grossherz. Baden, am 24. März 1878.

Unter dem Titel „Ueber die Flora des neuen deutschen Reichslandes Elsass-Lothringen und zunächst über die Flora der Gefäss-