

Additions A La Flore De Couse

M. J. Foucaud

To cite this article: M. J. Foucaud (1900) Additions A La Flore De Couse, Bulletin de la Société Botanique de France, 47:1, 83-102, DOI: [10.1080/00378941.1900.10828884](https://doi.org/10.1080/00378941.1900.10828884)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1900.10828884>



Published online: 08 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 24



View related articles [↗](#)

1896, par M. le Dr Camus (1), dans une tourbière des Montagnes-Noires, au lieu dit « Goarem al boule'h », puis, retrouvé par le même, l'année suivante, au Méné Kerque, près Châteaulin. Ces deux localités appartiennent au Finistère.

Dans le *Catalogue des Muscinées* de la Sarthe, que viennent de publier MM. Thériot et Monguillon (2), le *Sph. molle* est indiqué à l'arigné-l'Évêque et dans la forêt de Courcelles.

La présence, dans les Vosges, de cette Sphaigne, encore si rare, m'a paru d'autant plus intéressante à signaler, que les quatre localités connues sont, comme on vient de le voir, toutes situées dans l'ouest de la France.

En terminant, je dirai que c'est M. le Dr Camus qui a reconnu cette espèce dans un lot de Sphaignes que je lui avais soumis.

M. Malinvaud donne lecture des communications suivantes :

ADDITIONS A LA FLORE DE CORSE; par M. J. FOUCAUD.

En 1898, nous avons fait en Corse, M. Mandon et moi, du 8 juillet au 1^{er} août, une excursion pendant laquelle nous avons exploré le Pigno, près de Bastia, le cap Corse jusqu'à Luri, les environs de Corté, le mont Felce, la vallée de la Restonica, le mont Rotondo, la forêt de Vizzavona, les environs d'Omesso, de Caporalino, de Ponte-Leccia, de Tattone, de Vivario, de Ghisoni, la forêt de Casamente, le mont Renoso et enfin les environs de Calvi, de Prunelli di Fiumorbo et de Ghisonaccia.

A Ghisoni, au Renoso, dans la forêt de Casamente, nous avons eu le plaisir d'être accompagnés par M. Rotgès, garde général des eaux et forêts, que nous remercions vivement de sa si bonne obligeance.

M. Rotgès est un botaniste zélé, qui ajoutera certainement beaucoup à nos connaissances actuelles sur la flore de la Corse.

A Prunelli di Fiumorbo, nous avons été reçus avec la plus grande amabilité par M. Pieri, à qui nous a présentés M. le professeur Pieri, de Rochefort, et par sa famille; et M. Gavin, dont

(1) Voy. *Bull. de Soc. bot.* (1896), p. 518.

(2) Voy. *Muscinées du département de la Sarthe*, par MM. Thériot et Monguillon (1899), p. 91.

j'ai eu le plaisir de faire la connaissance à Solenzara, en 1896, nous a fait explorer avec son obligeance ordinaire les environs de cette intéressante localité.

Les découvertes que nous avons faites, M. Mandon et moi, sur les divers points que nous avons explorés, font l'objet de ce travail et montrent combien il reste encore à faire pour arriver à posséder un inventaire complet de la riche végétation de cette curieuse île de Corse.

Dans ce travail figurent aussi les raretés recueillies par M. Rotgès, qui non seulement m'a tenu au courant de ses découvertes, mais encore a enrichi mon herbier d'une part de toutes les plantes qu'il a observées.

M. Audigier a beaucoup herborisé en Corse l'an passé et cette année et a bien voulu, lui aussi, me communiquer les raretés que je cite sous son nom. Je suis heureux de lui exprimer tous mes remerciements, ainsi qu'à MM. N. Roux et Pieri, qui m'ont également procuré des plantes de Corse.

CLEMATIS FLAMMULA L. — Dans le maquis de Prunelli di Fiumorbo, cette plante offre tous les passages de la variation à folioles grandes jusqu'à la variation à folioles petites, étroites. Ces intermédiaires comprennent, sans qu'il soit possible de les délimiter, les *Clematis hybrida* Alb., *Scrin. Fl. select.* Magn., p. 147, *fragrans* Ten. *Fl. neap.*, 1, t. 48, *maritima* L. *Sp.*, 747.

Les fleurs varient aussi à sépales plus ou moins obtus, plus ou moins aigus.

La variation à folioles étroitement linéaires (var. *stenophylla* Heldr.) croît à Bonifacio, d'où je l'ai reçue de M. Stéfani.

C. VITALBA L. var. *taurica* Rouy et Fouc., *Fl. Fr.* 1, p. 5; *C. taurica* Bess. in *herb. Zeyheri*. — Maquis de Prunelli di Fiumorbo, cap Corse, près de Bastia (Mand. et Fouc.).

* THALICTRUM MINUS L. (1) subsp. *silvaticum* Koch, form. stat. *brachycarpum* Rouy et Fouc., *l. c.*, p. 23? (2); *T. brachycarpum*

(1) Les plantes dont le nom est précédé d'un * n'avaient pas encore été signalées en Corse.

(2) Je substitue au mot *forme* désignant, dans la *Flore de France* de G. Rouy et J. Foucaud, la division du groupe spécifique placée entre la sous-espèce et la variété, l'expression *forme stationnelle* (*forma stationalis*, « form. stat. ») afin d'éviter toute confusion, ce mot *forme* étant souvent employé par d'autres auteurs pour indiquer les sous-variétés, les variations.

Cette expression a l'avantage de désigner d'une manière très précise la division du groupe spécifique à laquelle elle s'applique.



Bernard del.

F. Olivier lith. La Rochelle

BISCUTELLA ROTGESII FOUQ.

Timb., *Le Capsir.*, p. 15? — Ce *Thalictrum*, trop peu avancé pour qu'on puisse le déterminer avec certitude, paraît se rapporter au *T. brachycarpum* Timb. M. N. Roux, à qui l'on doit tant de belles découvertes, surtout dans les Alpes, l'a observé au Pigno, près de Bastia, le 10 juin 1894.

ANEMONE APENNINA L. Sp., 762. — Vallée du Baracci, rive gauche, et partout dans les bois de cette rive (Audigier).

RANUNCULUS FLABELLATUS Desf. var. *uncinatus* Freyn, in *Œst. bot. Zeit.*, 26, p. 129. — Col de San Léonardo, au-dessus de San Martino di Lota (Rotgès).

R. PYRENEUS L. Mant., 248. — Vallée de l'Erco, dans le Niolo (Audigier). — Signalé au mont Nino, en 1838, par Romagnoli, dans son *Guide pour les naturalistes en Corse* (1); non mentionné depuis par les auteurs qui ont écrit sur la flore de cette île.

R. FLAMMULA L. — Entre le col de Sorba et Ghisoni (Mand. et Fouc.).

AQUILEGIA BERNARDI G. G. — Forêt de Valdoniello (Audigier).

FUMARIA MURALIS Sond., form. stat. *confusa* Rouy et Fouc., *Fl. Fr.*, 1, p. 175; *F. CONFUSA* Jord., *Cat. gr. Dijon*, 1848. — Bastia (Mand. et Fouc.).

BISCUTELLA ROTGESII Fouc. (pl. 1). — Souche ligneuse, rameuse, tortueuse. Tiges de 3-4 décimètres, grêles, sinueuses, fragiles, hispides inférieurement et munies dès la base de rameaux grêles, allongés, dressés ou étalés. Feuilles oblongues, rudes et hérissées, grossièrement dentées; les radicales courtement atténuées en pétiole; les caulinaires

(1) Je dois la communication de ce travail à l'extrême obligeance de M. Romagnoli, de Bastia, petit-fils du botaniste en question.

Dans ce Catalogue manuscrit, Romagnoli, qui a beaucoup herborisé en Corse, a classé par ordre alphabétique toutes les plantes qu'il a observées et qui figurent dans son herbier, lequel appartient au Musée de la ville d'Ajaccio.

Un bon nombre de plantes que l'on croyait n'avoir pas encore été signalées en Corse sont notées sur cette liste et, parmi ces plantes, figurent celles de la liste ci-dessous mentionnées dans « *Trois semaines d'herborisations en Corse* » :

Arenaria viscidula Thuil.

— *serpyllifolia* L. var. *glutinosa* Koch.

Galium Aparine L.

Potamogeton plantagineum Duer.

Phleum asperum Willd.

Avena sterilis L.

Festuca elatior Sm.

Lolium arvense With.

sessiles, peu nombreuses. Fleurs formant une grappe spiciforme lâche atteignant à la fin jusqu'à 14 centimètres de longueur; pédicelles deux fois et demie environ plus longs que la silicule; sépales ovales-oblongs, dressés; pétales étroits, dressés, une fois plus longs que les sépales. Silicules arrondies, scabres, larges de 8-9 millimètres, à échancrure très ouverte; style de 3-4 millimètres de longueur. Graines lisses. ♀. Rochers schisteux. — Ghisoni (28 mars 1898), Ghisonaccia (14 janvier 1899) (Rotgès).

A Belgodère, j'ai observé, en mai 1896, un *Biscutella* peu avancé qui paraît appartenir à la même espèce.

LEPIDIUM GRAMINIFOLIUM L. var. *glaucescens* Gillot, *Bull. Soc. bot. Fr.*, 34, p. 6. — Ghisoni (Rotgès).

ALYSSUM MARITIMUM Lamk, var. *densiflorum* Lange, *Pugill.*, p. 263. — Bord de la mer à Aléria (Rotgès).

CAKILE MARITIMA Scop., form. stat. *ægyptiaca* Rouy et Fouc., var. *Bauhini* R. et F., *Fl. Fr.*, 2, p. 70. — Cap Corse à Santa Sévera (Mand. et Fouc.); Aléria (Rotgès).

* BRASSICA NIVEA Boiss. et Sprun. *Diagn.*, sér. 1, I, p. 72. — Rochers près de Ghisoni où il a été découvert par M. Rotgès. N'avait encore été observé qu'en Grèce.

ARABIS ALPINA L. var. *declinata* Rouy et Fouc. (*l. c.*, 1, p. 224); *A. declinata* Tausch, in *Flora*, 1832. — Mont Renoso, forêt de Marmano, près de Ghisoni (Rotgès).

* CARDAMINE RESEDIFOLIA L. var. *platyphylla* Rouy et Fouc., *l. c.*, p. 421. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

C. GRÆCA L. var. *corsica* Nym. *Consp. Fl. eur.*, p. 38. — Ravin de Gialgone dans la forêt de Marmano, près de Ghisoni (Rotgès).

VIOLA CANINA Fries, *Mant.*, 3, p. 122. — Ilots et bord du Golo entre Sidoni et Pont Alto (Audigier). — Indiqué en Corse, au « Lago di Nino, 1842 » par Romagnoli (*l. c.*) et par Ces. Pass. et Gib. (*Comp. dell. Fl. Ital.*, 2, p. 805). De Marsilly (*Cat. pl. Cors.*), Gren. et Godr. (*Fl. Fr.*) et Rouy et Fouc. (*l. c.*) ne mentionnent pas ce *Viola*.

* V. TRICOLOR L., form. stat. *arvensis* R. et F. var. *variata* Rouy et Fouc. (*l. c.*, 3, p. 44). — Moissons près de Corté (Mand. et Fouc.).

* CISTUS LAURIFOLIUS L. — Forêt domaniale de Marmano, près de Ghisoni (Rotgès).

C. SALVIFOLIUS L. var. *cymosus* Willk., *l.c.*, t. 92, f. 2; *Exsicc. Soc. Rochel.*, n° 4216; Fouc. et Sim. *Trois sem. herb. Corse*, p. 167. — Tattone, Ghisoni (Mand. et Fouc.). — Croît aussi dans la Charente-Infé-

rière, où je l'ai découvert en 1897. C'est cette plante qui, dans la *Fl. de Fr.* de G. Rouy et J. Fouc., 3, p. 266, est rapportée en var. *occidentalis* au *C. platyphyllus* Timb. (*Fl. Corb.*, p. 69).

HELIANTHEMUM VULGARE Gærtn., form. stat. *Chamæcistus* R. et F., var. *lanceolatum* Rouy et Fouc., *Fl. Fr.*, 2, p. 295. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.).

POLYGALA VULGARIS L., form. stat. *dubia* Rouy et Fouc., *l. c.*, 3, p. 65; *P. DUBIA* Bellyneck, *Fl. nam.*, p. 27. — Tattone (Mand. et Fouc.).

MELANDRYUM MACROCARPUM Willk., *Icon. et descript.*, 1, p. 28. — Tattone (Mand. et Fouc.).

LYCHNIS FLOS-CUCULI L. *Sp.*, 625. — Tattone (Mand. et Fouc.).

DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. subsp. *virgineus* R. et F. var. *gracilis* Fouc. et Mand. — Touffe très feuillée; tiges de 15-35 centimètres, assez grêles, quelques-unes coudées à plusieurs nœuds, toutes simples, uniflores, rarement biflores; feuilles étroites, dépassant quelquefois un décimètre de longueur; écailles calicinales larges, courtes, à acumen très court.

Cette variété se place entre les var. *brevifolius* Rouy et *longifolius* Rouy (*Fl. Fr.*, 3, p. 196). — Rochers du mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.).

* *D. CARYOPHYLLUS* L. subsp. *virgineus* R. et F. var. *brevifolius* Rouy, *Obs. Dianth. Fl. Fr.*, 3, p. 19; *Æsicc. Soc. Rochel.*, n° 3288. — Rochers près du sommet du mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

SAGINA PROCUMBENS L. var. *glacialis* Fouc. et Mand. — Tiges assez courtes donnant naissance à des rosettes de feuilles d'où partent d'autres tiges; feuilles plus ou moins ciliées, courtes, fasciculées; pédoncules quelquefois très courts; capsule petite. — Sommet du Renoso, dans une prairie arrosée par l'eau provenant de la fonte des neiges (Mand. et Fouc.).

S. REVELIERI Jord. et Fourr., *Brev.*, 1, p. 11. — Mont Renoso, Cap Corse à Luri (Mand. et Fouc.); forêt de Marmano (Rotgès).

S. PILIFERA DC. var. *cæspitosa* Fouc. et Mand. — Tiges nombreuses, courtes, rameuses, formant une touffe très serrée, appliquée; feuilles fines, courtes; pédoncules courts; fleurs petites. — Sommet du Renoso, près des glaciers (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ALSINE VERNA Bartl. var. *cæspitosa* R. et F. sous-var. *glandulosa* Rouy et Fouc., *l. c.*, 3, p. 269. — Mont Rotondo (Mabille); mont Renoso (Mand., Rotgès et Fouc.).

ARENARIA SERPYLLIFOLIA L. — Ghisoni (Rotgès).

A. SERPYLLIFOLIA L. subsp. *leptoclados* R. et F. var. *viscidula* Rouy et Fouc., *l. c.*, 3, p. 242. — Le Pigno (Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès).

STELLARIA NEMORUM L. var. *bracteata* Ledeb. *Fl. Ross.*, 1, p. 375. — Bois du ravin de Casso, près de Ghisoni (Rotgès).

CERASTIUM STENOPETALUM Fenzlren, ap. G. et G., *l. c.*, 1, p. 272; *Excicc. Soc. Rochel.*, n° 4222. — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.).

SPERGULARIA RUBRA Pers. var. *virescens* Fouc. et Mand.; *Excicc. Soc. Rochel.*, n° 4225. — Diffère du *S. rubra* Pers. [var. *stipularis* Boiss. (non Rouy) par ses touffes plus lâches, d'une teinte verdâtre; par ses tiges plus grêles, à mérithalles souvent plus allongés; par ses stipules plus blanches, plus étroites; par ses capsules plus courtement pédicellées; par ses graines un peu plus grosses. — Croît au mont Rotondo, de la bergerie du Timozzo jusqu'aux glaciers (Mand. et Fouc.) et près du sommet du Renoso où nous l'avons observé, MM. Rotgès, Mandon et moi.

S. RUBRA Pers. subsp. *arenosa* Fouc. et Sim., *Trois sem. herb. en Corse*, p. 174, pl. 3. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.).

Dans les endroits secs, au bord des chemins, cette plante est plus ou moins agglomérée et souvent très réduite. Nous avons observé cette variation à Tattonne, à Vivario et de Vivario à Ghisoni. Par la culture, j'ai obtenu la plante ordinaire.

LINUM STRICTUM L. var. *spicatum* Pers., *Syn.*, 1, p. 336. — Commun entre Bastia et Cardo, Calvi (Mand. et Fouc.); Piedicorté di Gaggio (Rotgès).

* L. STRICTUM L. var. *alternum* Pers., *Syn.*, 1, p. 336. — Bastia (Mand. et Fouc.).

* L. CORYMBULOSUM Reichb. *Fl. excurs.*, 2, p. 834. — Mont Felce, près de Corté, où il est rare.

L. CATHARTICUM L. *Sp.*, 402. — Environs de Corté (Mand. et Fouc.).

MALVA ROTUNDIFOLIA L. — Ghisoni (Rotgès).

ALTHÆA OFFICINALIS L. var. *corsica* Fouc. et Mand. — Tiges moins épaisses que dans le type, élancées, simples; feuilles à nervures très prononcées, les inférieures obtuses, les supérieures aiguës, à dents étroites, moins profondes; fleurs plus petites, plus longuement pédonculées.

De Marsilly (*Cat. pl. Cors.*, p. 34) dit, au sujet de cet *Althæa*, qu'il



Bernard del.

F. Olivier lith. La Rochelle.

HYPERICUM INSULARE FOUC. & MAND.



a confondu avec le type : « Marais et ruisseaux permanents de la région basse. CC. » Nous l'avons en effet rencontré çà et là, M. Mandon et moi, au cap Corse, dans la plaine d'Aléria et à Ghisonaccia.

HYPERICUM ACUTUM Mœnch subsp. *corsicum* Rouy. et Fouc., *l. c.*, 3, p. 338; *H. corsicum* Steud. *Nomencl.*, p. 787. — Base du Berdato et bord de l'Erco dans le Niolo (Audigier); pozzi du mont Renoso (Rotgès).

H. INSULARE Fouc. et Mand. (pl. 2). — Plante glabre. Souche mince, rameuse. Tiges de 1-3 décimètres, minces, simples ou très courtement rameuses au sommet, quadrangulaires, étroitement ailées ou à angles peu saillants, étalées-ascendantes, radicales à la base. Feuilles glauques en dessous, sessiles ou subsessiles, ovales ou ovales-arrondies, larges de 5-15 millimètres, finement ponctuées-pellucides, surtout les supérieures, à nervures secondaires anastomosées, peu saillantes. Fleurs assez grandes, disposées en cyme serrée, terminale, courte, pauciflore; sépales lancéolés, entiers; pétales jaunes, marqués de lignes plus ou moins rougeâtres, dépassant longuement le calice; étamines plus courtes que les pétales. Capsule ovale, un peu plus courte que les sépales et munie de plusieurs bandelettes longitudinales. ♀. Juillet. Lieux humides, bord des eaux. — Entre le col de Sorba et Ghisoni (Mand. et Fouc.); cascade de la fontaine de Puzzichello, près de Ghisoni (Mand., Rotgès et Fouc.).

LUPINUS MICRANTHUS Guss., *Fl. sic. Prodr.*, p. 400. — Cardo, près de Bastia (Mand. et Fouc.).

* *MEDICAGO CORONATA* Lamk, *Dict.*, 3, p. 634. — Prunelli di Fiumorbo (Pieri).

M. MINIMA L. var. *vulgaris* Urb. s.-var. *canescens* Rouy in Rouy et Fouc., *Fl. Fr.*, 5, p. 41. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

M. GRÆCA Horn., *Enum. hort. Hafn.*, p. 728. — Champs au croisement des routes de Bracollaccia à Saint-Florent (Rotgès).

MELILOTUS NEAPOLITANA Ten., *Fl. neap. Prodr. suppl.*, 1, p. 62. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

* *M. ALBA* Lamk, *Dict.*, 4, p. 63. — Hameau de Rosse, près de Ghisoni (Rotgès).

TRIFOLIUM PHLEOIDES Pourr. subsp. *Audigieri* (pl. 3). — Diffère du type par ses tiges plus grêles, moins raides, la centrale portant, opposé à la feuille supérieure, un rameau étalé à angle droit; par ses capitules courtement coniques et par ses calices à divisions beaucoup plus courtes. — Calacuccia, dans le Niolo (Audigier).

Je possède ce *Trifolium* de Bastelica (Corse), où il a été recueilli par Revelière (12 juin 1866) qui l'a distribué sous le nom de *T. tenuiflorum* Ten.?

T. LAPPACEUM L. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM Vill. var. *insulare* Jord. et Fourr. (*pro specie*), *Brev.*, 2, p. 23. — Bord de la route de Bracolaccia à Saint-Florent (Rotgès).

VICIA SATIVA L. var. *macrocarpa* Mor., *Fl. Sard.*, 1, p. 354. — Le Pigno (Mand. et Fouc.).

LATHYRUS LATIFOLIUS L. var. *corsicus* Rouy in Rouy et Fouc., *Fl. Fr.*, 5, p. 262. — Le Niolo, à Campopiano et à Casamacciola (Audigier); environs de Caporalino (Mand. et Fouc.).

CORONILLA EMERUS L. *Sp.*, 1046. — Rochers du mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.). — Observé par Revelière dans les environs de Vivario (Bor., 3^e, *Note sur pl. cors.*, p. 3).


* *SIBBALDIA PROCUMBENS* L. — Capo al Berdato, dans le Niolo (Audigier).

POTENTILLA FRIGIDA Vill., *Dauph.*, 3, p. 563; *P. verna* L. var. *nana* Caruel, *Fl. Ital.*, 10, p. 88 (p. p.). — Pozzi du Renoso (Rotgès).

P. MANDONI (pl. 4). — Plante couverte de poils apprimés et de poils dressés. Souche épaisse émettant des tiges de 1-3 décimètres, étalées-ascendantes ou dressées, non ou rarement radicales aux nœuds, non stoloniformes, assez épaisses, à mérithalles courts, souvent munies de rameaux plus ou moins courts. Feuilles toutes pétiolées, palmatiséquées, toutes ou presque toutes à 5 lobes oblongs ou obovés en coin, fortement dentés, à dents obtuses, la terminale ordinairement plus petite; stipules largement lancéolées, entières, quelquefois un peu dentées ou incisées. Pédoncules épais, rapprochés et occupant la partie supérieure des tiges, et dépassant longuement les feuilles. Fleurs axillaires, solitaires, grandes; divisions du calicule larges, aiguës, dépassant les sépales; pétales jaunes, dépassant le calice. Achaines lisses, longs d'un millimètre environ. 4. Mai-juillet.

Ce *Potentilla* a l'aspect du *P. reptans* L. avec lequel il a été confondu et dont il diffère surtout par sa villosité; par ses tiges non ou rarement radicales, plus épaisses, non couchées ni stoloniformes; par ses pédoncules bien plus épais, rapprochés; par les divisions du calice plus larges et par ses achaines lisses.

Nous l'avons découvert, M. Mandon et moi, au Pigno, près de Bastia, et M. Rotgès l'a observé à Ghisoni.



Bernard del.

F. Ollivier lith. La Rochelle.

POTENTILLA MANDONI FOUG.

Downloaded by [163.172.139.104] at 12:55 06 June 2016

P. MIXTA Nolte var. *corsica* Fouc. et Sim., *Trois sem. herb. Cors.*, p. 178. — Forêt de Vizzavona (Mand. et Fouc.).

* SORBUS AUCUPARIA L. var. *glabra* Burn., *Fl. Alp.-marit.*, 3, p. 168. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

EPILOBIUM ALPINUM L. var. *nutans* Tausch (*pro specie*), *Bot. Zeit.*, 1828, p. 462 (*non Horn.*). — Mont Renoso (Mand., Rotgès et Fouc.).

E. SPICATUM Lamk, *Fl. Fr.*, 3, p. 482. — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.); forêt de Marmano au bord du ravin de Gialgone (Rotgès).

LYTHRUM SALICARIA L. s.-var. *pubescens* Coss. et Germ., *Fl. Par.*, p. 188. — Environs de Calvi (Mand. et Fouc.).

PEPLIS PORTULA L. *Sp.*, 474. — Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.).

CORRIGIOLA LITTORALIS L. *Sp.*, 388. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

SCLERANTHUS DELORTI Gren., *Arch. Fl. Fr. et All.*, 1, p. 206, n° 4. — Ghisoni (Rotgès); Tattone (Mand. et Fouc.).

* S. PERENNIS L. var. *marginatus* Ces. Pass. et Gib., *Comp. del. Fl. Ital.*, 2, p. 639. — Mont Renoso (Rotgès).

LASERPITIUM PANAX Gouan var. *glabratum* G. et G., *Fl. Fr.*, I, p. 683. — Col de Sorba entre Vivario et Ghisoni (Mand. et Fouc.).

PEUCEDANUM OSTRUTHIUM Koch, *Umb.*, 95. — Mont Renoso (Mand., Rotgès et Fouc.).

PASTINACA LUCIDA Gouan, *Illustr.*, p. 19, t. 11 et 12; *Exsicc. Soc. Rochel.*, n° 4257. — Cardo, près de Bastia (Mand. et Fouc.).

LIGUSTICUM CORSICUM Gay, *Coron. Endress.*, p. 34. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ENANTHE PIMPINELLOIDES L. var. *major* Fouc. et Mand. — Fibres radicales renflées-fusiformes; tiges épaisses, élevées; segments des feuilles caulinaires très allongés; rayons de l'ombelle atteignant 3 centimètres de longueur. — Environs du séminaire de Corté (Mand. et Fouc.).

Œ. FISTULOSA L. *Sp.*, 365. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

BUPLEURUM ARISTATUM Bartl. in Rehb., *Icon.*, 2, p. 70, tab. 178. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.).

* B. FILICAULE Brot., *Fl. Lusit.*, 1, p. 452? — Je rapporte avec doute à cette espèce un *Bupleurum* peu avancés, à involucre, 3-fides et à fruits égalant leurs pédicelles, que M. Mandon et moi avons observé dans des buissons au sommet du mont Felce.

CHÆROPHYLLUM TEMULUM L. *Sp.*, 370. — Bords du Mezzano, près de

Corté (Mand. et Fouc.). — Parlatore (*l. c.*, p. 367) cite en Corse plusieurs localités de cette plante omise par Gren. et Godr. (*l. c.*) et par de Marsilly (*l. c.*).

CONIUM MACULATUM L. var. *aromaticum* Fouc. et Rotgès. — Odeur agréable rappelant celle de l'*Anethum graveolens* L. — Jardins à Ghisoni (Rotgès). — Boreau (2^e Note sur pl. Corse, p. 6) cite à Aullène un *Artemisia Absinthium* dont l'odeur est « bien différente de celle de l'Absinthe ordinaire ».

SAMBUCUS EBULUS L. — Forêt de Vizzavona (Mand. et Fouc.) — Feuilles à segments une fois plus longs que dans le type.

GALIUM DIVARICATUM Lamk, *Dict.*, 2, p. 580. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.).

G. DECIPIENS Jord., *Obs. sept.*, 1846, p. 178; *Exsicc. Soc. Rochel.*, n° 3079. — Corté (Mand. et Fouc.).

VALERIANA TRIPTERIS L. var. *intermedia* Koch, *Syn.*, ed. 2, p. 370. — Sommet du mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.); bords du ravin de Gialgone, près de Ghisoni (Rotgès).

VALERIANELLA MICROCARPA Lois., *Not.*, 151 et *Fl. Gall.*, 1, p. 26, excl. syn. L. (*non Soyer-Will.*). — Ghisoni (Rotgès).

* **V. MORISONII** DC. var. *mixta* Soyer-Will., *Mém. Acad. Nancy* (1829), 69. — Mont Felce (Mand. et Fouc.).

* **ERIGERON UNIFLORUS** L. *Sp.*, 1211. — Sommet du mont Cinto (Audigier).

BELLIS BERNARDI Boiss. et Reut., *Pugil. pl. nov. Afr. bor. et Hispan.*, p. 56. — Prairies du sommet du Rotondo, où il a été découvert par Bernard, qui l'a confondu avec le *Bellium nivale* Req. C'est ce *Bellis* que de Marsilly (*Cat. pl. Cors.*, p. 79), à la suite des localités du *Bellis perennis*, désigne ainsi : « Une forme singulière abonde dans les prairies des monts Renoso et Rotondo (E. Rev.) ». M. Rotgès a recueilli aussi cette plante au Renoso.

BELLIUM BELLIDIODES L. var. *nivale* Req. (*pro specie*), *Ann. sc. nat.*, sér. 1, tome V, p. 833. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.). — Dans les prairies mouillées, cette plante a la racine simple ou divisée, non stolonifère; dans les endroits découverts, un peu secs, elle a de courts stolons et établit le passage au type.

ARONICUM SCORPIOIDES DC. *Prodr.*, 6, p. 319. — Massif du Renoso (Rotgès).

SENECIO LIVIDUS L. — Fontaine de Puzzichello, près de Ghisoni (Rotgès).

LEUCANTHEMUM TOMENTOSUM G. et G., *Fl. Fr.*, 2, p. 144. — Col de France entre Capo-Fucciata et Porta-Artica, dans le Niolo (Audigier).

* FILAGO LUTESCENS Jord., *Obs. pl. Fr. fragm.*, 3, p. 201, t. 7, F B. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.).

F. ERIOCEPHALA Guss., *Pl. rar.*, p. 344, t. 69. — Moissons près de Corté (Mand. et Fouc.).

F. LAGOPUS Steph. in Willd., *Sp.*, 3, p. 1897. — Vallée de la Restonica, Tattone, de Vivario au col de Sorba (Mand. et Fouc.).

* ONOPORDON ACANTHIUM L., *Sp.*, 1558. — Ghisoni (Rotgès).

LEUZEA CONIFERA DC., *Fl. fr.*, 4, p. 109. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.).

CARLINA MACROCEPHALA Moris, *Stirp. sard. el.*, 2, p. 5. — Vallée du Mezzano, près de Corté (Mand. et Fouc.).

* C. SICULA Ten. var. *purpurascens* Guss., *Fl. sic.*, 2, p. 433. — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.).

* LAMPSANA COMMUNIS L. var. *hirta* Guss., *Fl. sic.*, 2, p. 424 (*non* Ten.); an *L. macrocarpa* Coss.? — Forêt de Marmano (Rotgès).

HYPOCHÆRIS PINNATIFIDA Cyrill. ex Ten., *Syll.*, p. 406. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ROBERTIA TARAXACOIDES DC. var. *hirta* Fouc. et Mand. — Diffère du type par son calice fortement hérissé, grisâtre. — Entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.); forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

PRENANTHES PURPUREA L. *Sp.*, 1121. — Ghisoni (Rotgès).

* HIERACIUM PILOSELLA L. var. *stolonosissimum* Arv.-Touv., *Catal. form. subcanescens* Arv.-T., *l. c.* (1). — Forêt de Marmano (Rotgès).

* H. AURICULA L. var. *subvittatum* Arv.-T., *Cat.*, form. A.-T., *l. c.* — De Vivario au col de Sorba, vallée de la Restonica (Mand. et Fouc.).

* H. SERPYLLIFOLIUM Fries, *Epic.*, p. 19, form. A.-T., *l. c.* — Mont Renoso (Mand., Rotgès et Fouc.).

* H. FLORENTINUM All. var. *subfallax* Arv.-T., *Cat.*, forma Arv.-T., *l. c.* — Vivario (Mand. et Fouc.); Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* H. BERARDIANUM Arv.-T., *Hier. Alp. fr.*, p. 50, form. Arv.-T., *l. c.* — Mont Rotondo, de Vivario à Ghisoni (Mand. et Fouc.).

(1) La détermination de ces *Hieracium* est due au savant spécialiste M. Arvet-Touvet, dont j'ai souvent mis à contribution l'obligeance si avantageusement connue. Qu'il me permette de lui exprimer mes bien sincères remerciements.

* *HIERACIUM BERARDIANUM* Arv.-T. var. *subamplexicaule* Arv.-T., *Hier. Alp. fr.*, p. 51, forma Arv.-T., *l. c.* — Forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

* *H. PRÆCOX* Sch.-B., *Ann. Pollichia*, 9, p. 44, forma Arv.-T., *l. c.* — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.).

* *H. VIRGA-AUREA* Coss., *Suppl.*, 9, forma Arv.-T., *l. c.* — Forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

* *H. ROTGESIANUM* Arv.-T., *Cat.*, forma Arv.-T., *l. c.* — Forêt de Casamente, près du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc.); forêt domaniale de Marmano, près de Ghisoni (Rotgès).

* *H. EXILENTUM* Arv.-T., *Hier. Alp. fr.*, p. 90. — Forêt de Vizzavona (Mand. et Fouc.).

* *H. VISCOSUM* Arv.-T. α . *genuinum* Arv.-T., *H. Alp. fr.*, p. 107, forma Arv.-T., *l. c.* — Forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

* *H. BOREALE* Fries var. *subglaucescens* Arv.-T., *Cat.*, forma Arv.-T., *l. c.* — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

XANTHIUM FUSCESCENS Jord. et Four., *Breviar.*, 1, p. 36. — Ghisoni (Rotgès).

ARBUTUS UNEDO L. var. *angustifolia* O. Deb., *Fl. rég. médit.*, p. 91. — Environs de Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.).

PIROLA CHLORANTHA Sw., *Act. Holm.*, 1810, p. 190. — Forêt entre Vivario et le col de Sorba (Mand. et Fouc.); forêt de Marmano (Rotgès).

MONOTROPA HYPOPITYS L. — Forêt entre Vivario et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

CHLORA SEROTINA Koch, *Syn.*, ed. 2, p. 558. — Lieux humides près de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

* *CUSCUTA TRIFOLII* Bab. et Gib., *Phyt.*, 1, p. 467. — Luzernières près de Corté (Mand. et Fouc.).

C. EUROPÆA L. *Sp. (excl. var. β)*. — Forêt de Marmano près de la maison forestière (Rotgès).

MYOSOTIS SOLEIROLII G. et G., *Fl. Fr.*, 2, p. 534. — Forêt de Casamente, dans le ravin du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

PHYSALIS ALKEKENGII L. *Sp.* — Vignes près de Prunelli di Fiumorbo (Pieri).

* *ATROPA BELLADONA* L. *Sp.* — Forêt de Vizzavona où il nous a été montré par M. Mabaret, conservateur des forêts.

* *EUPHRASIA NEMOROSA* Pers. var. *parviflora* Soy.-Willm., *Mém.*

Soc. Nancy (1833-34), p. 27. — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.); mont Renoso (Rotgès).

CALAMINTHA GRANDIFLORA Mœnch, *Meth.*, 408. — Forêt de Marmano (Rotgès).

C. GLANDULOSA Benth., in DC. *Prodr.*, 12, p. 227. — Forêt de Casamente, près du Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ROSMARINUS OFFICINALIS L. var. *angustissimus* Fouc. et Mand. — Arbuste peu élevé, à rameaux courts, denses; feuilles très étroites, atteignant au plus un millimètre de largeur. — Cardo, près de Bastia (Mand. et Fouc.).

SALVIA SCLAREA L. Sp., 38. — Environs de Caporalino (Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès). — Noté en 1839, par Romagnoli (*Guide nat. en Cors.*), à Silvarenio et à Venzalasco; non signalé par Gren. et Godr. (*Fl. Fr.*), ni par de Marsilly (*Cat. pl. Corse*).

NEPETA AGRESTIS Lois., *Not.*, p. 25 et *Fl. Gall.*, 2, p. 8. — Forêt de Casamente, dans le ravin du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

GLECHOMA HEDERACEA L. var. *hirsuta* Godr. *Fl. Lorr.*, 2, p. 193. — Poggio di Mazza (Rotgès). — Observé par Romagnoli (*l. c.*), en 1841, à San Angelo; omis par Gren. et Godr. (*l. c.*) et par de Marsilly (*l. c.*).

LAMIUM LONGIFLORUM Ten., *Fl. nap. Prodr.*, p. 34. — Forêt de Marmano (Rotgès).

L. BIFIDUM Cyr., *Pl. rar. neap.*, fasc. 1, p. 27, t. 7. — Forêt de Marmano, près de Ghisoni (Rotgès).

TEUCRIUM MARUM L. var. *capitatum* Fouc. et Mand. — Tiges munies supérieurement de rameaux très courts, les inférieurs souvent stériles, les supérieurs portant une grappe dense assez courte de fleurs très courtement pédicellées.

Cette plante, qui est peut-être un hybride des *T. Marum* et *capitatum* (*T. Maro-capitatum*), diffère, en outre, du type par ses tiges plus blanchâtres, par ses calices plus courts, plus grisâtres, à dents moins longues et plus velues jusqu'au sommet. Elle croît au mont Felce, près de Corté, en compagnie du *Teucrium capitatum* L.

* *PLANTAGO ARENARIA* Waldst. et Kit., *Rar. Hung.*, p. 51, t. 51. — Dunes près de Calvi (Mand. et Fouc.).

CHENOPODIUM BONUS-HENRICUS L. var. *microphyllum* Fouc. et Mand. — Tiges de 2-3 décimètres, faibles, à feuilles beaucoup plus petites que dans la plante ordinaire, à pétiole grêle; épi allongé, mince. — Mont Rotondo, à la bergerie du Timozzo (Mand. et Fouc.).

RUMEX FRIESII G. et G., *Fl. Fr.*, 3, p. 36. — Environs de Corté

(Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès). — Cité par Romagnoli (*l. c.*), à Miomo, Bastia, en 1845, sous le nom de *R. obtusifolius* Gærtn.; non signalé par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*).

R. CONGLOMERATUS Murr., *Prodr. Gott.*, p. 52. — Près du séminaire de Corté (Mand. et Fouc.). — Signalé vaguement en Corse par Ces. Pass. et Gib. (*Comp. del. Fl. Ital.*, 2, p. 243); omis par Gren. et Godr. (*l. c.*) et par de Marsilly (*l. c.*); signalé par Romagnoli (*l. c.*), en 1837, à Bastia, sous le nom de *R. Nemolapathum* L.

DAPHNE LAUREOLA L. *Sp.*, 510. — Près du village de Poggio di Mazza (Rotgès).

D. OLEOIDES L. *Sp.*, 425. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

EUPHORBIA INSULARIS Boiss., in DC. *Prodr.*, 15, pars 2, p. 122. — Forêt de Vizzavona (Mand. et Fouc.).

* *ALNUS BREMBANA* Rota, *Prosp. del. Fl. di Berg.*, p. 79; *A. viridis* DC. var. *microphylla* Ces., *Fl. exs.*, ap. Hohenaker. — Forêt de Vizzavona (Mand. et Fouc.).

Je possède cet *Alnus* sous le nom de *A. viridis* DC., du Lautaret (Hautes-Alpes) et du mont Brison (Haute-Savoie).

TAXUS BACCATA L. *Sp.* — Forêt de Lugo di Mazzo (Rotgès).

NARTHECIUM REVERCHONI Celak., *Bull. Soc. bot. Fr.*, 37, p. 20. — Forêt de Casamente, sur les rochers du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

* *ORNITHOGALUM DIVERGENS* Bor. form. stat. *proliferum* Jord. et Four. (*pro specie*), *Brev.*, 1, p. 57 et *Icon.*, p. 29, pl. 73, f. 118. — C. à Ghisonaccia (Rotgès).

GAGEA CORSICA Jord. et Four., *Brev.*, 1, p. 58. — Ghisoni (Rotgès).

ALLIUM AMPELOPRASUM L. *Sp.* — Cap Corse avant d'arriver à Sisco (Mand. et Fouc.). — Signalé ni par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*); mentionné sans indication de localité par Parlature (*Fl. Ital.*, 2, p. 577).

* *A. SPHÆROCEPHALUM* L. var. *bulbilliferum* Lor. et Barr., *Fl. Montp.*, éd. 2, p. 471. — Cardo, où la plante est rare (Mand. et Fouc.). — Le type n'a pas encore été signalé en Corse; il croît en Sicile d'après Ces. Pass. et Gib. (*Comp. del. Fl. Ital.*, 1, p. 142).

A. SCHÆNOPRASUM L., *Sp.*, 432. — Rochers de la vallée du Mezzano, près de Corté (Mand. et Fouc.).

A. SCHÆNOPRASUM L. var. *nivale* Fouc. et Mand. — Hampe de 5-10 centimètres, recourbée-étalée, grêle; feuilles courtes et recourbées-éta-

lées. — Sommet du Rotondo, dans les endroits découverts où a séjourné la neige (Mand. et Fouc.).

A. OLERACEUM L. Sp. — Environ de Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.).

HYACINTHUS POUZOLZII Gay ex Lois., in *Mém. Soc. bot. Linn. Paris* (1827). — Mont Renoso, jusqu'au sommet dans les endroits découverts (Rotgès, Mand. et Fouc.).

MUSCARI BOTRYOIDES DC., *Fl. Fr.*, 3, p. 208 (non Mill.). — Ghisonaccia (Rotgès).

ORCHIS PAPILIONACEA L. var. *rubra* Barl. *Iconogr. Orch.*, p. 43. — Cap Corse au col de San Léonardo (Rotgès).

O. MACULATA L. Sp., 1335. — Forêt de Casamente, au bord du torrent de Casso (Mand., Rotgès et Fouc.); Ghisoni (Rotgès). — Non signalé en Corse par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*). — Observé près de Sartène par Requier (Parlat., *Fl. Ital.*, 3, p. 517).

POTAMOGETON MUCRONATUS Schrad., Aschers. *Fl. Brand.*, p. 464. — San Sévera, environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

* SPARGANIUM NEGLECTUM Beeby, *Journ. of Bot.*, 1885, p. 26, tab. 258. — Cap Corse, au marais de Sisco (Mand. et Fouc.).

JUNCUS EFFUSUS L. var. *insularis* Fouc. et Mand. — Diffère du *J. effusus* par ses chaumes fermes, plus allongés, moins épais et renfermant peu de moelle. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

J. ACUTUS L. var. *decompositus* Guss., *Enum. pl. inarim.*, p. 345. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia; çà et là dans la partie septentrionale de l'île (Mand. et Fouc.).

J. INFLEXUS L. Sp., éd. 1, p. 326; *J. glaucus* Ehrh., *Beitr.*, 6, p. 83. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.). — Gren. et Godr. (*l. c.*), ni de Marsilly (*l. c.*) ne signalent cette plante en Corse; Parlatore (*Fl. Ital.*, 2, p. 324) l'y mentionne vaguement.

* J. PANICULATUS Hoppe. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

J. LAMPOCARPUS Ehrh. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* J. ANCEPS Laharpe, in *Mém. Soc. nat.*, 3, p. 126. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.).

J. REQUIENII Parlat., *Fl. Ital.*, 2, p. 346. — Lieux humides entre

Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.); mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

J. OBTUSIFLORUS Ehrh. var. *laxus* Mand. et Fouc. — Tiges robustes; panicule lâche, peu fournie, souvent dépassée par la feuille du haut de la tige. — Lieux humides près de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.); Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* LUZULA FLAVESCENS Gaud., *Fl. Helv.*, 2, p. 564. — Mont Felce, près de Corté, forêt de Vizzavona, mont Rotondo (Mand. et Fouc.).

* L. MULTIFLORA Lej., *Fl. Spa*, 1, p. 169. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* L. MULTIFLORA Lej. var. *nigricans* G. G., *Fl. Fr.*, 3, p. 356. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.); Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

CYPERUS BADIUS Desf., *Fl. Atl.*, 1, p. 45, tab. 7. — Corté (Mand. et Fouc.).

* SCIRPUS HOLOSCHÆNUS L. var. *romanus* Koch, *Syn.*, ed. 2, p. 857. — Calvi (Mand. et Fouc.).

S. SETACEUS L. (*non* L. Mant.). — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

S. CÆSPITOSUS L., form. stat. *minutus* Fouc. et Mand. — Tiges très grêles, hautes de 3-5 centimètres.

Croît dans les prairies du sommet des monts Rotondo et Renoso (Mand. et Fouc.); mont Cinto (Audigier).

CAREX LEPORINA L. — Tattone (Mand. et Fouc.).

C. REMOTA L. *Sp.*, 1381. — Bords du Mezzano, près de Corté; entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

C. GOODENOWII Gay, form. stat. *intricata* Tin. et Parlat. (*pro specie*), *Fl. Ital.*, 2, p. 185. — Mont Rotondo, mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

C. PALLESCENS L. — Mont Felce, près de Corté, entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

C. PRÆCOX Jacq., form. stat. *insularis* Christ (*pro varietate*), in Barb. *Fl. sard. Comp.*, p. 64, tab. 1. — Mont Rotondo (Mand. et Fouc.).

C. FRIGIDA All., *Fl. Ped.*, 2, p. 370. — Mont Renoso et bord du torrent de Casso, dans la forêt de Casamente (Rotgès, Mand. et Fouc.).

* C. CÆDERI Ehrh., *Calam.*, n° 79. — Entre Vivario et le col de Sorba (Mand. et Fouc.); mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

C. CÆDERI Ehrh., form. [stat. *minuta* Fouc. et Rotgès. — Tiges de

3-4 centimètres, grêles, peu dépassées par les feuilles. — Prairies du sommet du Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

C. PUNCTATA Gaud., *Agrost.*, 2, p. 152. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

BALDINGERA ARUNDINACEA Dum., form. stat. *Rotgesii* Fouc. et Mand.; *B. arundinacea* Dum. var. *Rotgesii* Husnot, *Monogr. Gram.*, p. 87. — Chaumes grêles; feuilles glaucescentes; ligule saillante; panicule grêle, courtement rameuse, courte; glumes lancéolées, à nervures vertes nettement marquées; glumelles lancéolées, munies de longs poils et ciliées au sommet. — Forêt de Casamente, au bord du torrent de Casso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ANTHOXANTHUM ODORATUM L. — Ghisoni (Rotgès). — Non signalé en Corse par Gren. et Godr. (*l. c.*) et indiqué avec doute à Vico par de Marsilly (*Cat. pl. Cors.*, p. 159). Parlatore (*Fl. Ital.*, 1, p. 59) dit l'avoir reçu de Requier, mais il est possible qu'il s'agisse de la plante des monts Rotondo et Renoso, qui, depuis, a constitué la var. *majus* Hackel.

A. ODORATUM L. var. *majus* Hackel in Husnot, *Monogr. Gram.*, p. 2, t. 1. — Sommet des monts Rotondo (Mand. et Fouc.) et Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

PHLEUM ASPERUM Jacq., *Coll.*, 1, p. 110. — Lieux arides des environs de Caporalino (Mand. et Fouc.).

Dans le maquis, près des rochers de Caporalino, nous avons recueilli des échantillons de cette plante, très grêles et atteignant de 2 à 3 centimètres de hauteur. Un semis a reproduit la plante ordinaire.

* *P. ALPINUM* L. var. *commutatum* Husn., *Monogr. Gram.*, p. 7, t. 3, f. 4; *P. commutatum* Gaud., *Agrost.*, 1, p. 40. — Mont Renoso (Rotgès, Mand. et Fouc.).

ALOPECURUS BULBOSUS L. *Sp.*, 1665. — Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* *AGROSTIS CANINA* L. — Prunelli di Fiumorbo (Mand. et Fouc.).

ARISTELLA BROMOIDES Bertol. (*Fl. Ital.* 1, p. 690). — Corté (Mand. et Fouc.). — Signalé en Corse, sans indication de localité, par Parlat. (*Fl. Ital.*, 1, p. 170), omis par Gren. et Godr. (*l. c.*) et par de Marsilly (*l. c.*).

MILIUM EFFUSUM L. — Buissons près de la bergerie du Timozzo, au mont Rotondo (Mand. et Fouc.). — Découvert par Requier dans le bois de Pertuato (Parlat., *l. c.*, 1, p. 1551); non signalé par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*).

Dans les montagnes, les endroits élevés, cette plante a la panicule moins large que dans la plaine.

DESCHAMPSIA FLEXUOSA Gris., *Spic. Fl. Rum. et Bit.*, 2, p. 437. — Vallée de la Restonica (Mand. et Fouc.).

TRisetum BURNOUFII Req. in Parlat., *Fl. Ital.*, 1, p. 263; Fouc. *Rech. sur Trisetum Burnoufii* in *Bull. herb. Boiss.*, 7, n° 9, sept. 1899, et *Bull. Soc. bot. Fr.*, t. XLVI (1899), p. 292. — Corté et environs, mont Felce, vallée de la Restonica, près du Rotondo, Caporalino et environs de la forêt de Vizzavona, à Vivario (Mand. et Fouc.); Ghisoni et environs (Rotgès); de Calacuccia à Cuccia, Santa-Regina, pont de Castirla, vallée du Terrigolo, col de Croce d'Albitro, Castiglione, mont Cinto, mont Berdato jusqu'à 1600 mètres d'altitude, vallée du Tavignano (Audigier).

Ce *Trisetum*, considéré comme spécial à la Corse où on le trouvera sur beaucoup d'autres points, existe aussi en Sardaigne et en Sicile (Fouc. l. c.) où il a été confondu avec le *T. flavescens* P. B. et sa var. *splendens* Presl (*pro specie*).

GLYCERIA PLICATA Fries, *Mant.*, 3, p. 176. — Ghisoni (Rotgès).

G. SPICATA Guss., *Syn.*, 2, p. 784. — Entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

POA NEMORALIS L. var. *rigidula* G. et G., *Fl. Fr.*, 3, p. 541. — Forêt entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

POA NEMORALIS L. var. *alpina* G. et G., *Fl. Fr.*, 3, p. 541. — Forêt entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.).

P. EXIGUA Fouc. et Mand. in Husnot, *Monogr. Gram.*, p. 88, tab. 33 (pl. 5). — Plante petite, lâchement cespiteuse. Tiges de 1-5 centimètres, ascendantes, striées, molles, grêles. Feuilles molles, courtes, planes, linéaires, aiguës ou subaiguës, glabres; gaines striées; ligule courte, tronquée. Panicule courte (5-10 millimètres), à rameaux simples, le plus souvent solitaires, capillaires, lisses ou peu rudes, plus courts que l'épillet; épillets 2-8, ovales, panachés, à 4-8 fleurs lâches, glabres. Glumes inégales, ovales, obtuses, rarement subaiguës; l'inférieure plus courte, égalant du cinquième au quart de la longueur de l'épillet; glumelles égales ou peu inégales; l'inférieure à nervures assez saillantes, hyalines tout autour, obtuse-arrondie et érodée au sommet; la supérieure ciliée sur les bords. ♀. Juillet-août.

Ce *Poa* est intermédiaire entre le *Poa alpina* L. et le *P. laxa* Hænk. Il croît près du sommet du Rotondo, dans une prairie arrosée par l'eau provenant de la fonte des neiges des glaciers. Il doit exister sur d'autres hauts sommets de la Corse.



Bernard del.

F. Olivier lith. La Rochelle

POA EXIGUA FOUQ. & MAND.

* *P. COMPRESSA* L. *Sp.*, 101. — Maquis des environs de Caporalino (Mand. et Fouc.); forêt de Marmano (Rotgès).

* *DACTYLIS GLOMERATA* L. var. *maritima* Hack., *Gram. Port.*, p. 23. — Falaises près de Calvi (Mand. et Fouc.).

VULPIA CILIATA Link, *Hort. Ber.*, 1, p. 147. — Ghisoni (Rotgès).

FESTUCA HETEROPHYLLA Lamk, *Fl. Fr.*, 3, p. 600. — Le Pigno et entre Ghisoni et le col de Sorba (Mand. et Fouc.). — Non signalé en Corse par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly; indiqué par Parlatores (*l. c.*, p. 438) sans indication de localité.

* *F. VARIA* Hænk. subsp. *sardoa* Hackel in W. Barbey, *Fl. sard. Comp.* p. 69. — Monts Rotondo et Renoso (Mand. et Fouc.).

F. FENAS Lag., *Gen. et Sp.*, p. 4. — Mont Felce, près de Corté (Mand. et Fouc.); forêt domaniale de Marmano, Caniccia, près de Ghisoni (Rotgès).

* *F. GIGANTEA* Vill., *Dauph.*, 2, p. 110. — Forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

BROMUS TECTORUM L. — Entre Vivario et le col de Sorba (Mand. et Fouc.). — Non indiqué par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*); mentionné vaguement par Parlatores. (*l. c.*, p. 409).

* *ELYMUS EUROPÆUS* L., *Mant.*, 35. — Forêt de Valdioniello et parmi les rochers du premier affluent de la droite du Golo sous Calacuccia (Audigier); forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

AGROPYRUM SCIRPEUM Presl, *Cyp. et Gram. Sic.*, p. 49. — Calvi (Mand. et Fouc.).

* *A. ACUTUM* Rœm. et Sch. *Syst.*, 2, p. 751. — Dunes près de Calvi (Mand. et Fouc.).

* *A. CANINUM* Rœm. et Sch., *l. c.*, 2, p. 756. — Puzzichello, près de Ghisoni (Rotgès, Mand. et Fouc.); forêt domaniale de Marmano (Rotgès).

LOLIUM TEMULENTUM L. — Moissons de la vallée du Mezzano, près de Corté (Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès). — Mentionné vaguement par Parlat. (*l. c.*, p. 135); omis par Gren. et Godr. (*l. c.*) et par de Marsilly (*l. c.*).

L. TEMULENTUM L. var. *ARVENSE* Husn., *Monogr. Gram.*, p. 85; *L. arvense* With., *Arr. Brit.* 168 (non Schrad. nec Guss.). — Hammeau de Rosse, près de Ghisoni (Rotgès).

EQUISETUM ARVENSE L. — Fontaine de Puzzichello, près de Ghisoni (Mand., Rotgès et Fouc.). — Observé dans les environs de Biguglia, en

1848, par Romagnoli (*Guide nat. Cors.*); non indiqué par Gren. et Godr. (*l. c.*), ni par de Marsilly (*l. c.*).

* *EQUISETUM RAMOSISSIMUM* Desf. var. *fastigiatum* F. Hy, *Bull. Soc. bot. Fr.*, 37, p. LX. — Calvi (Mand. et Fouc.).

* *OPHIOGLOSSUM VULGATUM* L. *Sp.*, 1518. — Ghisoni (Rotgès).

NOTOCHLÆNA MARANTÆ R. Br., *Prodr. Nouv.-Holl.*, p. 146. — Environs de la gare de Ponte-Leccia (Mand. et Fouc.); Ghisoni (Rotgès).

* *POLYPODIUM VULGARE* L. var. *bipinnatifidum* de Rey-Pailh., *Foug. Fr.*, p. 80, pl. 40. — Ghisoni (Rotgès).

P. VULGARE L. var. *serratum* Schultz, *Exsicc.*, n° 763. — Ghisoni (Rotgès).

ASPLENIUM MARINUM L. — Rochers près de Calvi (Mand. et Fouc.).

* *A. ADIANTUM-NIGRUM* L. var. *acutum* Poll. in de Rey-Pailh., *Foug. Fr.*, p. 19, pl. 8. — Cap Corse, près de Bastia (Mand. et Fouc.).

* *ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS* L. var. *multifidum* de Rey-Pailh., *Foug. Fr.*, p. 11, pl. 2, f. 3. — Ghisoni (Rotgès).

Explication des planches I à V du volume XLVIII.

Pl. 1. — *Biscutella Rotgesii* sp. nov. — Silicule grossie.

Pl. 2. — *Hypericum insulare* sp. nov.

Pl. 3. — *Trifolium phleoides* Pour. subsp. *Audigieri* (subsp. nov.). — Calice grossi.

Pl. 4. — *Potentilla Mandoni* sp. nov. — Calicule et calice grossis.

Pl. 5. — *Poa exigua* sp. nov. — Épillet, glume et glumelle grossis.

SUR UN FRUIT ANORMAL DE *PIRUS MALUS*; par M. Aug. DAGUILLON.

Qu'il me soit permis de signaler très brièvement à la Société l'observation que j'ai eu récemment l'occasion de faire d'une pomme qui présentait deux particularités intéressantes.

Ce qui avait tout d'abord signalé ce fruit anormal à mon attention, c'était la présence, à l'extrémité de l'axe opposée au pédoncule, d'une touffe de cinq feuilles encore assez bien conservées pour que j'aie pu en faire un croquis assez exact. Leur longueur variait entre 20 et 30 millimètres, leur plus grande largeur entre 7 et 10 millimètres. Chacune d'elles présentait un limbe sessile, de contour un peu irrégulier, légèrement rétréci à sa base et parcouru par une nervure médiane nettement accusée; de part et d'autre couraient deux nervures secondaires, à peu près parallèles