

stimmt sie in der Färbung und Abtönungen mit *f. arctica* überein, unterscheidet sich jedoch dadurch, daß das Mittelband deutlich hellgrün geblieben ist, gleichzeitig ist das Mittelband stark verschmälert, ohne jedoch eingeschnürt oder unterbrochen zu sein. Ich besitze zwei Stück dieser neuen Form, beides ♂. Machnower Busch, Juli 1919.

1 Stück gez. Juni 1920. Larva ex Machnower Busch.

*Mesoleuca albicillata* L. f. *vestata* n. f.

Von E. Dadd, Berlin-Zehlendorf.

Alle Zeichnungselemente haben sich auf Kosten des weissen Mittelfeldes ausgebreitet, so daß letztere nur noch als schmale Binde vorhanden ist. Der braune Costalfleck und der Basalfleck sind beinahe zusammengedrückt. Die subterminal blaue Fleckenreihe ist bedeutend ausgezogen. Die feine Zickzacklinie, die in der Stammform nur ausnahmsweise in seiner ganzen Länge verdoppelt ist und die das äußere Drittel des Flügels abgrenzt, ist in die Mitte des Flügels gerückt, in seiner ganzen Länge verdoppelt und sehr stark ausgebildet, die innere Linie ist besonders stark, dunkelbraun und verdickt sich zu breiten Flecken auf den Adern. Der Basalfleck ist zweimal so groß wie bei der Stammform.

Auf dem Hinterflügel ist die Marginalbinde doppelt so breit wie bei der Nominatform. Die feine Zickzacklinie ist auch bis in die Mitte des Flügels gerückt und schließt den Discalpunkt ein.

Sie stellt eine Weiterentwicklung der Form *costa* Butl. dar, insbesondere durch das starke Hervortreten der Zickzacklinie und die gegenseitige Annäherung der Costal- und Basalflecken.

1 tadelloses ♂ und ein abgeflogenes ♀. Machnower Busch, Juli 1919.

Sitzung vom 25. X. 1920.

*Paramesus reticulatus* (Horváth), eine für Deutschland und die Mark Brandenburg neue Zikade.

Von W. Höhne, Berlin.

Vor einem Jahre etwa war es mir möglich, eine dicht vor den Toren Berlins aufgefundene, für Deutschland und die Mark Brandenburg neue Zikade, den *Coryphaeus Gyllenhalii* Fall. bekannt zu machen. Heute bin ich bereits wieder in der Lage, von derselben Stelle, an der die eben genannte Zikade aufgefunden wurde, eine für Deutschland und die Mark Brandenburg neue Zikade anzuführen. Es ist dies der *Paramesus reticulatus* (Horváth). Er wurde am 26. August 1918 in einem kopulierenden Pärchen in