

Rochefortia oblongata Urb. et Ekm. (spec. nov.). Frutex armatus. Rami hornotini glabri, vetustiores cinerascentes teretes, ramulis in spinas simplices usque 15 mm longas mutatis v. apice semel usque ter pseudodichotome divisis et breviter spinosis. Folia primaria sub spinis decidua, in axillis spinarum ad ramulos non evolutos pauca, petiolis 5—15 mm longis supra anguste v. angustissime sulcatis 0,3—0,4 mm latis suffulta, elliptico-oblonga v. oblonga, inferne sensim angustata, basi acuta v. paullum in petiolum protracta, apice obtusa v. obtusissima, raro emarginata, fere semper ad medium latissima, 2,5—6 cm longa, 0,8—2,2 cm lata, nervo medio supra impresso, subitus prominente, lateralibus utroque latere 6—8 supra prominulis, subitus subimpressis v. obsoletis, margine plana integra, supra in sicco nigrescentia nitida, setulis brevissimis postremo deciduis et bases albidas punctiformes relinquentibus obsita, subtus brunea opaca glabra, chartacea. Inflorescentiae (fructiferae tantum visae) ad ramulos non evolutos in axilla spinae obvios prodeentes, corymbosae, cum pedunculo 7—15 mm longo 0,3—0,4 mm lato 1,5—2 cm longae, 3—6-florae; pedicelli 5—8 mm longi glabri. Calyx fructifer cr. 4 mm diametro. Fructus sphaeroideus, 4 mm longus 5 mm crassus.

Cuba, prov. Oriente prope Santiago de Cuba ad Rio Aguadores, m. Jun. fruct.: n. 9224 (typus), prope Guantánamo ad Caimanera in latere occidentali sinus, m. Nov. fruct.: n. 15748.

Obs. I. In ramulis nonnullis numeri ulterioris corpora lignosa ovata v. cylindracea intus fistulosa circumcirca hamato-spinosa 8—10 mm longa 4—6 mm crassa occurunt aequo modo ac in *R. acanthophora* (DC.) Griseb. leg. EKMÄN n. 17216, verisimiliter deformationes ictu insectorum creatae.

Obs. II. Verisimiliter affinis *R. bahamensis* Britton (ex ins. Baham.) mihi non visae, quae foliis obovatis usque orbicularibus, inflorescentiis 2—4-floris, pedicellis pubescentibus ex descriptione differt.

Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. in Fedde Repert. XIII (1915) p. 472. — *Ehretia spinosa* Jacq. Enum. (1760) p. 14 et Select. Amer. p. 46 tab. 180 f. 18. — Carey de costa Cub.

Cuba, prov. Pinar del Rio in peninsula de Guanahacabibes in sylvis solo calcario inter Remates et Yayales, m. Mart. fruct.: n. 18784. — Margarita, Columbia.

Obs. Planta cubensis cum austro-americanis omnino quadrat.

Tournefortia setifera Urb. et Ekm. (spec. nov.). Alte scandens. Rami hornotini teretes v. superne angulati, setis bruneis