

Clavis taxonum:

1.	Lamina foliorum subtus sparse stellato-pubescentia vel subglabra	<i>Rochefortia victoriniana</i> KLOTZ	
1*.	Lamina foliorum subtus dense stellato-tomentosa		2
2.	Lamina foliorum supra glabra vel sparse stellato-pubescentia et ± glabrescentia		3
2*.	Lamina foliorum supra permanente stellato-pubescentia		4
3.	Lamina foliorum elliptica vel obovata basi rotundata vel obtusa	<i>Rochefortia stellata</i> BRITT. & WILS.	
3*.	Lamina foliorum oblonga vel obovato-oblonga, raro obovata, supra glabra vel subglabra, subtus breviter densissime stellato-tomentosa	<i>Rochefortia septentrionalis</i> KLOTZ	
4.	Lamina foliorum elliptica vel obovata, basi rotundata vel obtusa	<i>Rochefortia stellata</i> BRITT. & WILS.	
4*.	Lamina foliorum oblonga vel lanceolata, basi cuneata vel obtusa, supra distincte tuberculata stellato-pubescentia		5
5.	Rami abbreviatori supra et subtus basis spinarum ex gemmis serialis nascentes, plerumque ramosi <i>Rochefortia stellata</i> BRITT. & WILS. ssp. <i>maisiensis</i> KLOTZ		
5*.	Rami abbreviatori solum supra basi spinarum, Lamina foliorum subtus dimorpho stellato-tomentosa	<i>Rochefortia holguinensis</i> KLOTZ	

Descriptiones taxonum sectionis Stellatae

***Rochefortia stellata* BRITT. & WILS.** in Mem. Torrey Bot. Club 16: 96 (1920)

Lamina foliorum elliptica vel obovato-elliptica, basi rotundata vel obtusa, supra subglabra vel sparse stellato-pubescentia, ± glabrescentia, subtus dense stellato-tomentosa. Flores subsessiles vel breviter pedicellati, 2—9 in apice ramorum abbreviatorum fasciculati.

Typus: Oriente, Ensenada Cabanita, coastal thicket; leg. BRITTON & COWELL, no. 12 634

Distrib.: Cuba orientalis; inter Santiago de Cuba et Maisí; in fruticetis et silvis microphyllis siccis.

ssp. *maisiensis* KLOTZ ssp. nov..

Subspecies nova a typo ramis abbreviatoris supra et subtus basis spinarum nascentibus, laminis angustioribus, basi cuneatis vel obtusis, supra permanente tuberculata stellato-pubescentibus differt.

Rami abbreviatori supra et subtus basis spinarum ex gemmis serialis nascentes, plerumque ramosi. Lamina foliorum obovato-elliptica usque ad lanceolata, basi cuneata vel obtusa, $10 \times 4,5$ — 25×10 mm magna, supra permanente tuberculata stellato-pubescentia, subtus breviter dense stellato-tomentosa. Flores subsessiles vel breviter pedicellati, 3—20 in apice ramorum abbreviatorum fasciculati.

Typus: „Prov. Oriente, Maisí, al pie de la Mesa del Chivo, sobre rocas calizas. Arbusto de 4—5 m de alto.“ Leg. ALAIN & LOPEZ FIGUEIRAS, 30. XII. 1959. No. 7061 HAJB.

Distrib.: Cuba orientalis, Distr. Maisí, in fruticetis siccis.

***Rochefortia victoriniana* KLOTZ spec. nov.**

Species nova Rochefortiae stellatae similis sed laminis foliorum supra sparse setosis stellato-pubescentibusque subtus glabris vel sparsissime stellato-pubescentibus differt. Arbor parva dense ramosa ramis ramulisque primo breviter pubescentibus apice spinosis. Rami abbreviatori ex gemmis serialis supra basis spinarum nascentes. Lamina foliorum ramorum abbreviatorum coriacea obovata vel elliptica, apice rotundata vel emarginata, basi rotundata, 14×8 ad 38×21 mm magna (lamina fo. ram. elongata).