

torum elliptica vel suborbicularis, apice rotundata vel emarginata, basi rotundata, 5×3 , 5×5 ad 18×11 , 14×14 mm magna), supra sparse tuberculato setosa et tuberculato stellato-pubescentes, lucida, subtus sparse stellato pubescentes et pilosa; petiolus plerumque 0,5–2 raro ad 6 mm longus, dimorpho pubescens. Flores fructusque non visa.

Typus: Prov. Oriente, distr. Guantanambo, „en el altiplano de la Meseta al norte de Baitiquirí, monte seco“. Leg. BISSE & KÖHLER, V. 1968, No. 7865 HAJB.

Distrib.: Cuba orientalis, inter Tortuguilla et Maisí, in fruticetis et silvis siccis prope oram maris.

Rochefortia septentrionalis KLOTZ spec. nov.

Species nova Rochefortiae stellatae BRITT. & WILS. valde similis, sed laminis foliorum angustioribus basi cunetais vel obtusis, supra minus pubescentibus vel glabris plerumque cinereis subtus densiore et fusco stellato-tomentosis.

Arbor parva ad 5 m alta dense ramosa ramis remulisque apice spinosis. Rami abbreviati ex gemmis serialis supra basis spinarum nascentes. Lamina foliorum ram. abbrev. coriacea oblongo-obovata, oblonga vel oblanceata, apice rotundata vel emarginata, marginibus revolutis, basi cuneata raro obtusa, $8 \times 2,5$, $7 \times 3,5$ ad 16×4 , 17×6 (20×6 , $29 \times 7,5$) mm magna, supra glabra et cinereo-maculata, nervo medio impressi, subtus breviter densissime fusco stellato-tomentosa; petiolus 1–2,5 mm longus. Flores singuli vel bini raro terni, breviter pedicellati vel subsessiles. Fructus subglobosus, 4–6 mm magnus.

Typus: Prov. Oriente, Sierra de Nipe, Mayarí Abajo, charrascales de la Loma de la Bandera, 300–400 m. Leg. BISSE & ROJAS, VI. 1967. No. 3983 HAJB.

Distrib.: In fruticetis et silvis semisiccis montium (Sierra de Nipe, Sierra de Cristal) Cubae boreo-orientalis.

var. cristalensis KLOTZ var. nov.

diffrat a typo laminis foliorum distincte minoribus (ad 13×4 , plerumque ad 11×4 mm magnis), fructibus minoribus (3–5 mm magnis).

Typus: Prov. Oriente, Sierra de Cristal, charrascal en la loma Saca la Lengua. Leg. BISSE & KÖHLER IV. 1968. No. 6923 HAJB.

var. obovata KLOTZ var. nov.

diffrat a typo laminis foliorum latioribus (ram. elongat. suborbicularis, laminis fol. ram. abbrev. ± obovatis, 8×5 ad 17×19 mm magnis).

Typus: Sierra de Nipe, alt. 400 m, Charrasco de la Bandera, „Arbusto de 1,5–2 m de alto“. Leg. ALAIN & ACUNA, 19. IV. 1960. No. 7802 Sv.

Rochefortia holguinensis KLOTZ spec. nov.

Species nova Rochefortiae septentrionalis valde similis sed laminis foliorum supra permanente tuberculato stellato-tomentosis subtus pilis stellatis dimorphis dense tectis, floribus in inflorescentiis pedunculatis 2-10-florae complectis.

Arbor parva squarroso ramosa ramis ramulisque apice spinosis. Rami abbreviati ex gemmis serialis supra basis spinarum nascentes. Lamina foliorum (ram. abbrev.) coriacea, oblongo-obovata usque ad oblanceata vel lanceolata, marginibus revolutis, apice rotundata, basi cuneata vel obtusa, 7×5 , 8×4 ad 20×8 , 20×6 (24×8 , 27×11) mm magna, supra permanente tuberculato stellato-pubescentes, subtus dense stellato tomentosa, tomentum pilis stellatis magnitudinis differentis compositum; petiolus 2–5 raro ad 8 mm longus. Inflorescentiae 2–10-florae breviter pedunculatae, pedicellis dentibusque calycis dense stellato-tomentosis. Fructus subglobosus 4–5 mm magnus nitens.