

**Bruna Vitor Tavares | Pedro de Oliveira Mafía | Eduardo Franco de Almeida | Fernanda Rossi | Fábio Augusto Rodrigues e Silva | Cristiano Schetini de Azevedo**

# **GUIA DE CAMPO: AVES URBANAS DE OURO PRETO**



**Bruna Vitor Tavares**  
**Pedro de Oliveira Mafia**  
**Eduardo Franco de Almeida**  
**Fernanda Rossi**  
**Fábio Augusto Rodrigues e Silva**  
**Cristiano Schetini de Azevedo**

# **GUIA DE CAMPO: AVES URBANAS DE OURO PRETO**



**São Paulo**  
**2021**



**EDITORA NA RAIZ**

**EDITOR-CHEFE: PROF. DR. VALDIR LAMIM-GUEDES**

**CONSELHO EDITORIAL**

**PROF. DR. ALEXANDRE MARCELO BUENO (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) | PROFA. DRA. ANNIE GISELE FERNANDES (USP) | PROF. DR. ANTÔNIO MANUEL FERREIRA (UNIVERSIDADE DE AVEIRO, PORTUGAL) | PROF. DR. CARLOS JUNIOR GONTIJO ROSA (USP) | PROFA. DRA. DEBORAH SANTOS PRADO (CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC) | PROF. DR. FÁBIO AUGUSTO RODRIGUES E SILVA (UFOP) | PROF. DR. FELIPE W. AMORIM (UNESP) | PROFA. DRA. FLAVIA MARIA CORRADIN (USP) | PROF. DR. FRANCISCO SECAF ALVES SILVEIRA (UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI) | PROF. DR. HORÁCIO COSTA (USP) | PROF. DR. JAVIER COLLADO RUANO (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, EQUADOR) | PROF. DR. JOSÉ AUGUSTO CARDOSO BERNARDES (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL) | PROF. DR. MARCOS PAULO GOMES MOL (FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS) | PROF. DR. PEDRO ROBERTO JACOBI (USP) | PROF. DR. RENATO ARNALDO TAGNIN (FACULDADES OSWALDO CRUZ) | PROFA. DRA. SUZANA URSI (USP) | PROFA. DRA. YASMINE ANTONINI (UFOP)**

**Esta obra contou com o apoio de:**



**B894 Tavares, Bruna Vitor**

**Guia de Campo: aves urbanas de Ouro Preto [livro eletrônico] / Bruna Vitor Tavares; Pedro de Oliveira Mafia; Eduardo Franco de Almeida; Fernanda Rossi; Fábio Augusto Rodrigues e Silva; Cristiano Schetini de Azevedo (Autores). São Paulo: Editora Na Raiz, 2020.**

**200f.; 21 x 29,7 cm; pdf**

**ISBN 978-65-88711-08-8**

**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4468617>**

**1. Ornitologia. 2. Guia de campo.  
I. Título.**

**CDD: 598**

**Agradecimentos especiais a todos que tornaram esta publicação possível, seja na colaboração da catalogação das espécies, identificação, visitas de campos e afins. Somos gratos à colaboração de todos, em especial à:**

**Ricardo Brandão  
Bárbara Luiza Teixeira Barreto  
Bethânia Brum  
Eduardo Franco  
Haroldo Lôndero  
Diana Rocha Monteiro  
Natália Allenspach  
Claudio Cesar Bossardi  
Filipe Augusto Pasa Bernardi  
Humberto Espírito Santo de Mello  
Sérgio Murilo de Carvalho**

**“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.**

**Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.**

**Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”**

**Rubem Alves**

# Sumário

<b>Autores</b> .....	<b>15</b>
<b>Apresentação</b> .....	<b>18</b>
<b>Introdução</b> .....	<b>21</b>
Morfologia das aves.....	21
Categorias de risco de extinção das espécies .....	25
Sobre este guia.....	33
<b>Lista de Abreviaturas e Siglas</b> .....	<b>33</b>
<b>Ordem Tinamiformes</b> .....	<b>35</b>
Tinamidae .....	35
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815).....	35
<b>Ordem Galliformes</b> .....	<b>36</b>
Cracidae.....	36
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815 .....	36
<b>Ordem Suliformes</b> .....	<b>37</b>
Phalacrocoracidae.....	37
<i>Nannopterum brasilianus</i> (Gmelin, 1789) .....	37
<b>Ordem Pelecaniformes</b> .....	<b>38</b>
Ardeidae.....	38
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824).....	38
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782).....	39
<b>Ordem Cathartiformes</b> .....	<b>41</b>
Cathartidae .....	41

<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793).....	41
<b>Ordem Accipitriformes .....</b>	<b>42</b>
Accipitridae .....	42
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817).....	42
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) .....	43
<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816).....	44
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819) .....	45
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816 .....	46
<b>Ordem Gruiformes .....</b>	<b>47</b>
Rallidae.....	47
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) .....	47
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819) .....	48
<b>Ordem Charadriiformes.....</b>	<b>49</b>
Charadriidae.....	49
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) .....	49
<b>Ordem Columbiformes .....</b>	<b>50</b>
Columbidae .....	50
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810).....	50
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831).....	51
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 .....	52
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) .....	54
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818).....	55
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855.....	56
<b>Ordem Cuculiformes.....</b>	<b>57</b>
Cuculidae .....	57

<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766).....	57
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758 .....	58
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788).....	59
<b>Ordem Strigiformes</b> .....	<b>60</b>
Strigidae .....	60
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817).....	60
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782).....	61
<b>Ordem Caprimulgiformes</b> .....	<b>62</b>
Caprimulgidae .....	62
<i>Hydropsalis longirostris</i> (Bonaparte, 1825).....	62
<b>Ordem Apodiformes</b> .....	<b>63</b>
Apodidae.....	63
<i>Streptoprocne biscutata</i> (Sclater, 1866).....	63
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907.....	64
Trochilidae .....	65
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839).....	65
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788).....	66
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818) .....	67
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817).....	68
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816) .....	69
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812).....	70
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818) .....	71
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818) .....	72
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832) .....	73
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783) .....	74



<b>Ordem Coraciiformes</b> .....	<b>75</b>
Alcedinidae.....	75
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766) .....	75
<b>Ordem Galbuliformes</b> .....	<b>76</b>
Bucconidae.....	76
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816).....	76
<b>Ordem Piciformes</b> .....	<b>77</b>
Ramphastidae.....	77
<i>Ramphastos toco</i> Statius Muller, 1776.....	77
Picidae .....	78
<i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825.....	78
<i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766) .....	79
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788) .....	80
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) .....	81
<b>Ordem Falconiformes</b> .....	<b>82</b>
Falconidae .....	82
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777).....	82
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816).....	83
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758).....	84
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758.....	85
<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800.....	87
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822.....	88
<b>Ordem Psittaciformes</b> .....	<b>89</b>
Psittacidae .....	89
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776).....	89

<i>Eupsittula aurea</i> (Gmelin, 1788) .....	90
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824) .....	91
<b>Ordem Passeriformes .....</b>	<b>92</b>
Thamnophilidae .....	92
<i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929 .....	92
<i>Herpsilochmus atricapillus</i> Pelzeln, 1868.....	93
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816 .....	94
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816.....	95
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818) .....	96
Rhinocryptidae.....	97
<i>Scytalopus petrophilus</i> Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010.....	97
Dendrocolaptidae .....	98
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822).....	98
Xenopidae .....	99
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821 .....	99
Furnariidae .....	100
<i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823).....	100
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788) .....	101
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823).....	102
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832) .....	103
<i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821) .....	104
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788) .....	105
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856 .....	106
Tityridae .....	107
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816).....	107

Rhynchocyclidae .....	108
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846 .....	108
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825) .....	109
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831) .....	110
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846).....	111
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831).....	112
Tyrannidae .....	113
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788).....	113
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824).....	114
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822).....	115
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) .....	116
<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825).....	117
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822) .....	118
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817).....	119
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) .....	120
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859 .....	121
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789).....	122
<i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776).....	123
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) .....	124
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) .....	125
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776) .....	126
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819) .....	127
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766).....	128
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825).....	129
<i>Tyrannus albogularis</i> Burmeister, 1856 .....	130

<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819 .....	131
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802 .....	132
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818).....	133
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776) .....	134
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766).....	135
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825).....	136
<i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828.....	137
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818) .....	138
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818).....	139
<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816) .....	140
<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823) .....	141
Vireonidae.....	142
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) .....	142
<i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835) .....	143
Hirundinidae .....	144
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) .....	144
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Lafresnaye, 1832).....	145
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817).....	146
Troglodytidae .....	147
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823.....	147
Turdidae.....	148
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818.....	148
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818.....	149
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850.....	150
<i>Turdus subalaris</i> (Seeböhm, 1887).....	151

Mimidae .....	152
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1769).....	152
Passerellidae .....	153
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776) .....	153
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792).....	154
Parulidae .....	155
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789).....	155
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830).....	156
<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817).....	157
Icteridae.....	158
<i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769).....	158
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819).....	159
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789).....	160
Thraupidae.....	161
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819).....	161
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817) .....	162
<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819) .....	163
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819).....	164
<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766) .....	165
<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1821).....	166
<i>Tangara ornata</i> (Sparrman, 1789).....	167
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766).....	168
<i>Sicalis citrina</i> Pelzeln, 1870.....	169
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766).....	170
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818).....	171

<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766).....	172
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818) .....	173
<i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821).....	174
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822).....	175
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811).....	176
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766).....	177
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) .....	178
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758) .....	179
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869) .....	180
<i>Sporophila nigricollis</i> (Vieillot, 1823).....	181
<i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894) .....	182
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823) .....	183
<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789).....	184
<i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844.....	185
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837.....	186
<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837).....	187
Cardinalidae .....	188
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822).....	188
Fringillidae.....	189
<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805).....	189
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766).....	190
Estrildidae.....	191
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758).....	191
Passeridae .....	192
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758).....	192

<b>Glossário .....</b>	<b>194</b>
<b>Referências .....</b>	<b>197</b>
<b>Referências Complementares .....</b>	<b>199</b>

# **Autores**

## **Bruna Vitor Tavares**

Mestranda no programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto. Possui graduação em Ciências Biológicas, nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, na Universidade Federal de Ouro Preto.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7259014703975186>

Contato: [brunecavitor@gmail.com](mailto:brunecavitor@gmail.com)

## **Pedro de Oliveira Mafia**

Biólogo, bacharel em biotecnologia e meio ambiente pelo Centro Universitário UNA. Mestre em ecologia de biomas tropicais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Consultor ambiental em projetos de resgate, levantamento, caracterização e monitoramento de fauna, para licenciamento ambiental, com enfoque no grupo avifauna.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5599830383886731>

Contato: [pierremafia@hotmail.com](mailto:pierremafia@hotmail.com)



## **Eduardo Franco de Almeida**

Biólogo, licenciado pela Universidade Federal de Ouro Preto.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0469478791602588>

Contato: [eduardofrancoa@gmail.com](mailto:eduardofrancoa@gmail.com)

## **Fernanda Rossi**

Bióloga, bacharel e licenciada pela Universidade Federal de Ouro Preto.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3197146541324147>

Contato: [fernanda.rossi@aluna.ufop.edu.br](mailto:fernanda.rossi@aluna.ufop.edu.br)

## **Fábio Augusto Rodrigues e Silva**

Biólogo, licenciado em ciências biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre e Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Linhas de pesquisa principais: produção de materiais didáticos e formação de professores.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6716025029694166>

Contato: [fabio.silva@ufop.edu.br](mailto:fabio.silva@ufop.edu.br)

## **Cristiano Schetini de Azevedo**

Biólogo, bacharel em zoologia e licenciado em ciências biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Zoologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Doutor em Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Membro do comitê de Bem-Estar da Associação de Aquários e Zoológicos do Brasil (2020-2021) e presidente da Sociedade Brasileira de Etologia (2021-2022). Linhas de pesquisa principais: comportamento animal e ornitologia.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0765515202045181>

Contato: [cristiano.azevedo@ufop.edu.br](mailto:cristiano.azevedo@ufop.edu.br)

## Apresentação

A expansão das cidades vem causando perda da diversidade ecológica em seus limites. Isso pode ser explicado pelo fato de que a urbanização leva a um processo de homogeneização ambiental que resulta em uma substituição das espécies nativas por espécies não nativas, causando, assim, uma alteração na comunidade natural. Esse processo de homogeneização é complexo e está relacionado a muitos fatores que se associam e se retroalimentam, como, por exemplo: a introdução de novos predadores, parasitas ou vetores de doenças, pelo aumento da competição por recursos alimentares ou espaço; ou ainda pelos elementos poluentes que contaminam o ar, solo e corpos d'água.

Entretanto, mesmo nas cidades, a biodiversidade se faz presente e algumas espécies podem aproveitar as condições oferecidas por ambientes antropizados e habitar os espaços urbanos. Isso pode nos oferecer informações importantes sobre a saúde ambiental das diferentes localidades. Neste sentido, as aves são um interessante grupo de animais que nos fornece dados interessantes sobre a biodiversidade urbana.

As aves têm um papel de suma importância para o meio ambiente, na natureza elas possuem um importante papel atuando na dispersão de sementes, controle de pragas, polinização de plantas, entre outras funções. No controle biológico de pragas podemos citar gaviões

e corujas, por exemplo, pois são consumidores de ratos e cobras. Já os urubus, são importantes no controle de carcaças, já que consomem rapidamente este tipo de alimento inclusive em áreas urbanas. Quanto à polinização podemos citar principalmente os beija-flores, que têm uma forte relação com algumas espécies de plantas onde a extinção de uma determinada flor pode levar a extinção da ave e vice-versa. E, finalmente, quanto à dispersão de sementes, temos frutos disponíveis nas cidades, como, por exemplo, a goiaba e afins, cuja dispersão se dá por meio das aves que, ao coletarem e/ou consumirem este recurso, podem carrear os frutos e as sementes para outros locais.

Este guia nasceu, principalmente, da preocupação em como formar e atrair os olhares da população, seja ela de formação acadêmica ou, simplesmente, interessada no tema, para a vida silvestre que ainda persiste nos espaços urbanizados. Existem outros seres vivos, além das espécies domesticadas que percebemos em nosso dia mais comuns como cães, gatos, cavalos, entre outros.

Neste sentido, temos como objetivo principal deste documento: ampliar o conhecimento sobre as espécies de aves conhecidas e caracterizadas no espaço urbano de Ouro Preto – Minas Gerais. Dessa forma, espera-se também uma percepção de que fazemos parte de um ambiente integrado e relacionado a outros seres vivos e que não existe uma natureza distante e intocada.

Além da pesquisa de campo na qual foi baseada a composição de espécies deste guia e demais bibliografias que serão citadas, utilizamos também dados coletados da *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) e do Wiki Aves,

*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*

<https://www.iucnredlist.org/>

**Wiki Aves**

<https://www.wikiaves.com.br/>

que é uma plataforma brasileira colaborativa sobre ‘observação de aves e ciência cidadã para todos’. Bibliografias complementares serão também sugeridas. Quase a totalidade das fotos presentes neste guia são de autoria de Pedro Mafia. As fotos da pomba *Columba livia* são de autoria de Bruna Vitor Tavares. As demais fotos serão associadas aos seus respectivos autores sempre que pertinente.

*Bruna Vitor Tavares*


# Introdução

Com o intuito de formar novos interessados em ecologia urbana, traremos aqui algumas informações básicas que poderão ser úteis tanto aos experientes observadores de aves, quanto aos iniciantes.

## **Morfologia das aves**

Algumas características inevitavelmente nos chamam a atenção no primeiro contato com uma ave: sua plumagem, coloração específica, seu bico e o formato de suas patas. No entanto, como denominar certas estruturas que chamamos comumente como 'topetinho', 'rabo', 'bico', entre outras? Venha conosco e vamos observar a morfologia externa das aves (Figura 1)!

**Figura 1: Morfologia externa das aves.**



Fonte: <https://www.wikiaves.com.br/wiki/morfologia>, autora Natália Allenspach.

Como forma de identificar algumas das características citadas na figura acima, apresentamos abaixo a imagem de um Tico-tico (*Zonotrichia capensis*), que podemos observar corriqueiramente (Figura 2).

**Figura 2: Morfologia externa do Tico-tico.**

**Aves:**  
**morfologia externa**



Fonte: <https://www.wikiaves.com.br/wiki/morfologia>, autora Natália Allenspach.

O tipo de bico pode auxiliar na identificação do hábito alimentar das aves (Figura 3). Com isso, temos algumas classificações que podem ajudar a observadores pouco ou menos experientes.




**Figura 3: Tipos de bicos.**



Por fim, a título de conhecimento, deixaremos uma imagem ilustrativa da anatomia interna de aves (Figura 4).

**Figura 4: Anatomia interna de aves.**



Fonte: <https://www.wikiaves.com.br/wiki/morfologia>, autora Diana Rocha Monteiro.

Tendo em mãos estas informações básicas referentes às aves, surgem algumas indagações: como saber quais são as espécies mais difíceis de se encontrar? Estas espécies estão em risco de extinção? Estas são curiosidades referentes à conservação das espécies.

Assim, apresentamos também breves explicações sobre o tema tendo como base um site de fácil acesso e consulta, utilizado também neste guia como uma das bases para construir as fichas de dados.

## **Categorias de risco de extinção das espécies**

O site em questão é o da Organização não Governamental, com sede na Suíça, *International Union for Conservation of Nature and Natural*

*International Union for  
Conservation of Nature and  
Natural Resources (IUCN)*

<https://www.iucnredlist.org/>

*Resources* (IUCN; em português:

União Internacional para Conservação da Natureza), que fornece dados sobre a classificação de ameaça às espécies, como exemplificado na figura a seguir.

A importância para o meio ambiente da construção e constante atualização da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas (em inglês, IUCN *Red List* ou *Red Data List*) é o fato de que através dela é possível a proteção das espécies, sendo este o maior catálogo de estudos comprovados sobre o estado de conservação de espécies de plantas, animais, fungos e protozoários existente.


Da mesma forma, existe uma lista vermelha nacional, produzida pelo Ministério do Meio Ambiente e cuja última atualização ocorreu em 2018 e listas regionais, produzidas em cada estado brasileiro, que auxiliam na conservação das espécies animais e vegetais. Desta forma temos um instrumento de pesquisa

### Lista vermelha nacional

<https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10195-livro-vermelho-da-fauna-ja-esta-disponivel-para-download>)

confiável em nossas mãos que ajuda na conscientização da população em trabalhos de conservação, educação ambiental e proteção à natureza.

**Figura 4: Exemplo de classificação de risco de extinção disponível no site da IUCN.**



Fonte: <https://www.iucnredlist.org/>, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

A classificação destacada em vermelho refere-se ao estado em que se encontra a espécie pesquisada no momento da consulta. A maior parte das espécies listadas neste guia estão na categoria demonstrada


pela figura: espécie em situação segura ou pouco preocupante de extinção.

Em português, temos disponível a tradução e explicação dos conceitos envolvidos no site ((o))eco de forma simples e explicativa que reproduziremos, a seguir.

**Entenda a classificação da Lista Vermelha da IUCN**

<https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>

**Figura 5: Categoria de risco de extinção - segura ou pouco preocupante.**




Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Segura ou pouco preocupante ou *Least Concern*, em inglês (LC):**

Esta é a categoria de risco mais baixa. Se a espécie não se enquadra em alguma das oito categorias que denotam distintos graus de risco de extinção (veja as categorias abaixo), ela é classificada como “Segura ou

Pouco Preocupante”. Espécies abundantes e amplamente distribuídas são incluídas nesta categoria. Exemplo: bem-te-vi *Pitangus sulphuratus*.

**Figura 6: Categoria de risco de extinção – quase ameaçada.**



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Quase ameaçada ou *Near Threatened*, em inglês (NT):** A espécie é incluída nesta categoria quando, avaliada pelos critérios de classificação, está perto de ser classificada ou, provavelmente, será incluída numa das categorias de ameaça (‘Críticamente em Perigo’, ‘Em Perigo’ ou ‘Vulnerável’) num futuro próximo. Exemplo: ema *Rhea americana*.

O termo “ameaçado” na Lista Vermelha da IUCN significa que a espécie se enquadra em uma das três categorias: Críticamente em Perigo, ou Em Perigo, ou Vulnerável.

**Figura 7: Categoria de risco de extinção - Vulnerável.**



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Vulnerável ou *Vulnerable*, em inglês (VU):** Uma espécie está Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo, a menos que as circunstâncias que ameaçam a sua sobrevivência e reprodução melhorem. Exemplo: arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus*.

**Figura 8: Categoria de risco de extinção – Em perigo.**



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Em perigo ou *Endangered* (EN):** Quando a melhor evidência disponível indica que uma espécie provavelmente será extinta num

futuro próximo. Este é o segundo estado de conservação mais grave para as espécies na natureza. Em todo o mundo, 3.219 animais e 3.009 plantas estão ameaçadas de extinção segundo a IUCN. Exemplo: águia-cinzenta *Urubitinga coronata*.


**Figura 9: Categoria de risco de extinção – Criticamente em perigo.**



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Criticamente em Perigo ou Em Perigo Crítico ou *Critically Endangered* (CR):** É a categoria de maior risco atribuído pela Lista Vermelha da IUCN para espécies selvagens. São aquelas que enfrentam risco extremamente elevado de extinção na natureza. Há 2.169 animais e 1.957 plantas com essa avaliação, segundo a IUCN. Exemplo: soldadinho-do-Araripe *Antilophia bokermanni*.


Figura 10: Categoria de risco de extinção - Extinta na natureza.



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Extinta na natureza ou *Extinct in the Wild* (EW):** Uma espécie é presumida como tal quando estudos exaustivos em seus habitats conhecido e/ou esperados, em momentos apropriados, ao longo de sua distribuição histórica, não conseguem encontrar um único indivíduo. São espécies conhecidas por sobreviver apenas em cativeiro ou como uma população naturalizada fora de sua área natural. Exemplo: ararinha-azul *Cyanopsittta spixii*.

Figura 11: Categoria de risco de extinção – Extinta.



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>, Entenda a classificação da Lista Vermelha da IUCN - ((o))eco



**Extinta ou Extinct, em inglês (EX):** Quando não há qualquer dúvida razoável que o último indivíduo morreu, a espécie é considerada extinta. O momento de extinção é geralmente considerado como sendo a morte do último indivíduo da espécie, embora a capacidade de sobrevivência da espécie — devido ao baixo número de indivíduos — tenha sido perdida antes deste ponto. Exemplo: caburé-de-Pernambuco *Glaucidium mooreorum*.

**Figura 12: Categoria de risco de extinção – Dados insuficientes.**



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Dados Insuficientes ou *Data Deficient* (DD):** Não existem informações adequadas para fazer uma avaliação, direta ou indireta, do risco de extinção de uma espécie, com base na sua distribuição e/ou status da população. Uma espécie aqui classificada pode ser bem estudada e sua biologia bem conhecida, mas faltam dados sobre seu número e distribuição. A categoria “Dados Insuficientes” não é, portanto, uma forma de descrever o grau de risco da espécie. Trata-se do reconhecimento de que são necessárias mais informações e que uma investigação futura poderá mostrar que a classificação ameaçada é apropriada ou não. Exemplo: anambé-de-rabo-branco *Tytira leucura*

### Figura 13: Categoria de risco de extinção.



Fonte: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>.

**Não avaliada ou *Not Evaluated* (NE):** Uma espécie não é avaliada quando ainda não foi submetida aos critérios de avaliação de risco. Todas as espécies brasileiras foram avaliadas segundo a IUCN.

### Sobre este guia

Este guia foi produzido a partir de observações de aves em 35 pontos-fixos dentro da cidade de Ouro Preto entre os anos de 2013 e 2014. Em cada ponto-fixo, os pesquisadores permaneceram por 20 minutos registrando as aves vistas e ouvidas. Foram registradas 155 espécies de aves dentro da cidade de Ouro Preto.

As características de cada uma são apresentadas a seguir, como classificação, habitat, distribuição, hábitos alimentares, grau de ameaça segundo a IUCN e tempo aproximado de vida. Compartilhando estas informações esperamos auxiliar não somente os estudiosos, mas como também a população local a aumentar seus conhecimentos acerca da avifauna local e da importância da conservação das espécies.

*Bruna Vitor Tavares*

## **Lista de Abreviaturas e Siglas**

**NC** – Nada consta, não encontrados dados relativos à categoria no WikiAves ou na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

**Tinamidae**

*Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815)



Ambas as fotos foram cedidas por Humberto Espírito Santo de Mello.

---

**Nome popular:** Perdiz

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou *Least Concern*, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Tinamiformes

---

**Família:** Tinamidae

---

**Hábitat:** Bosque, Pastagem e Savana.

---

Tempo de vida: 6,8 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai; Peru e Uruguai.

---

Cracidae

*Penelope obscura* Temminck, 1815



---

Nome popular: Jacaçu

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou *Least Concern*, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Galliformes

Família: Cracidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Bosque.

Tempo de vida: 5,7 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai.  
(Reprodução/Choca: Uruguai)

---

**Phalacrocoracidae**

*Nannopterum brasilianus* (Gmelin, 1789)



---

Nome popular: Biguá

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Suliformes

**Família:** Phalacrocoracidae

**Hábitat:** Marinho nerítico e Pantanal.

**Tempo de vida:** 8,7 anos (Aves congregatórias)

Hábito alimentar: Piscívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Venezuela; Estados Unidos; Uruguai; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens dos EUA; Jamaica.

---

---

## Ordem Pelecaniformes

### Ardeidae

*Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824)



---

Nome popular: Maria faceira

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Pelecaniformes

Família: Ardeidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Pantanal, Pastagem e Savana.

---

**Tempo de vida:** 6,7 anos (Aves congregatórias e migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Paraguai e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Egretta thula* (Molina, 1782)



---

**Nome popular:** Garça-branca-pequena

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Pelecaniformes

Família: Ardeidae

---

**Hábitat:** Marinho entremarés e Pantanal.

---

**Tempo de vida:** 6,8 anos (Aves congregatórias e migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Cuba; Dominica; República Dominicana; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guadalupe; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Martinho (parte francesa); São Vicente e Granadinas; São Martinho (parte holandesa); Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Venezuela, República Bolivariana da; Belize; Costa Rica; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA; Samoa Americana; Ilhas Falkland (Malvinas); Islândia; Portugal; Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha; África do Sul; Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do

---



---

Sul; Reino Unido; São Pedro e Miquelon (Reprodução/Choca: Bermudas; Canadá; Granada; Jamaica; Porto Rico; Estados Unidos e Uruguai - Sazonal: São Bartolomeu).

---

---

## Ordem Cathartiformes

### Cathartidae

*Coragyps atratus* (Bechstein, 1793)



---

**Nome popular:** Urubu-de-cabeça-preta

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Cathartiformes

---

**Família:** Cathartidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Floresta e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 18,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Necrófago

---

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Canadá; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela, República Bolivariana da; Antígua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Bermudas; Ilhas Cayman; Cuba; Dominica; Granada; Guadalupe; Martinica; Monserrate; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas (Reprodução/Choca: EUA; Porto Rico e Uruguai; - Sazonalidade: Jamaica)

---

---

## Ordem Accipitriformes

### Accipitridae

*Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817)



Ambas as fotos foram cedidas por Haroldo Lôndero.

---

**Nome popular:** Gavião-bombachinha-grande

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Accipitriformes

**Família:** Accipitridae

**Hábitat:** Floresta e Savana.

**Tempo de vida:** 7,2 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Carnívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Venezuela (Reprodução/Choca: El Salvador e Uruguai).

---

*Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788)



---

Nome popular: Gavião-carijó

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Accipitriformes

---

**Família:** Accipitridae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque, Floresta e Savana.

---

Tempo de vida: 9,7 anos

---

Hábito alimentar: Carnívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Estados Unidos; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Geranoaetus albicaudatus* (Vieillot, 1816)



**Nome popular:** Gavião-de-rabo-branco

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Accipitriformes

**Família:** Accipitridae

**Hábitat:** Terrestre, Savana, Pastagem e Bosque.

**Tempo de vida:** 10 anos (Aves migratórias)

**Hábito alimentar:** Carnívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Dominica; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Equador; Estados Unidos e Uruguai).

*Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819)



---

Nome popular: Águia-chilena

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Accipitriformes

---

**Família:** Accipitridae

---

**Hábitat:** Savana, Bosque, Montanhas e Pastagem.

---

Tempo de vida: 10,5 anos

---

Hábito alimentar: Carnívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Buteo brachyurus* Vieillot, 1816



**Nome popular:** Gavião-de-cauda-curta

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Accipitriformes

**Família:** Accipitridae

**Hábitat:** Floresta e Savana.

Tempo de vida: 9,3 anos

**Hábito alimentar:** Carnívoro

**Distribuição:** Costa Rica. (Reprodução/Choca: Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Estados Unidos; Venezuela).

Rallidae

*Aramides saracura* (Spix, 1825)



---

**Nome popular:** Saracura-do-mato

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Gruiformes

Família: Rallidae

---

**Hábitat:** Floresta e Pantanal.

Tempo de vida: 3,7 anos

---

**Hábito alimentar:** Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai. (Endêmica da Mata Atlântica)

---



*Pardirallus nigricans* (Vieillot, 1819)



---

Nome popular: Saracura-sanã

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Gruiformes

---

Família: Rallidae

---

**Hábitat:** Pantanal.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru e Venezuela.

---

---

## Ordem Charadriiformes

### Charadriidae

*Vanellus chilensis* (Molina, 1782)



---

Nome popular: Quero-quero

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Charadriiformes

**Família:** Charadriidae

**Hábitat:** Pantanal, Pastagem e Terrestre.

**Tempo de vida:** 8,9 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela, República Bolivariana da; Uruguai; Barbados; Ilhas Falkland (Malvinas) (Sazonal: México).

---

---

## Ordem Columbiformes

### Columbidae

*Columbina talpacoti* (Temminck, 1810)



---

Nome popular: Rolinha-roxa

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Columbiformes

---

**Família:** Columbidae

---

**Hábitat:** Terrestre e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 4,3 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Bonaire); Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: EUA e Uruguai).

---

*Columbina squammata* (Lesson, 1831)



---

Nome popular: Fogo-apagou

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Columbiformes

---

**Família:** Columbidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Savana, Pastagem e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,3 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana Francesa; Paraguai; Trinidad e Tobago; Venezuela.

---

*Columba livia* Gmelin, 1789



**Nome popular:** Pombo-doméstico

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Columbiformes

**Família:** Columbidae

**Hábitat:** Cavernas e Fendas rochosas, Montanha e Terrestre.

Tempo de vida: 5,8 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Afeganistão; Argélia; Andorra; Áustria; Azerbaijão; Bielorrússia; Bélgica; Bulgária; Cabo Verde; Chade; Croácia; Chipre; Egito; Estônia; Ilhas Faroe; Finlândia; França; Grécia; Islândia; Irã; Iraque; Irlanda; Itália; Jordânia; Letônia; Líbano; Líbia; Luxemburgo; Mali; Malta; Mauritânia; Moldova; Mônaco; Marrocos; Macedônia do Norte; Omã; Palestina; Portugal; Catar; Federação Russa; Federação Russa (Rússia da Ásia Central); San Marino; Arábia Saudita; Eslovênia; Espanha; Sudão; Suécia; Síria; Tunísia; Peru; Ucrânia; Emirados Árabes Unidos; Reino Unido; Iémen; Samoa Americana; Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Bahrein; Barbados; Belize; Bermudas; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba; Botsuana; Brasil; Burkina Faso; Canadá; Ilhas Cayman; Chile;

---

Colômbia; Comores; Congo; Ilhas Cook; Costa Rica; Cuba; Curaçao; Costa do Marfim; Dinamarca; Dominica; República Dominicana; Equador; El Salvador; Fiji; Guiana Francesa; Gabão; Gâmbia; Gana; Granada; Guadalupe; Guatemala; Guiné; Guiné-Bissau; Guiana; Haiti; Honduras; Hong Kong; Japão; Quênia; Kiribati; Coreia do Norte; Coreia do Sul; Kuwait; Libéria; Madagascar; Martinica; Mayotte; México; Micronésia; Monserrate; Países Baixos; Nova Caledônia; Nicarágua; Níger; Nigéria; Panamá; Papua Nova Guiné; Paraguai; Peru; Porto Rico; Ilha da Reunião; São Bartolomeu; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Martinho (parte francesa); São Pedro e Miquelon; São Vicente e Granadinas; Samoa; São Tomé e Príncipe; Senegal; São Martinho (parte holandesa); Sri Lanka; Suriname; Taiwan, província da China; Timor-Leste; Ir; Tonga; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Uganda; Uruguai; Venezuela; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA; Wallis e Futuna; Ilhas Marshall; Jamaica; Eritreia (Reprodução/Choca: Albânia; Armênia; Butão; Bósnia e Herzegovina; China; Czechia; Etiópia; Georgia; Alemanha; Hungria; Índia; Israel; Cazaquistão; Quirguistão; Lituânia; Mongólia; Montenegro; Myanmar; Nepal; Noruega; Paquistão; Polônia; Romênia; Federação Russa (Rússia Europeia); Sérvia; Eslováquia; Suíça; Tajiquistão; Turquemenistão; Uzbequistão; Saara Ocidental; Angola; Austrália; Bangladesh; Brunei Darussalam; Camboja; Djibuti; Eswatini; Polinésia Francesa; Gibraltar; Guam; Indonésia; República Democrática Popular do Laos; Lesoto; Liechtenstein; Malásia; Maldivas; Maurícia; Moçambique; Namíbia; Nauru; Nova Zelândia; Ilhas Marianas do Norte; Federação Russa (Rússia do Leste Asiático); Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha; Seychelles; Cingapura; Somália; África do Sul; Tailândia; Estados Unidos; Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos; Vietnam; Zâmbia; Zimbábue).

---

*Patagioenas picazuro* (Temminck, 1813)



---

Nome popular: Asa-branca

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Columbiformes

---

**Família:** Columbidae

---

**Hábitat:** Bosque, Floresta, Terrestre, Savana e Pastagem.

---

**Tempo de vida:** 6,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai  
(Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Pomba-amargosa

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Columbiformes

---

**Família:** Columbidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

**Tempo de vida:** 6,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Peru; Suriname e Venezuela.

---



*Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855



Nome popular: Juriti-pupu

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Columbiformes

**Família:** Columbidae

**Hábitat:** Bosque, Terrestre e Floresta.

Tempo de vida: 4,2 anos

Hábito alimentar: Frugívoro

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Belize; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Bonaire); Brasil; Colômbia; Costa Rica; Curaçao; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai).

Cuculidae

*Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Alma-de-gato

Nível de ameaça: Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

Ordem: Cuculiformes

Família: Cuculidae

Hábitat: Floresta, Bosque e Terrestre.

Tempo de vida: 4,2 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

Distribuição: Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Crotophaga ani* Linnaeus, 1758



Nome popular: Anu-preto

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Cuculiformes

**Família:** Cuculidae

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Bosque e Pantanal.

Tempo de vida: 4,2 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Santo Eustáquio); Brasil; Ilhas Cayman; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; República Dominicana; Equador; Guiana Francesa; Granada; Guadalupe; Guiana; Haiti; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos; Venezuela; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA (Reprodução/Choca: Jamaica; Estados Unidos e Uruguai).

*Guira guira* (Gmelin, 1788)



---

Nome popular: Anu-branco

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Cuculiformes

---

**Família:** Cuculidae

---

**Hábitat:** Savana, Terrestre, Pastagem, Pantanal e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba; Curaçao; São Martinho (parte holandesa) (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

Strigidae

*Megascops choliba* (Vieillot, 1817)



Ambas as fotos foram cedidas por Bárbara Luiza Teixeira Barreto.

---

**Nome popular:** Corujinha-do-mato

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Strigiformes

**Família:** Strigidae

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Savana e Bosque.

Tempo de vida: 7 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Athene cunicularia* (Molina, 1782)



**Nome popular:** Coruja-buraqueira

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Strigiformes

**Família:** Strigidae

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Deserto, Bosque e Savana.

**Tempo de vida:** 4,6 anos (Aves migratórias)

**Hábito alimentar:** Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Bahamas; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Cuba; República Dominicana; Equador; El Salvador; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; México; Paraguai; Peru; Trinidad e Tobago; Venezuela; Ilhas Falkland (Malvinas); Panamá; Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul (Reprodução/Choca: Canadá; Suriname; Estados Unidos; Uruguai - Sazonal: Costa Rica – Possivelmente extinta: São Cristóvão e Névis – Extinta: Antígua e Barbuda; Guadalupe).

---

## Ordem Caprimulgiformes

### Caprimulgidae

*Hydropsalis longirostris* (Bonaparte, 1825)



Ambas as fotos foram cedidas por Eduardo Franco.

---

**Nome popular:** Bacurau-da-telha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Caprimulgiformes

---

**Família:** Caprimulgidae

---

**Hábitat:** Bosque, Terrestre, Pastagem e Savana.

---

**Tempo de vida:** 5,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru; Uruguai e Venezuela.

---

Apodidae

*Streptoprocne biscutata* (Sclater, 1866)



Ambas as fotos foram cedidas por Bárbara Luiza Teixeira Barreto.

---

**Nome popular:** Taperuçu-de-coleira-falha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

Família: Apodidae

---

**Hábitat:** Floresta, Montanha e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 7,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil. (Reprodução/Choca: Paraguai)

---



*Chaetura meridionalis* Hellmayr, 1907



Ambas as fotos foram cedidas por Filipe Augusto Pasa Bernardi.

---

**Nome popular:** Andorinhão-do-temporal

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

Família: Apodidae

---

**Hábitat:** Bosque, Floresta e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 5,4 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Ilhas Falkland (Malvinas); Guiana Francesa; Paraguai; Suriname; Venezuela e Panamá.

---

## Trochilidae

*Phaethornis pretrei* (Lesson & Delattre, 1839)



---

**Nome popular:** Rabo-branco-acanelado

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai.

---

*Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788)



---

**Nome popular:** Beija-flor-tesoura

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Savana e Floresta.

---

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Guiana Francesa; Paraguai; Peru e Suriname.

---

*Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Beija-flor-cinza

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre e Floresta.

---

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmico da Mata Atlântica).

---

*Florisuga fusca* (Vieillot, 1817)



---

**Nome popular:** Beija-flor-preto

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre e Floresta.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Brasil e Uruguai. (Endêmico da Mata Atlântica; Reprodução/Choca: Paraguai; Sazonal: Argentina)

---

*Colibri serrirostris* (Vieillot, 1816)



---

**Nome popular:** Beija-flor-de -orelha-violeta

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Savana, Floresta e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai.

---

*Chlorostilbon lucidus* (Shaw, 1812)



---

**Nome popular:** Besourinho-de-bico-vermelho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Pastagem, Bosque, Savana, Floresta e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai  
(Reprodução/Choca: Uruguai; Sazonal: Peru).

---

*Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Beija-flor-de-papo-branco

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Bosque e Pantanal.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai. (Endêmico da Mata Atlântica; Reprodução/Choca: Bolívia e Uruguai)

---



*Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Beija-flor-de-banda-branca

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Savana e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,4 anos

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Paraguai; Peru e Venezuela.

---

*Amazilia lactea* (Lesson, 1832)



---

**Nome popular:** Beija-flor-de-peito-azul

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,4 anos

---

**Hábito alimentar:** Nectarívoro

---

**Distribuição:** Brasil e Venezuela.

---

*Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)



---

**Nome popular:** Estrelinha-ametista

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Apodiformes

---

**Família:** Trochilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Bosque e Savana.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Nectarívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname e Venezuela.

---

---

## Ordem Coraciiformes

### Alcedinidae

*Megaceryle torquata* (Linnaeus, 1766)



---

**Nome popular:** Martim-pescador-grande

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Coraciiformes

**Família:** Alcedinidae

**Hábitat:** Marinho entremarés, Marinho costeiro, Aquático e Marinho, Marinho nerítico, Terrestre, Pantanal e Floresta.

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Piscívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Dominica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guadalupe; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela; Aruba e Granada (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai).

---

---

## Ordem Galbuliformes

### Bucconidae

*Nystalus chacuru* (Vieillot, 1816)



---

Nome popular: João-bobo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Galbuliformes

**Família:** Bucconidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Bosque e Savana.

Tempo de vida: 6,3 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru.

---

Ramphastidae

*Ramphastos toco* Statius Muller, 1776



Foto da esquerda cedida por Bethânia Brum.

---

Nome popular: Tucanuçu

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Piciformes

---

**Família:** Ramphastidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Savana e Terrestre.

---

Tempo de vida: 11,5 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname e Uruguai.

---

## Picidae

*Picumnus cirratus* Temminck, 1825



**Nome popular:** Pica-pau-anão-barrado

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Piciformes

Família: Picidae

**Hábitat:** Floresta, Savana e Bosque.

Tempo de vida: 4,2 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Guiana Francesa; Guiana e Paraguai.

*Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766)



---

**Nome popular:** Picapauzinho-anão

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Piciformes

Família: Picidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana e Terrestre.

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname e Venezuela.

---



*Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)



---

**Nome popular:** Pica-pau-verde-barrado

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Piciformes

Família: Picidae

---

**Hábitat:** Deserto, Floresta, Savana e Bosque.

Tempo de vida: 4,3 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Uruguai.

---

*Colaptes campestris* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Pica-pau-do-campo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Piciformes

Família: Picidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Savana e Pastagem.

Tempo de vida: 4,3 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Paraguai e Suriname.

---

---

## Ordem Falconiformes

### Falconidae

*Caracara plancus* (Miller, 1777)



---

**Nome popular:** Caracará ou Carcará

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Falconiformes

**Família:** Falconidae

**Hábitat:** Bosque, Artificial, Terrestre, Pastagem e Pantanal.

Tempo de vida: 11,3 anos

**Hábito alimentar:** Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Paraguai; Peru e Uruguai.

---

*Milvago chimachima* (Vieillot, 1816)



Nome popular: Carrapateiro

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Falconiformes

**Família:** Falconidae

**Hábitat:** Bosque, Savana, Terrestre e Pantanal.

Tempo de vida: 10,3 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758)



Nome popular: Acauã

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Falconiformes

**Família:** Falconidae

**Hábitat:** Floresta e Savana.

Tempo de vida: 9,3 anos

Hábito alimentar: Carnívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname e Venezuela (Sazonal: Chile).

*Falco sparverius* Linnaeus, 1758



---

Nome popular: Quiriquiri

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Falconiformes

---

**Família:** Falconidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque, Pastagem, Floresta, Savana, Pantanal e Deserto.

---

**Tempo de vida:** 5,7 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Carnívoro

---

**Distribuição:** Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Bermudas; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Saba, Santo Eustáquio); Brasil; Canadá; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Cuba; Dominica; República Dominicana; Equador; El Salvador; Ilhas Falkland (Malvinas); Guiana Francesa; Guadalupe; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Martinho (parte francesa); São Pedro e Miquelon; São Vicente e Granadinas; São Martinho (parte holandesa); Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Venezuela; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA; Belize; Costa Rica; Dinamarca; Estônia; Malta; Portugal e Reino

---

---

Unido (Reprodução/Choca: Granada; Jamaica; Estados Unidos;  
Uruguai - Sazonal: São Bartolomeu; Ilhas Menores Distantes dos  
Estados Unidos).

---

*Falco ruficularis* Daudin, 1800



---

Nome popular: Cauré

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Falconiformes

---

**Família:** Falconidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta e Savana.

---

Tempo de vida: 6,2 anos

---

Hábito alimentar: Carnívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Granada e Venezuela.

---



*Falco femoralis* Temminck, 1822



**Nome popular:** Falcão-de-coleira

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Falconiformes

**Família:** Falconidae

**Hábitat:** Pastagem, Savana, Deserto, Terrestre e Pantanal.

**Tempo de vida:** 6,2 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Carnívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Estados Unidos; Costa Rica; Ilhas Falkland (Malvinas); Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai; Sazonal: Porto Rico).

---

## Ordem Psittaciformes

### Psittacidae

*Psittacara leucophthalmus* (Statius Muller, 1776)



---

**Nome popular:** Periquitão-maracanã

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Psittaciformes

---

**Família:** Psittacidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Savana.

---

Tempo de vida: 7 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Eupsittula aurea* (Gmelin, 1788)



---

Nome popular: Periquito-rei

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Psittaciformes

---

**Família:** Psittacidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Savana e Pastagem.

---

Tempo de vida: 7 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai; Peru e Suriname.

---

*Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)



---

Nome popular: Tuim

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Psittaciformes

---

**Família:** Psittacidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Savana e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 4,1 anos (Aves migratórias altitudinais)

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Equador; Paraguai e Peru.

---

**Thamnophilidae**

*Formicivora serrana* Hellmayr, 1929



---

**Nome popular:** Formigueiro-da-serra

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thamnophilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Herpsilochmus atricapillus* Pelzeln, 1868



---

**Nome popular:** Chorozinho-de-chapéu-preto

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thamnophilidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai.

---

*Thamnophilus ruficapillus* Vieillot, 1816



---

**Nome popular:** Choca-de-chapéu-vermelho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thamnophilidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Floresta.

---

Tempo de vida: 4,9 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Uruguai.

---

*Thamnophilus caerulescens* Vieillot, 1816



---

Nome popular: Choca-da-mata

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thamnophilidae

---

**Hábitat:** Floresta, Pantanal e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,9 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Pyriglena leucoptera* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Papa-taoca-do-sul

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thamnophilidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai (Endêmica da Mata Atlântica).

---

## Rhinocryptidae

*Scytalopus petrophilus* Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010



Ambas as fotos foram cedidas por Sérgio Murilo de Carvalho.

---

**Nome popular:** Tapaculo-serrano

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Rhinocryptidae

---

**Hábitat:** Montanha, Floresta e Bosque.

---

Tempo de vida: NC

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo).

---

## Dendrocolaptidae

*Lepidocolaptes squamatus* (Lichtenstein, 1822)



---

**Nome popular:** Arapaçu-escamado

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Dendrocolaptidae

---

**Hábitat:** Floresta e Savana.

---

Tempo de vida: 4,1 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmico da Mata Atlântica)

---

# Xenopidae

*Xenops rutilans* Temminck, 1821



---

**Nome popular:** Bico-virado-carijó

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Xenopidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

Tempo de vida: 2,9 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

---

## Furnariidae

*Furnarius figulus* (Lichtenstein, 1823)



---

**Nome popular:** Casaca-de-couro-da-lama

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Floresta, Pantanal, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,4 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

Distribuição: Brasil.

---

*Furnarius rufus* (Gmelin, 1788)



---

Nome popular: João-de-barro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque.

---

Tempo de vida: 4,4 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai.  
(Reprodução/Choca: Uruguai)

---

*Lochmias nematura* (Lichtenstein, 1823)



Nome popular: João-porca

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Furnariidae

**Hábitat:** Floresta.

Tempo de vida: 3,8 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Syndactyla rufosuperciliata* (Lafresnaye, 1832)



Ambas as fotos foram cedidas por Eduardo Franco.

---

**Nome popular:** Trepador-quiete

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Equador; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Phacellodomus rufifrons* (Wied, 1821)



---

Nome popular: João-de-pau

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Artificial, Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Equador; Paraguai e Peru.

---

*Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin, 1788)



---

Nome popular: Curutié

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Floresta e Pantanal.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Synallaxis spixi* Sclater, 1856



---

Nome popular: João-teneném

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Furnariidae

---

**Hábitat:** Savana, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

## Tityridae

*Pachyramphus viridis* (Vieillot, 1816)



---

**Nome popular:** Caneleiro-verde

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tityridae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,6 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Uruguai.

---

## Rhynchocyclidae

*Mionectes rufiventris* Cabanis, 1846



---

**Nome popular:** Abre-asa-de-cabeça-cinza

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Rhynchocyclidae

---

**Hábitat:** Floresta.

Tempo de vida: 4 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Tolmomyias sulphurescens* (Spix, 1825)



**Nome popular:** Bico-chato-de-orelha-preta

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Rhynchocyclidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Pantanal e Terrestre.

Tempo de vida: 3,6 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

*Todirostrum poliocephalum* (Wied, 1831)



---

Nome popular: Teque-teque

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Rhynchocyclidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Poecilatriccus plumbeiceps* (Lafresnaye, 1846)



Ambas as fotos foram cedidas por Eduardo Franco.

---

Nome popular: Tororó

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Rhynchocyclidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru  
(Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Hemitriccus nidipendulus* (Wied, 1831)



---

**Nome popular:** Tachuri-campainha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Rhynchocyclidae

---

**Hábitat:** Floresta e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

# Tyrannidae

*Hirundinea ferruginea* (Gmelin, 1788)



**Nome popular:** Gibão-de-couro

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre e Montanha.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Brasil (Reprodução/Choca: Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Peru; Suriname; Venezuela).

*Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)



---

Nome popular: Risadinha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre, Pantanal e Deserto.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)



---

**Nome popular:** Guaracava-de-barriga-amarela

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Bosque, Pantanal, Savana e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,6 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Dominica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Granada; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela e Chile.

---

*Elaenia obscura* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



---

Nome popular: Tucão

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,6 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Equador e Peru.

---

*Phaeomyias murina* (Spix, 1825)



---

Nome popular: Bagageiro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Argentina e Paraguai).

---

*Phyllomyias fasciatus* (Thunberg, 1822)



---

Nome popular: Piolhinho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Uruguai.

---

*Serpophaga nigricans* (Vieillot, 1817)



Nome popular: João-pobre

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Aquático e Marinho, Terrestre, Pantanal e Pastagem.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai (Reprodução/Choca: Uruguai).



*Serpophaga subcristata* (Vieillot, 1817)



---

Nome popular: Alegrinho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil e Bolívia (Reprodução/Choca: Uruguai – Sazonal: Argentina e Paraguai).

---

*Myiarchus swainsoni* Cabanis & Heine, 1859



---

Nome popular: Irré

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque, Terrestre e Pantanal.

---

**Tempo de vida:** 5,1 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)



---

**Nome popular:** Maria-cavaleira

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Pantanal e Terrestre.

---

Tempo de vida: 5,1 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Uruguai e Venezuela.

---

*Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)



**Nome popular:** Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre, Pantanal e Savana.

**Tempo de vida:** 6,5 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Barbados; Belize; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Bonaire); Brasil; Canadá; Colômbia; Costa Rica; Curaçao; Dominica; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Estados Unidos).

*Sirystes sibilator* (Vieillot, 1818)



---

Nome popular: Gritador

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai.

---

*Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Bem-te-vi

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre e Pastagem.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Ilhas Falkland (Malvinas); Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela e Bermudas (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai).

*Myiodynastes maculatus* (Statius Muller, 1776)



---

**Nome popular:** Bem-te-vi-rajado

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

**Hábito alimentar:** Onívoro

---

**Distribuição:** Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Belize; Guatemala; Honduras; México e Nicarágua).

---

*Machetornis rixosa* (Vieillot, 1819)



---

**Nome popular:** Suiriri-cavaleiro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Savana, Marinho entremarés e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Aruba; Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Panamá; Paraguai e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Megarynchus pitangua* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Neinei

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque e Terrestre.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela

*Myiozetetes similis* (Spix, 1825)



---

**Nome popular:** Bentevizinho-de-penacho-vermelho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Venezuela e Estados Unidos.

---

*Tyrannus albogularis* Burmeister, 1856



---

**Nome popular:** Suiriri-de-garganta-branca

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque, Pastagem, Terrestre e Pantanal.

---

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Peru; Suriname e Venezuela.

---

*Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819



Nome popular: Suiriri

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre e Pantanal.

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Granada; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Canadá; Cuba e Venezuela (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai).

*Tyrannus savana* Daudin, 1802



Nome popular: Tesourinha

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Pantanal, Terrestre, Bosque e Pastagem.

**Tempo de vida:** 4,2 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Barbados; Bermudas; Canadá; Ilhas Cayman; Cuba; Dominica; Ilhas Falkland (Malvinas); Granada; Martinica; Monserrate; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Martinho (parte francesa); São Pedro e Miquelon; São Vicente e Granadinas; São Martinho (parte holandesa); Argentina; Aruba; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai – Sazonal; Jamaica).

*Colonia colonus* (Vieillot, 1818)



---

Nome popular: Viuvinha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Honduras; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname e Venezuela.

---

*Myiophobus fasciatus* (Statius Muller, 1776)



Nome popular: Filipe

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Tyrannidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre e Bosque.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Argentina e Uruguai).

*Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766)



---

**Nome popular:** Lavadeira-mascarada

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Pantanal, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil; Equador e Peru (Sazonal: Paraguai).

---



*Contopus cinereus* (Spix, 1825)



---

**Nome popular:** Papa-moscas-cinzento

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 3,5 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru.

---

*Knipolegus lophotes* Boie, 1828



---

**Nome popular:** Maria-preta-de-penacho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Bosque e Savana.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Reprodução/Choca: Paraguai e Uruguai).

---

*Knipolegus nigerrimus* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Maria-preta-de-garganta-preta

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Montanha, Pastagem e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Satrapa icterophrys* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Suiriri-pequeno

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Floresta, Pantanal e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Paraguai; Peru e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Xolmis cinereus* (Vieillot, 1816)



---

Nome popular: Primavera

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Savana, Pastagem e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai; Peru e Suriname (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Xolmis velatus* (Lichtenstein, 1823)



---

**Nome popular:** Noivinha-branca

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Tyrannidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Savana.

---

Tempo de vida: 3,6 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Bolívia; Brasil e Paraguai.

---

## Vireonidae

*Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)



Nome popular: Pitiguari

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Vireonidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre e Bosque.

Tempo de vida: 5,2 anos

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Hylophilus amaurocephalus* (Nordmann, 1835)



---

**Nome popular:** Vite-vite-de-olho-cinza

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Vireonidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 5,2 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Bolívia e Brasil.

---



## Hirundinidae

*Pygochelidon cyanoleuca* (Vieillot, 1817)



**Nome popular:** Andorinha-pequena-de-casa

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Hirundinidae

**Hábitat:** Pastagem e Terrestre.

**Tempo de vida:** 4,1 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; México; Nicarágua; Guatemala; Costa Rica e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Stelgidopteryx ruficollis* (Lafresnaye, 1832)



**Nome popular:** Andorinha-serradora

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Hirundinidae

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Floresta, Pantanal e Bosque.

**Tempo de vida:** 3,3 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Honduras; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Progne tapera* (Vieillot, 1817)



**Nome popular:** Andorinha-do-campo

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Hirundinidae

**Hábitat:** Pastagem, Terrestre, Savana e Pantanal.

**Tempo de vida:** 5,5 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; Suriname; Estados Unidos; Aruba; Chile; Ilhas Falkland (Malvinas); Costa Rica; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

# Troglodytidae

*Troglodytes musculus* Naumann, 1823



Nome popular: Corruíra

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Troglodytidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre e Savana.

**Tempo de vida:** 3,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Belize; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Dominica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Granada; Guatemala; Guiana; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Estados Unidos; Uruguai; Martinica; Guadalupe e Venezuela (Reprodução/Choca: Canadá).

## Turdidae

*Turdus leucomelas* Vieillot, 1818



**Nome popular:** Sabiá-barranco

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

Família: Turdidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque e Terrestre.

**Tempo de vida:** 5,8 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Turdus rufiventris* Vieillot, 1818



---

**Nome popular:** Sabiá-laranjeira

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

Família: Turdidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre, Pastagem e Bosque.

Tempo de vida: 5,9 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai  
(Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Turdus amaurochalinus* Cabanis, 1850



---

Nome popular: Sabiá-poca

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

Família: Turdidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre, Bosque e Pastagem.

---

**Tempo de vida:** 5,6 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Turdus subalaris* (Seebohm, 1887)



Ambas as fotos foram cedidas por Claudio Cesar Bossardi.

---

**Nome popular:** Sabiá-ferreiro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

Família: Turdidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Pantanal.

Tempo de vida: NC

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai.

---



## Mimidae

*Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1769)



**Nome popular:** Sabiá-do-campo

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

Família: Mimidae

**Hábitat:** Terrestre, Bosque, Floresta e Savana.

Tempo de vida: 5,3 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Suriname (Reprodução/Choca: Uruguai).

## Passerellidae

*Zonotrichia capensis* (Statius Muller, 1776)



Nome popular: Tico-tico

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Passerellidae

**Hábitat:** Terrestre, Bosque, Savana e Pastagem.

**Tempo de vida:** 4,3 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Granívoro

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Curaçao; República Dominicana; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; México; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Ilhas Falkland (Malvinas) e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792)



---

**Nome popular:** Tico-tico-do-campo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Passerellidae

---

**Hábitat:** Savana, Bosque e Pastagem.

---

**Tempo de vida:** 3,9 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

## Parulidae

*Geothlypis aequinoctialis* (Gmelin, 1789)



Nome popular: Pia-cobra

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Parulidae

**Hábitat:** Pantanal, Pastagem, Bosque e Savana.

**Tempo de vida:** 4,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Uruguai e Venezuela.

*Basileuterus culicivorus* (Deppe, 1830)



---

Nome popular: Pula-pula

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Parulidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,9 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Guiana; Paraguai; Trinidad e Tobago; Uruguai e Venezuela.

---

*Myiothlypis leucoblephara* (Vieillot, 1817)



---

**Nome popular:** Pula-pula-assobiador

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Parulidae

---

**Hábitat:** Floresta, Pantanal e Bosque.

---

**Tempo de vida:** 3,9 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai (Reprodução/Choca: Uruguai – Endêmica da Mata Atlântica).

---

## Icteridae

*Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769)



---

Nome popular: Japu

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Icteridae

**Hábitat:** Floresta, Terrestre.

Tempo de vida: 4,6 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

---

*Gnorimopsar chopi* (Vieillot, 1819)



---

Nome popular: Graúna

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Icteridae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana, Pastagem, Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,6 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)



Nome popular: Vira-bosta

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Icteridae

**Hábitat:** Bosque, Floresta, Terrestre e Pastagem.

**Tempo de vida:** 4,6 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Barbados; Bolívia; Brasil; Canadá; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; República Dominicana; Equador; Guiana Francesa; Granada; Guadalupe; Guiana; Haiti; Martinica; Monserrate; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA; Aruba; Bahamas; Ilhas Cayman; México; Jamaica (Reprodução/Choca: Estados Unidos e Uruguai).

# Thraupidae

*Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819)



Nome popular: Saíra-viúva

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

Tempo de vida: 3,7 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Schistochlamys ruficapillus* (Vieillot, 1817)



---

**Nome popular:** Bico-de-veludo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta, Savana e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina e Brasil (Reprodução/Choca: Paraguai).

---

*Tangara cyanoventris* (Vieillot, 1819)



---

**Nome popular:** Saira-douradinha

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,9 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Tangara desmaresti* (Vieillot, 1819)



---

Nome popular: Saíra-lagarta

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,9 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica da Mata Atlântica).

---

*Tangara sayaca* (Linnaeus, 1766)



---

**Nome popular:** Sanhaçu-cinzento

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

---

**Tempo de vida:** 4 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Colômbia; Uruguai e Venezuela).

---

*Tangara palmarum* (Wied, 1821)



**Nome popular:** Sanhaçu-do-coqueiro

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque, Terrestre e Savana.

**Tempo de vida:** 4 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Frugívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia, Estados Plurinacionais de; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Honduras; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

*Tangara ornata* (Sparrman, 1789)



---

**Nome popular:** Sanhaçu-de-encontro-amarelo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4 anos

---

Hábito alimentar: Frugívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica de Mata Atlântica).

---



*Tangara cayana* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Saíra-amarela

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Terrestre, Bosque e Pastagem.

Tempo de vida: 4,9 anos

Hábito alimentar: Frugívoro

**Distribuição:** Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana Francesa; Guiana; Peru; Suriname e Venezuela.

*Sicalis citrina* Pelzeln, 1870



---

**Nome popular:** Canário-rasteiro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Savana.

---

**Tempo de vida:** 3,8 anos (Aves migratórias)

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Guiana; Peru; Suriname e Venezuela.

---

*Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766)



---

**Nome popular:** Canário-da-terra-verdadeiro

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Bosque e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Aruba; Bolívia; Brasil; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; Suriname; Trinidad e Tobago; Cuba; Estados Unidos; Jamaica e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Hemithraupis ruficapilla* (Vieillot, 1818)



---

**Nome popular:** Saíra-ferrugem

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica de Mata Atlântica).

---

*Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Tiziú

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Terrestre, Bosque, Pastagem e Savana.

**Tempo de vida:** 3,8 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Granívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Barbados; Belize; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Dominica; Equador; El Salvador; Guiana Francesa; Granada; Guatemala; Guiana; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Trichothraupis melanops* (Vieillot, 1818)



---

Nome popular: Tiê-de-topete

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Coryphospingus pileatus* (Wied, 1821)



---

**Nome popular:** Tico-tico-rei-cinza

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta, Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Brasil; Colômbia; Guiana Francesa e Venezuela.

---

*Tachyphonus coronatus* (Vieillot, 1822)



---

Nome popular: Tiê-preto

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina, Brasil e Paraguai (Endêmica da Mata Atlântica).

---



*Tersina viridis* (Illiger, 1811)



Nome popular: Saí-andorinha

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

**Tempo de vida:** 3,7 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Ilhas Cayman; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

*Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766)



Nome popular: Saí-azul

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta, Savana, Bosque e Terrestre.

**Tempo de vida:** 3,7 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Honduras; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

*Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)



Nome popular: Cambacica

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta, Bosque e Terrestre.

Tempo de vida: 3,4 anos

Hábito alimentar: Nectarívoro

**Distribuição:** Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (Santo Eustáquio, Bonaire, Saba); Brasil; Ilhas Cayman; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Curaçao; Dominica; República Dominicana; Equador; Guiana Francesa; Granada; Guadalupe; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Martinica; México; Monserrate; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Porto Rico; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Martinho (parte francesa); São Vicente e Granadinas; São Martinho (parte holandesa); Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Estados Unidos; Venezuela; Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Virgens, EUA (Reprodução/Choca: Jamaica – Sazonal: São Bartolomeu; Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos ).

*Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758)



Nome popular: Bigodinho

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Pastagem.

**Tempo de vida:** 4,8 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Granívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana Francesa; Guiana; Paraguai; Peru; Suriname; Venezuela e Panamá.

*Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869)



---

Nome popular: Pixoxó

---

**Nível de ameaça:** Vulnerável ou Vulnerable, em inglês (VU).

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Brasil e Paraguai (Endêmica de Mata Atlântica).

---

*Sporophila nigricollis* (Vieillot, 1823)



Nome popular: Baiano

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Pastagem.

Tempo de vida: 4,8 anos

Hábito alimentar: Granívoro

**Distribuição:** Antígua e Barbuda; Argentina; Barbados; Bolívia; Brasil; Colômbia; Costa Rica; Dominica; Equador; Granada; Guiana; Martinica; Monserrate; Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Venezuela.

*Sporophila ardesiaca* (Dubois, 1894)



---

**Nome popular:** Papa-capim-de-costas-cinzas

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Bosque e Pastagem.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica de Mata Atlântica).

---

*Sporophila caerulescens* (Vieillot, 1823)



---

Nome popular: Coleirinho

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 4,8 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Paraguai e Peru (Reprodução/Choca: Uruguai).

---



*Embernagra platensis* (Gmelin, 1789)



---

**Nome popular:** Sabiá-do-banhado

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Pastagem, Bosque e Pantanal.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Embernagra longicauda* Strickland, 1844



---

**Nome popular:** Rabo-mole-da-serra

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Savana, Pastagem, Terrestre e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,8 anos

---

Hábito alimentar: Insetívoro

---

**Distribuição:** Brasil (Endêmica do Cerrado).

---

*Saltator similis* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837



**Nome popular:** Trinca-ferro-verdadeiro

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Thraupidae

**Hábitat:** Floresta e Terrestre.

Tempo de vida: 4,1 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil e Paraguai (Reprodução/Choca: Uruguai).

*Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)



---

Nome popular: Sai-canário

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Thraupidae

---

**Hábitat:** Floresta e Bosque.

---

Tempo de vida: 3,7 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Paraguai; Peru e Venezuela.

---

## Cardinalidae

*Piranga flava* (Vieillot, 1822)



**Nome popular:** Sanhaçu-de-fogo

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Cardinalidae

**Hábitat:** Floresta, Savana e Terrestre.

**Tempo de vida:** 4,1 anos (Aves migratórias)

Hábito alimentar: Insetívoro

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Guiana; Guiana Francesa; Paraguai e Suriname (Reprodução/Choca: Uruguai).

## Fringillidae

*Spinus magellanicus* (Vieillot, 1805)



---

Nome popular: Pintassilgo

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Fringillidae

---

**Hábitat:** Pastagem, Terrestre, Bosque, Floresta e Savana.

---

Tempo de vida: 4,2 anos

---

Hábito alimentar: Granívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; Colômbia; Equador; Guiana; Paraguai; Peru e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

*Euphonia chlorotica* (Linnaeus, 1766)



---

Nome popular: Fim-fim

---

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

---

**Ordem:** Passeriformes

---

**Família:** Fringillidae

---

**Hábitat:** Terrestre, Floresta, Bosque, Savana e Pantanal.

---

Tempo de vida: 3,5 anos

---

Hábito alimentar: Onívoro

---

**Distribuição:** Argentina; Bolívia; Brasil; Colômbia; Equador; Guiana; Guiana Francesa; Peru; Suriname e Venezuela (Reprodução/Choca: Uruguai).

---

## Estrildidae

*Estrilda astrild* (Linnaeus, 1758)



Nome popular: Bico-de-lacre

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Estrildidae

**Hábitat:** Pastagem, Terrestre, Pantanal e Savana.

Tempo de vida: 3,6 anos

Hábito alimentar: Granívoro

**Distribuição:** Angola; Botsuana; Burundi; Camarões; República Centro-Africana; Congo; Costa do Marfim; Guiné Equatorial; Eswatini; Etiópia; Gabão; Gana; Guiné; Quênia; Lesoto; Libéria; Malawi; Moçambique; Namíbia; Nigéria; Ruanda; Serra Leoa; Somália; África do Sul; Sudão do Sul; Sudão; Tanzânia; Uganda; Zâmbia; Zimbábue; Bermudas; Brasil; Espanha; Estados Unidos; Mali; Níger (Reprodução/Choca: Cabo Verde; Polinésia Francesa; Maurícia; Nova Caledônia; Portugal; Porto Rico; Reunião; Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha; Seychelles; Trinidad e Tobago; Uruguai; Vanuatu; São Tomé e Príncipe – Sazonal: Martinica).



## Passeridae

*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)



Nome popular: Pardal

**Nível de ameaça:** Segura ou pouco preocupante ou Least Concern, em inglês (LC)

**Ordem:** Passeriformes

**Família:** Passeridae

**Hábitat:** Floresta, Montanha, Pantanal, Pastagem, Terrestre, Aquático e Marinho, Bosque.

Tempo de vida: 6 anos

Hábito alimentar: Onívoro

**Distribuição:** Argélia; Andorra; Áustria; Azerbaijão; Bahrein; Bielorrússia; Bélgica; Bulgária; Camboja; Croácia; Chipre; Czechia; Dinamarca; Egito; Eritreia; Estônia; Ilhas Faroe; Finlândia; França; Alemanha; Gibraltar; Grécia; Guadalupe; Hungria; Islândia; Indonésia; Irã; Iraque; Irlanda; Jordânia; Kuwait; Letônia; Líbano; Líbia; Liechtenstein; Lituânia; Luxemburgo; Moldova; Marrocos; Países Baixos; Nigéria; Macedônia do Norte; Omã; Palestina, Estado de; Peru; Portugal; Catar; Romênia; Federação Russa; Federação Russa (Rússia da Ásia Central); Arábia Saudita; Eslováquia;

---

Eslovênia; Somália; Sudão do Sul; Espanha; Sri Lanka; Sudão; Suécia; Suíça; Síria; Tunísia; Peru; Ucrânia; Emirados Árabes Unidos; Reino Unido; Iémen; Japão; Vietnam; Anguilla; Argentina; Aruba; Bahamas; Belize; Bermudas; Bolívia; Bonaire, Santo Eustáquio e Saba; Brasil; Canadá; Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Curaçao; República Dominicana; Equador; El Salvador; Ilhas Falkland (Malvinas); Guatemala; Haiti; Honduras; Malawi; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Porto Rico; São Pedro e Miquelon; Senegal; Seychelles; Cingapura; São Martinho (parte holandesa); Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul; Tanzânia, República Unida da; Ilhas Turcas e Caicos; Venezuela, República Bolivariana da; Ilhas Virgens Britânicas; Ilhas Virgens, EUA; Zimbábue; Jamaica (Rússia Européia, Rússia do Leste Asiático); Sérvia; Espanha (Ilhas Canárias); Tajiquistão; Tailândia; Turquemenistão; Usbequistão; Austrália; Território Britânico do Oceano Índico; Comores; Eswatini; Lesoto; Maldivas; Maurícia; Nova Caledônia; Nova Zelândia; Reunião; Estados Unidos; Uruguai; Vanuatu).

---

## Glossário

**Aquático e Marinho** – junção dos ambientes aquáticos e marinhos. Os ecossistemas aquáticos são os que abrangem os ambientes de água, eles incluem desde um pequeno corpo de água até os oceanos. O ambiente marinho cobre 70% da superfície do planeta Terra, equivalendo a cerca de 361 milhões de km<sup>2</sup>.

**Bosque** – áreas contendo arbustos e árvores, como uma floresta, porém de menor tamanho.

**Cavernas e Fendas rochosas** – áreas com abrigos naturais de rocha, sejam eles em paredões, fendas em montanhas ou até mesmo pequenas tocas entre formações rochosas.

**Cerrado** – é um tipo de Savana (veja a seguir) contendo árvores esparsas, normalmente tortuosas e gramíneas.

**Congregatórias** – aves que se utilizam de locais específicos para choca, parada migratória ou hibernação.

**Deserto** – áreas grandes que recebem pouquíssima chuva por ano. Os desertos podem ser quentes ou frios. Os desertos cobrem cerca de 20% da superfície da Terra e estão presentes em todos os continentes. Podem, porém, ter características muito diferentes, como dunas de areia, montanhas, rochas áridas e planícies de cascalho.

**Endêmica** – uma espécie endêmica é aquela espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área ou região

geográfica. O endemismo é causado por quaisquer barreiras físicas, climáticas e biológicas que delimitem com eficácia a distribuição de uma espécie ou provoquem a sua separação do grupo original. Quando a separação ocorre por um longo período, o grupo isolado sofre o processo de especiação que desenvolve gera diferenciação de outros membros da espécie-mãe, gerando uma ou mais novas espécies.

**Marinho costeiro** – o supralitoral, local de influência dos respingos marinhos que fica permanentemente emersa. Zona raramente coberta pela água do mar, o que, no entanto, pode acontecer durante as marés vivas e tempestades, mas sempre por pouco tempo. Constitui um habitat de transição entre o mar e a terra.

**Marinho entremarés** – o mesolitoral (ou mediolitoral), o qual corresponde à faixa com periódicas emersões e imersões devidas às decidas e subidas das marés. A região entremarés de uma praia arenosa possui uma biota diversa e adaptada às condições físicas variáveis deste ambiente. Dentre os animais habitantes neste ambiente, os organismos cavadores contribuem de forma significativa tanto como biomassa, quanto na reciclagem de nutrientes nos substratos marinhos.

**Marinho nerítico** – o infralitoral, parte da praia que permanece sempre submersa, a não ser por raras ocasiões de grandes marés onde o limite com o mediolitoral é estendido. É a região mais próxima da costa, a zona com maior quantidade e variedade de vida, habitada pela

maioria dos peixes que conhecemos, principalmente porque são os mais pescados, tanto comercial como esportivamente.

**Mata Atlântica** – área de floresta tropical que ocorre na costa leste, sudeste e sul do Brasil, bem como no leste do Paraguai e na província Misiones, na Argentina.

**Migratórias latitudinais** – aves que se utilizam de migração para latitudes diferentes das que vivem durante o verão e a vantagem principal é que como os dias são mais longos, elas têm mais tempo para forragear, do que teriam, caso permanecessem próximo ao equador.

**Montanha** – áreas de composição rochosa como montanha, falésias ou simplesmente terrenos altamente irregulares de composição rochosa.

**Pantanal** – área úmida, alagada ou inundável.

**Pastagem** – pastagem, pradaria ou campina, dominados geralmente por gramíneas.

**Savana** – uma formação herbácea característica das regiões tropicais em que é longa a estação seca, onde predominam vegetações do tipo rasteira com gramíneas e arbustos e árvores esparsas. No Brasil existem três tipos: o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal.

**Terrestre** – que vive no ambiente terrestre.

## Referências

- ((O))ECO. **Entenda a classificação da Lista Vermelha da IUCN.** 2014. Disponível em: <<https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27904-entenda-a-classificacao-da-lista-vermelha-da-iucn/>>. Acesso em: 04 de março de 2020.
- ((O))ECO. **O que é uma Espécie Endêmica.** 2015. Disponível em: <<https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28867-o-que-e-uma-especie-endemica/>>. Acesso em: 04 de março de 2020.
- AGÊNCIA AMBIENTAL PICK-UPAU. **Dia Mundial das Aves Migratórias.** 2018. Disponível em: <[https://www.pick-upau.org.br/ong/noticias/noticias\\_2018/2018.05.10\\_ong-materia-aves-migratorias/materia-dia-mundial-aves-migratorias.htm](https://www.pick-upau.org.br/ong/noticias/noticias_2018/2018.05.10_ong-materia-aves-migratorias/materia-dia-mundial-aves-migratorias.htm)>. Acesso em: 04 de março de 2020.
- BIOREDE. ABC Glossary. Página inicial. Disponível em: <<http://www.biorede.pt/glossary/>>. Acesso em: 04 de março de 2020.
- BRITANNICA ESCOLA. Britannica Digital Learning. Página inicial. Disponível em: <<https://escola.britannica.com.br/>>. Acesso em: 04 de março de 2020.
- DEFESAVEGETAL.NET. **Você sabe o que é uma espécie críptica?** 2016. Disponível em: <<http://www.defesavegetal.net/single-post/2016/10/13/Voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-uma>>

[esp%C3%A9cie-cr%C3%ADtica](#)>. Acesso em: 04 de março de 2020.

DICIO. Dicionário Online de Português. Página inicial.  
Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/> . Acesso em: 04 de março de 2020.

IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. Disponível em: <<https://www.iucnredlist.org/>>. Acesso em: 17 de abril de 2020.

MDMAT. **Ambiente Marinho**. 2020. Disponível em:  
<[http://mdmat.mat.ufrgs.br/acqua/Textos/ambiente\\_marinho.htm](http://mdmat.mat.ufrgs.br/acqua/Textos/ambiente_marinho.htm)>. Acesso em: 04 de março de 2020

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **O Bioma Cerrado**. 2020.  
Disponível em:  
<[http://mdmat.mat.ufrgs.br/acqua/Textos/ambiente\\_marinho.htm](http://mdmat.mat.ufrgs.br/acqua/Textos/ambiente_marinho.htm)>. Acesso em: 04 de março de 2020

PRAVDA.RU. **Conservação das aves: Zonas importantes no Brasil**. 2006. Disponível em:  
<<http://port.pravda.ru/news/cplp/brasil/08-02-2006/9980-0/>>. Acesso em: 04 de março de 2020.

SBPCNET. **Fauna Cearense de Substrato Inconsolidado**. 2020.  
Disponível em:  
<[http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF\\_SIMP/textos/inesmartins.htm](http://www.sbpcnet.org.br/livro/57ra/programas/CONF_SIMP/textos/inesmartins.htm)>. Acesso em: 04 de março de 2020

SOS MATA ATLÂNTICA. **A Floresta**. 2020. Disponível em:  
<<https://www.sosma.org.br/conheca/mata-atlantica/>>.  
Acesso em: 04 de março de 2020.

THE WILDLIFE TRUSTS. **Rocky habitat**. 2020. Disponível em:  
<<https://www.wildlifetrusts.org/habitats/rocky-habitat>>.  
Acesso em: 04 de março de 2020

WIKIAVES. Observação de aves e ciência cidadã para todos.  
Página inicial. Disponível em:  
<<https://www.wikiaves.com.br/>>. Acesso em: 01 de  
setembro de 2019.

## Referências Complementares

BHAKTI, T.; ROSSI, F.; MAFIA, P.O.; ALMEIDA, E.F.; FUJACO, M.A.G.; AZEVEDO, C.S. Preservation of historical heritage increases bird biodiversity in urban centers. **Environmental, Development and Sustainability**, 2020. Disponível em <<https://doi.org/10.1007/s10668-020-00993-7>>. Acesso em: 04 de março de 2020.

GILL, F.B.; PRUM, R.O. **Ornithology**. 4<sup>o</sup> ed. New York: W.H.Freeman and Company, 2019.

LOVETTE, I.J.; FITZPATRICK, J.W. **Handbook of Bird Biology**. 3<sup>o</sup> ed. West Sussex: Wiley, 2016.



MELLO, D.; MELLO, G.; MALLEY-RODRIGUES, F.; LIMA, L.  
**Aves do Sudeste do Brasil:** guia de identificação. Rio de Janeiro: Edição do autor. 2020.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997.

SIGRIST, T. **Aves do Brasil:** uma visão artística. Rio de Janeiro: Ed. Avis Brasilis, 2006.

SIGRIST, T. **Avifauna Brasileira:** guia de campo. Rio de Janeiro: Ed. Avis Brasilis, 2014.